

МАТЕМАТИКА

УЧЕБНИК

10

$$\frac{1}{3} S_{\text{от}} h$$

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{от}} h$$

$$S_{\text{от}} h$$



$$V = S_{\text{от}} h$$

$$\log_a b = \frac{\lg b}{\lg a}$$

$$m = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^T$$



$$\lg_c x + \lg_c y$$





AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT HİMNİ

Musiqisi *Üzeyir Hacıbəylinin,*
sözləri *Əhməd Cavadındır.*

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadیرiz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hər bə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştəqdir!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!



ГЕЙДАР АЛИЕВ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

Найма Гахраманова
Магомед Керимов
Ильгам Гусейнов

МАТЕМАТИКА 10

Учебник по предмету “Математика” для
10 класса общеобразовательных школ


©Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International (CC BY-NC-SA 4.0)

Bu nəşr Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
lisensiyası (CC BY-NC-SA 4.0) ilə www.trims.edu.az
saytında əlçatandır. Bu nəşrin məzmunundan istifadə edərkən
sözügedən lisenziyanın şərtlərini qəbul etmiş olursunuz:

İstinad zamanı nəşrin müəllif(lər)inin adı göstərilməlidir. 

Nəşrdən kommersiya məqsədilə istifadə qadağandır. 

Təgəmə nəşrlər orijinal nəşrin lisenziya şərtlərilə yayılmalıdır. 


Замечания и предложения, связанные с этим изданием,
просим отправлять на электронные адреса:
radius_n@hotmail.com и derslik@edu.gov.az.
Заранее благодарим за сотрудничество!



Оглавление

1. Функции

Функция и способы ее задания	7
Свойства функций	12
Чётные и нечётные функции.....	16
График и свойства некоторых функций	19
Степенная функция $y = x^n$ ($n \in N$)	21
Кусочно-заданная функция	22
Преобразование графиков.....	24
Сложная функция.....	31
Обратная функция	34
Область определения и множество значений некоторых функций	39
Обобщающие задания	41



2. Точка, прямая и плоскость в пространстве

Точка, прямая и плоскость в пространстве	44
Параллельность прямой и плоскости.....	50
Перпендикулярность прямой и плоскости.....	51
Перпендикуляр и наклонная	53
Теорема о трёх перпендикулярах.....	55
Угол между двумя плоскостями. Двугранные углы	58
Перпендикулярные плоскости.....	61
Параллельные плоскости	64
Обобщающие задания	68

3. Тригонометрические выражения и их преобразования

Угол поворота.....	71
Градусная и радианная мера углов ..	74
Длина дуги. Площадь сектора	77
Линейная скорость и угловая скорость	79
Тригонометрические функции	81
Единичная окружность и тригонометрические функции	85
Формулы приведения.....	94
Тригонометрические тождества	99
Формулы сложения	103
Следствия из формул сложения	107
Упрощение тригонометрических выражений	112
Обобщающие задания	114

4. Теорема синусов и теорема косинусов

Теорема синусов	117
Теорема косинусов	126
Обобщающие задания	131

5. Тригонометрические функции и их графики

Периодические функции.....	134
Графики функций $y = \sin x$ и $y = \cos x$...	137
Преобразования графиков функции $y = \sin x$ и $y = \cos x$	141
Тригонометрические функции и периодические события.....	153
Графики функций $y = \tan x$ и $y = \cot x$..	158
Обобщающие задания	163

6. Многогранники

Многогранники	166
Призмы	170
Многогранники и их виды с различных сторон	173
Площадь поверхности призмы.....	175
Сечение призмы плоскостью.....	181
Площадь боковой и полной поверхностей пирамиды.....	183
Усечённая пирамида	190
Обобщающие задания	192



7. Тригонометрические уравнения

Обратные тригонометрические функции	195
Простейшие тригонометрические уравнения.....	199
Способы решения тригонометрических уравнений.....	208
Применение тригонометрических уравнений для решения задач.	213
Обобщающие задания	216

8. Объёмы фигур

Объём призмы	219
Объём пирамиды	228
Подобие пространственных фигур .	232
Площади поверхностей и объёмы подобных фигур	233
Объём усечённой пирамиды.....	237
Симметрия в пространстве	239
Обобщающие задания	242

9. Показательная и логарифмическая функции

Степень с действительным показателем	245
Показательная функция	248
Логарифм числа	258
Логарифмическая функция	260
Свойства логарифмов	262
Логарифмическая шкала. Решение задач	266
Показательные уравнения	268
Логарифмические уравнения	271
Показательные неравенства	275
Логарифмические неравенства	277
Обобщающие задания	280

10. Информация и прогноз

Совокупность и выборка. Случайная выборка и её разновидности.....	283
Представление информации	287
Разложение бинома	293
Испытания Бернулли	297
Обобщающие задания	304

1

Функции

Функция и способы задания функции

Свойства функций

График и свойства некоторых функций

Степенная функция $y = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$)


Кусочно - заданная функция

Преобразование графиков

Сложная функция

Обратная функция

Область определения и множество значений некоторых функций




В различных процессах, которые происходят в природе, можно увидеть, как одни величины изменяются в зависимости от других. Например, путь, пройденный пешеходом, зависит от времени, стоимость покупки зависит от её количества. Путь и время, стоимость и количество, переменные величины. Одна из этих величин независимая, другая изменяется в зависимости от первой. Так, время является независимой переменной, путь – величина, зависящая от времени, количество купленного товара – независимая величина, стоимость покупки зависит от количества. Понятно, что каждая из переменных величин принадлежит какому-то определённому множеству.


Если каждому элементу x из множества X , по определённому правилу ставится в соответствие единственное значение y из множества Y , то такое соответствие называется функцией.

Здесь x называется независимой переменной или аргументом, а y зависимой переменной или функцией. Обычно функцию обозначают так f (или g , φ и т.д.), значения соответствующие заданным значениям аргумента так $f(x)$ (или $g(x)$, $\varphi(x)$ и т.д.): $y = f(x)$


Рассмотрим примеры соответствий.



$$f(1) = 15, f(2) = 20, \\ f(3) = 25,$$



$$g(0) = 0, g(-1) = 1, \\ g(1) = 1, g(-2) = 4, \\ g(2) = 4$$



$$h(-1) = 1, h(0) = 0, \\ h(0) = 2, h(1) = 2$$

Здесь каждое из соответствий f и g является функцией. Поскольку одному и тому же значению x ($x = 0$) соответствуют разные значения $h(x)$ (0 и 2), значит соответствие h не является функцией.

Областью определения функции f называется множество всех допустимых значений независимой переменной и обычно обозначается $D(f)$ Все значения, которые принимает зависимая переменная, образуют **множество значений** функции и обычно обозначается $E(f)$.

Функция может быть задана различными способами: таблицей, графиком, формулой и т.д.

Функция может быть задана таблицей. В таблице в одной строке (или в столбце) показаны значения независимой переменной (x), в другой строке (или в столбце) значения зависимой переменной (y).

Пример 1.

Урожай пшеницы, собранный с каждого гектара(в тоннах)							
х (года)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
у (урожай, собранный с 1 гектара)	3	4	2	3	5	3	4

Пары (2009; 3), (2010; 4), (2011; 2), (2012; 3), (2013; 5), (2014; 3), (2015; 4) показывают изменение количества собранного урожая с 1 гектара в зависимости от года.

Область определения (года):{2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015}

Множество значений (количество собранного урожая):{2; 3; 4; 5}



Функция может быть задана аналитически – формулой.

Пример 2. $f(x) = x^2$, $1 \leq x \leq 3$. Эта запись показывает, что область определения функции промежутки $[1; 3]$, и каждому числу из данного отрезка ставится в соответствие его квадрат.

Например, $f(1) = 1^2 = 1$, $f(1,2) = 1,2^2 = 1,44$, $f(2) = 2^2 = 4$, $f(3) = 3^2 = 9$ и т.д. В этом случае запись $f(4)$ не имеет смысла, так как число 4 не принадлежит области определения функции, а именно промежутку $[1; 3]$.

Обучающие задания

- 1.** Определите, является ли соответствие функцией.



- 2.** Какая зависимость, заданная таблицей, является функцией?

а)

х	3	0	0	-1	-3
у	-4	-3	-1	-2	0

б)

х	7	6	5	4	3
у	-1	2	-1	2	3

- 3.** Дана функция $f(x) = 1 - 2x$. Найдите $f(-2)$, $f(0)$, $f(0,5)$, $f(3)$

4. а) Заполните таблицу значений функции, заданной формулой $y = 3x - 1$

x	-4		0		6	
y		-7		11	14	20

б) Для функции $y = 2x - 1$ найдите область определения и множество значений.


5. Для функции $g(x) = 4x^3 - x$ вычислите сумму $g(2) + g(-2)$.

6. При каких значениях аргумента значение функции $f(x) = \frac{x+1}{3-x}$ равно:

- а) 1; б) 0; в) -2 ?

Функция может быть задана графически. График функции

это множество всех точек координатной плоскости, абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты – соответствующим значениям функции.



Пример 3. На рисунке задан график функции $f(x)$. По графику найдите:

- а) Область определения;
 б) Множество значений;
 в) значения $f(-4)$ и $f(-2)$.

Решение. а) Обращаем внимание на то что, конечные точки в графике функции пустые (выколота) или закрашенные.


Область определения: $-6 \leq x < 2$

б) Множество значений: $1 < y \leq 5$

в) $f(-4) = 4, f(-2) = 3$





Является или нет зависимость между двумя величинами функцией, можно определить по ее графику.

Если любая прямая, проведенная параллельно оси ординат, пересекается с графиком самое большее в одной точке, то эта зависимость является функцией (рис.а). Если существует прямая, параллельная оси ординат, которая пересекает график в двух (или более точках) (рис.б), то эта зависимость не является функцией. Это указывает на то, что одним и тем же значениям аргумента (x) соответствуют несколько значений функции, что противоречит определению функции.






Обучающие задания

7. Установите, является ли зависимость графиком функции, проведя вертикальные прямые.




8. Функция задана графически. Для каждого отдельного случая найдите $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(-2)$.




9. Выполните задания по графику на картинке.

- а) Запишите координаты точек, отмеченных на графике функции.
 б) Представьте функцию в виде таблицы.
 в) Напишите область определения функции и множество значений.



10. По графику функции $f(x)$ найдите:

- а) $f(-3)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$
 б) значения x , удовлетворяющие равенствам $f(x) = 1$ и $f(x) = 3$




11. График функции $y = 2x + b$ проходит через точку $A(1; -1)$.

- а) Найдите b
 б) Постройте график функции.


12. При каком значении c график функции $f(x) = x^2 + x + c$ проходит через точку $A(-1; 2)$?

13. Для функции $f(x) = x^2 - 2x + q$ найдите $f(-1)$, если $f(0) = -3$.



14. На рисунке представлены графики функций $y = 2x$, $y = 2 + x$, $y = \frac{2}{x}$, $y = x^2$. Для каждой функции укажите ее график.



15. а) Задайте формулой в виде $f(x) = kx + b$ функцию, график которой изображён на рисунке.
 б) Найдите значения $f(-2)$, $f(6)$.



16. Задайте формулой функции, изображённые на рисунке. Укажите область определения и множество значений функций.



17. Эльгюн говорит, что значения, приведенные в таблице ниже, не означают, что y является функцией от x , потому что разные значения x соответствуют одному и тому же значению y . Как вы думаете?

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	10	5	2	1	2	5	10

18. Какую из указанных зависимостей можно называть функцией? Если это функция, то выразите зависимость формулой.

а) зависимость между заработной платой Рамиза за неделю и прибылью от продажи, если он получает постоянную зарплату в размере 50 манат за неделю и дополнительно 2% от продажи.

б) зависимость между временем и расстоянием, пройденным Асмер со скоростью 5 км/ч.

в) зависимость между очками, набранными в компьютерной игре и возрастом ребёнка.


19. Постройте график заданных функций. Запишите область определения и множество значений в виде промежутка.

а) $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$, $-6 \leq x < 2$

б) $y = x^2 - 2|x|$, $-4 \leq x \leq 4$

Проще изучать свойства функции с помощью ее графика.

Нули функции. В точках пересечения графика функции с осью абсцисс $f(x)=0$. Поэтому абсциссы этих точек называются **нулями функции**. Нулями функции называются значения аргумента, которые превращают функцию в нуль.




Нулей нет


Три нуля x_1, x_2, x_3 ,

Нулями функции $f(x)$ являются корни уравнения $f(x)=0$.

На графике, изображённом на рисунке схематично, представлены нули и промежутки знакопостоянства функции.



Два нуля x_1, x_2



Обучающие задания

1. Найдите нули функции.

а) $y = \frac{1}{5}x - 4$

б) $y = 2x(x - 3)$

в) $y = \sqrt{x} - 2$

г) $y = \sqrt{x-2}$

2. Постройте график некоторой функции с нулями в точках:



а) -1

б) $-2; 1$

в) $-1; 3$

г) $-2; 1; 4$

3. По данному графику найдите нули и промежутки знакопостоянства функции.



4. Найдите нули функции и схематично изобразите её график. Запишите промежутки знакопостоянства.

а) $y = x^2 - 2x$



б) $y = 4x - x^2$

в) $y = x^2 - 2x - 3$

Возрастание и убывание функции

Пусть функция определена на некотором промежутке. Если для любых значений x_1, x_2 , взятых из этого промежутка $x_2 > x_1$, следует, что $f(x_2) > f(x_1)$, т.е. большему значению аргумента соответствует большее значение функции, то этот промежуток называется **промежутком возрастания $f(x)$** , если же $f(x_2) < f(x_1)$, т.е. большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции, то промежуток называется **промежутком убывания $f(x)$** .

Возрастание функции на промежутке будем показывать стрелкой \nearrow , а убывание стрелкой \searrow .




По знаку углового коэффициента можно определить возрастает или убывает линейная функция.

Если угловой коэффициент положителен, то функция возрастает.

Если угловой коэффициент отрицателен, то функция убывает.


Пример 1.

Функция $y = 2x + 1$
возрастающая





Пример 2.

Функция $y = -2x + 3$
убывающая



В зависимости от значения углового коэффициента изменяется наклон графика линейной функции - прямой линии. Скорость возрастания или убывания значений функции также изменяется соответственно.






Обучающие задания

5. Запишите данное уравнение в виде $y = kx + b$. Определите, функция возрастает или убывает? Проверьте ответ построив график функции.

а) $x + 2y = 6$ б) $4x - 3y = 12$ в) $2x - y = 3$

6. Определите угловой коэффициент по графику линейной функции. Функция возрастает или убывает? Напишите формулу функции.



7. График линейной функции проходит через заданные точки.

1) Определите угловой коэффициент функции.

2) Функция возрастает или убывает?

3) Напишите формулу функции.

4) Постройте график функции.

а) $A(3, 7); B(-1, -5)$ б) $A(-1, 5); B(0, 2)$ в) $A(2, -1); B(4, 0)$

8. а) Изобразите график возрастающей функции с областью определения $[1; 4]$.

б) Изобразите график убывающей функции с областью определения $[1; 4]$

9. Функция $y = f(x)$ определена и убывает на промежутке $(-\infty; +\infty)$. Расположите значения в порядке возрастания:

а) $f(0), f(-4), f(2)$; б) $f(1), f(-1), f(3)$; в) $f(-\sqrt{3}), f(-2), f(\sqrt{2})$

10. а) Напишите формулу функции $f(x) = kx + b$, график которой проходит через точки $A(1; -1)$ и $B(2; 1)$.

б) Расположите значения $f(-3), f(-4), f(2)$ в порядке возрастания.

в) Определите, при каких значениях аргумента $f(x) \geq f(1)$.

11. Найдите нули функции и схематично изобразите её график. Запишите промежутки знакопостоянства, возрастания (убывания) и экстремумы функции:

а) $y = x^2 - 4$

б) $y = |x| - 1$

в) $y = -x^2 + 2x + 3$


Максимумы и минимумы функций

Абсциссы точек на графике, в которых возрастание функции сменяется убыванием или, наоборот, убывание сменяется возрастанием, называют, соответственно, точками максимума и минимума. Точки максимума и минимума обозначаются как x_{\max} , x_{\min} и называются точками экстремума, а значения функции в этих точках экстремумами функции.

Функция график которой показан на рисунке, в точке $x = c$ имеет минимум, в точке $x = d$ имеет максимум, и это записывается так:

$$x_{\min} = c, f_{\min} = f(c), x_{\max} = d, f_{\max} = f(d).$$

Среди всех значений функции на области определения наибольшее обозначается НБЗ, а наименьшее НМЗ (если они есть).




Пример. Перечислите все свойства функции на графике.

Решение: 1. Область определения функции промежуток $[-1; 5)$. Если $x = -1$, то $f(-1) = 1$ (соответствующая точка закрашена). Точка $(5; 2)$ не принадлежит графику (она выколота).

Множество значений функции промежуток $[-3; 3]$

2. Нули функции. График пересекает ось x в точках с абсциссами: $x = 1$ и $x = 4$. То есть значения $x = 1$ и $x = 4$ являются нулями функции: $f(1) = 0, f(4) = 0$.



Нули функции разбивают область определения функции на три промежутка знакопостоянства: $[-1; 1)$, $(1; 4)$ и $(4; 5)$.

На промежутке $(1; 4)$ функция принимает отрицательные значения, в каждом из промежутков $[-1; 1)$ и $(4; 5)$ положительные значения.

3. Возрастание и убывание функции. По графику видно, что при увеличении значений x от -1 до 0 , значения y увеличивается от 1 до 3 , а при увеличении значений x от 0 до 2 , значения y уменьшаются от 3 до -3 , при увеличении x от 2 до 5 , y увеличивается от -3 до 2 . Функция на каждом из промежутков $[-1; 0]$ и $[2; 5)$ возрастает, а на промежутке $[0; 2]$ убывает.


4. Экстремумы функции - максимумы и минимумы. Точки $(0; 3)$ и $(2; -3)$ на графике являются точками экстремума. Соответственно эти точки показывают максимум и минимум функции: $x_{\max} = 0, f_{\max} = 3, x_{\min} = 2, f_{\min} = -3$.

Обучающие задания


12. Для функции, заданной графиком, укажите:

- область определения;
- нули;
- промежутки, где функция принимает положительные значения;
- промежутки, где функция принимает отрицательные значения;
- промежутки возрастания и убывания;
- множество значений.

1)



2)



13. Постройте график заданной функции на заданном промежутке. Покажите экстремумы. Найдите наименьшее и наибольшее значение.

а) $y = 2x - x^2$, $[-1; 2]$

б) $y = x^2 + 4x$, $[-4; 1]$

Чётные функции, нечётные функции

Рассмотрим функцию, область определения которой симметрична относительно точки $x = 0$.

Если для любого x из области определения функции $f(-x) = f(x)$, то $f(x)$ называется чётной функцией.




График чётной функции симметричен относительно оси ординат.

Если для любого x из области определения функции $f(-x) = -f(x)$, то $f(x)$ называется нечётной функцией.





График нечётной функции симметричен относительно начала координат. Если нечетная функция определена в точке $x = 0$, то $f(x) = 0$

Вовсе не все функции бывают чётными или нечётными. Если область определения функции не симметрична относительно точки $x = 0$, то функция ни чётная и ни нечётная. Аналогично, если для функции, область определения которой симметрична относительно 0, нарушается выполнение условий $f(-x) = f(x)$ и $f(-x) = -f(x)$, то функция также является ни чётной и ни нечётной.



Является ли функция чётной или нечётной, можно определить по ее графику, а также по аналитической формуле.

Пример 1. Определите по графику, является ли функция четной или нечетной. а) $f(x) = x^2 - 4$ б) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

График функции симметричен относительно оси y .
Функция чётная.





График функции не симметричен ни относительно начала координат, ни относительно оси y .
Функция ни чётная и ни нечётная.



Пример 2. Определите, является ли функция $f(x) = x^2 + x$ четной, нечетной или никакой из них.

Решение: Областью определения данной функции является множество всех действительных чисел, и оно симметрично относительно точки $x = 0$. Однако, так как $f(-x) = (-x)^2 + (-x) = x^2 - x$, то $f(-x) \neq f(x)$ и $f(-x) \neq -f(x)$.
Значит, функция ни чётная и ни нечётная.

Пример 3. Определите, является ли функция $f(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 + 2}$ четной или нечетной.




Решение: Областью определения функции множество всех действительных чисел и $f(-x) = \frac{(-x)^3 - (-x)}{(-x)^2 + 2} = \frac{-x^3 + x}{x^2 + 2} = \frac{-(x^3 - x)}{x^2 + 2} = -\frac{(x^3 - x)}{x^2 + 2} = -f(x)$, т.е. $f(-x) = -f(x)$. Таким образом данная функция нечётная.

Обучающие задания

14. Определите, является ли функция четной, нечетной или никакой из них.

- а) $f(x) = 5x^3 + x$ б) $f(x) = 5x^3 + x^2 + 4$ в) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2}$ г) $f(x) = \frac{2}{x^3 + 3x}$

15. Выясните, чётной или нечётной является функция, заданная графиком.



16. Выясните, чётной или нечётной является функция:

$$f(x) = -x^2 + 6$$

$$f(x) = -x^3 + x$$

$$f(x) = |x| + 4$$

$$f(x) = x^{-2}$$

$$f(x) = x^2 + 1$$

$$f(x) = -3x^2 - 5$$

$$f(x) = |x^3|$$

$$f(x) = \frac{|x|}{x^2 + 1}$$

17. Функция $f(x)$ определена на всей числовой оси.

а) найдите $f(4)$, если функция $f(x)$ чётная и $f(-4) = 7$


б) найдите $f(4)$, если функция $f(x)$ нечётная и $f(-4) = 7$

в) найдите $f(3) + f(-5)$, если функция $f(x)$ чётная и $f(-3) = 8, f(5) = -2$

г) найдите $f(2) + f(0) + f(-4)$, если функция $f(x)$ нечётная и $f(-2) = 3, f(4) = -7$

18. На рисунке задана одна часть графика функции $f(x)$ с областью определения $[-2; 2]$. Дополните график, если функция является:

а) чётной; б) нечётной.



19. Может ли функция с нижеследующей областью определения быть чётной или нечётной?

а) $[-6; 6]$; б) $(-6; 6]$; в) $(-6; 6)$; г) $[-9; 10]$; д) $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

20. Функция $f(x)$ определена на всей числовой оси, является чётной функцией и возрастает на промежутке $[0; +\infty)$.





1) сравните: а) $f(2)$ и $f(3)$; б) $f(5)$ и $f(7)$; в) $f(-2)$ и $f(-3)$; г) $f(-5)$ и $f(-7)$,




2) будет ли функция $f(x)$ возрастающей или убывающей на промежутке $(-\infty; 0]$?

21. Изобразите схематично график чётной функции, областью определения которой является отрезок $[-6; 6]$, возрастающей на промежутке $[-6; 0]$ и равной нулю в точке $x = -4$. При каких значениях x будет $f(x) > 0$?

Основные функции

Переменные величины весьма различны. Однако, на первый взгляд, различные процессы могут иметь одинаковую природу и заданы одинаковой зависимостью. Например, графики функций $y = 2x^2 + 1$, $y = (x - 1)^2 + 2$, $y = -3x^2$ получаются преобразованиями параболы $y = x^2$. Поэтому эти функции, а также все функции, задаваемые формулой $y = a(x - m)^2 + n$, образуют семейство, и основной функцией этого семейства считается $y = x^2$. В таблице ниже представлены графики некоторых основных функций.

<p>Постоянная функция</p> $f(x) = c$  <p>$D(f) = (-\infty; +\infty)$ $E(f) = \{c\}$</p>	<p>Тождественная функция</p> $f(x) = x$  <p>$D(f) = (-\infty; +\infty)$ $E(f) = (-\infty; +\infty)$</p> <p>Нули функции $x = 0$ Возрастающая функция Экстремумов нет</p>	<p>Модульная функция</p> $f(x) = x $  <p>$D(f) = (-\infty; +\infty)$ $E(f) = [0; +\infty)$</p> <p>Нули функции $x = 0$ $(-\infty; 0] \downarrow, [0; +\infty) \uparrow$ Минимум в точке $(0; 0)$</p>	<p>Рациональная функция</p> $f(x) = \frac{1}{x}$  <p>$D(f) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ $E(f) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$</p> <p>Нулей нет $(-\infty; 0) \downarrow, (0; +\infty) \downarrow$ Экстремумов нет</p>
--	--	---	---

<p>Квадратичная функция</p> $f(x) = x^2$  <p>$D(f) = (-\infty; +\infty)$ $E(f) = [0; +\infty)$</p> <p>Нули функции: $x = 0$ $(-\infty; 0] \downarrow, [0; +\infty) \uparrow$ Минимум в точке $(0; 0)$</p>	<p>Кубическая функция</p> $f(x) = x^3$  <p>$D(f) = (-\infty; +\infty)$ $E(f) = (-\infty; +\infty)$</p> <p>Нули функции: $x = 0$ Возрастающая функция Экстремумов нет</p>	<p>Функция квадратного корня</p> $f(x) = \sqrt{x}$  <p>$D(f) = [0; +\infty)$ $E(f) = [0; +\infty)$</p> <p>Нули функции: $x = 0$ $[0; +\infty) \uparrow$ Экстремумов нет</p>
---	--	---

Обучающие задания

1. В одной координатной плоскости постройте графики функций, определите их общие точки.

а) $y = \sqrt{x}$; $y = \frac{1}{x}$

б) $y = x$; $y = x^3$

в) $y = x^2$; $y = |x|$

2. Какой функции соответствуют множество точек $(-1; -1)$, $(0; 0)$, $(1; 1)$?
- а) Если точку $(-1; -1)$ заменить точкой $(-1; 1)$, то какой функции будет соответствовать полученное множество?
- б) Если точку $(-1; -1)$ заменить точкой $(9; 3)$, то какой функции будет соответствовать полученное множество?
- в) Если к множеству точек, указанных выше, добавить точки $(-2; -8)$ и $(2; 8)$, то какой функции более точно соответствовало бы данное множество точек?
3. Зная, что между переменными y и x существует прямо или обратно пропорциональная зависимости, запишите формулу и постройте график функций $y = f(x)$, если $f(2) = 2$ и $f(4) = 1$.

4. Зависимость между величинами задана формулой $\frac{pV}{T} = const$. Приняв одну из величин за постоянной, определите характер зависимости между двумя другими величинами. Рассмотрите все возможные случаи. Укажите для каждого случая основную функцию.

5. 1) Постройте графики функций, заданных в виде таблицы. Для каждой функции запишите основную функцию соответствующего семейства.

а) В таблице показана прибыль (в манатах), полученная предпринимателем начиная с 2012 года.

x	3	4	5	6	7	8	9	10
y	7931	8306	8800	9206	9588	10076	10444	10876


Значение $x = 3$ соответствует 2012-году. Какую прибыль получит, приблизительно, предприниматель в 2022 году?

б) В таблице показано количество проданных буханок хлеба за каждый следующий час после 15:00.

x	3	4	5	6	7	8	9	10
y	15	30	40	50	45	42	31	18

Значение $x = 3$ соответствует 15:00. Определите приблизительно количество буханок хлеба, проданных в 17:30.

- 2) Определите соответствие графиков и представленных выше ситуаций.



Степенная функция $y = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$)

Функция вида $y = x^n$ (n - натуральное число) называется степенной функцией с натуральным показателем. Ниже представлены графики степенных функций при $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$




График функции $y = x$ — прямая линия




График функции $y = x^2$ — парабола.




График функции $y = x^3$ — кубическая парабола.

График функции $y = x^n$ для любого чётного значения n симметричен относительно оси y и похож на параболу $y = x^2$. Для любых нечётных значений n график функции $y = x^n$ симметричен относительно начала координат и для нечётных значений n больше 1, похож на кубическую параболу ($y = x^3$).

$$D(x^{2k}) = (-\infty; +\infty)$$

$$E(x^{2k}) = [0; +\infty)$$


$$\text{Нули: } x = 0$$

$$(-\infty; 0] \downarrow$$

$$[0; +\infty) \nearrow$$

$$x_{\min} = 0;$$

$$f_{\min} = 0$$




$$D(x^{2k+1}) = (-\infty; +\infty)$$

$$E(x^{2k+1}) = (-\infty; +\infty)$$

$$\text{Нули: } x = 0$$

$$(-\infty; +\infty) \nearrow$$

экстремумов нет



При $n > 1$, $n \in \mathbb{N}$ график функции x^n называется параболой n -го порядка.

По рисунку видно, что при $n > m$ на промежутке $(0; 1)$ график функции x^n находится ниже, на промежутке $(1; +\infty)$ выше графика функции x^m .

Обучающие задания

- Сравните с нулём значения функции в точках $x = 0$; $x = -3$; $x = 5$
 - $f(x) = x^4$
 - $f(x) = x^5$
 - $f(x) = x^6$
- Проходит ли график заданной функции через заданную точку?
 - $y = x^4$, $A(-2; 16)$
 - $y = x^5$, $B(-2; 32)$
 - $y = x^5$, $C(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{32})$
- Пересекает ли заданная прямая график заданной функции?
 - $y = x^4$, $y = 2$
 - $y = x^6$, $y = -3$
 - $y = x^5$, $y = 2$
 - $y = x^7$, $y = -3$
- Даны функции $f(x) = x^3$ и $g(x) = x^4$. Сравните:
 - $f(0,1)$ и $g(0,1)$
 - $f(\frac{1}{2})$ и $g(\frac{1}{2})$
 - $f(2)$ и $g(2)$
- В одной координатной плоскости постройте графики функций $y = x^4$ и $y = 16$ и, по графику, решите неравенства:
 - $x^4 < 16$
 - $x^4 > 16$

Кусочно-заданная функция

Часто, для описания реальных жизненных ситуаций используют не одну, а несколько формул или неравенств.

Задача. Оптовый магазин при покупке не менее 10 и не более 20 спортивных рубашек, реализует их по 3 маната за штуку, при покупке более 20 рубашек - по 2 маната за штуку. Запишите зависимость между двумя величинами: выручкой C и количеством проданных рубашек n .

Решение: Имеем $C(n) = 3 \cdot n$, при $10 \leq n \leq 20$ и $C(n) = 2 \cdot n$, при $n > 20$ и в общем виде функцию можно записать так:

$$C(n) = \begin{cases} 3 \cdot n, & 10 \leq n \leq 20 \\ 2 \cdot n, & n > 20 \end{cases}$$

Найдём значения функции $C(n)$ при $n = 15$, $n = 20$, $n = 30$, $n = 40$.

Значения $n = 15$ и $n = 20$ удовлетворяют условию $10 \leq n \leq 20$. Эти значения вычислим по формуле $C(n) = 3 \cdot n$.

$$C(15) = 3 \cdot n = 3 \cdot 15 = 45, \quad C(20) = 3 \cdot n = 3 \cdot 20 = 60.$$

Значения $n = 30$ и $n = 40$ соответствуют условию $n > 20$:


$$C(30) = 2 \cdot 30 = 60, \quad C(40) = 2 \cdot 40 = 80.$$

Если функция задана различными формулами на разных участках области определения, то говорят о кусочном задании функции.

Пример 1. Постройте график функции.

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}, & \text{при } x < 1 \\ x - 2, & \text{при } x \geq 1 \end{cases}$$


График данной функции состоит из части графика прямой $y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ слева от точки $x = 1$ и части графика прямой $y = x - 2$ справа от $x = 1$. Так как $f(1) = -1$, то график “ломается” в вершине $(1; -1)$. Функция является непрерывной, если её график можно изобразить, “не отрывая” карандаша от бумаги. Функция представленная в данном примере непрерывная.



Пример 2. Постройте график функции

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } 0 \leq x < 1 \\ 1, & \text{при } 1 \leq x < 2 \\ 2, & \text{при } 2 \leq x < 3 \\ 3, & \text{при } 3 \leq x < 4 \end{cases}$$

Закрашенный кружочек показывает, что $f(2) = 2$.



Не закрашенный (выколотый) кружочек показывает, что $f(4) \neq 3$

Данная функция, каждому числу ставит в соответствие его целую часть, и в общем виде записывается как $f(x) = [x]$. График на рисунке соответствует функции целой части числа на промежутке $[0; 4)$.

Обучающие задания

11. Вычислите значения функции при заданных значениях аргумента.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 3, & x \leq 4 \\ 3x + 5, & x > 4 \end{cases} \quad \text{а) } x = 1,5 \quad \text{б) } x = 4 \quad \text{в) } x = -2 \quad \text{г) } x = 12$$




12. Для функции $f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$ найдите:

а) $f(-2)$ б) $f(-1)$ в) $f(0)$ г) $f(1)$ д) $f(4)$

13. Постройте график функции. По графику исследуйте непрерывность функции.

а) $f(x) = \begin{cases} x + 1, & -3 \leq x < 1 \\ 3x - 1, & 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$ б) $f(x) = \begin{cases} 4, & 0 \leq x < 2 \\ 5, & 2 \leq x < 4 \\ 6, & 4 \leq x < 6 \end{cases}$ в) $f(x) = \begin{cases} 1 - x, & x < 1 \\ x - 1, & x \geq 1 \end{cases}$

14. Запишите функции, соответствующие графикам.



15. Функция $M(x)$ показывает зависимость суммы (в манатах) от количества распечатанных фотографий.

$$M(x) = \begin{cases} 0,15x, & 0 < x \leq 25 \\ 0,10x, & 26 \leq x \leq 100 \\ 0,07x, & 101 \leq x \leq 500 \\ 0,05x, & 501 \leq x \end{cases}$$

- 1) Найдите сумму, уплаченную за 20 фотографий.
- 2) Верно ли, что для печати 150 фотографий надо заплатить меньше 10 манат?
- 3) Сколько фотографий можно напечатать на 40 манат?

16. Заработная плата работников фирмы выплачивается в зависимости от количества часов в соответствии с условием: до 40 часов в неделю 8 манат за каждый час, более 40 часов в неделю - в 1,5 раза больше нормы за каждый час.

- а) Запишите в виде кусочно- заданной функции, какую зарплату получают работники фирмы.
- б) Какую сумму получит работник за 48 часов?


Параллельный перенос

При параллельном переносе все точки графика смещаются в заданном направлении на заданное расстояние.

Произведём параллельный перенос каждой точки графика функции $y = f(x)$ на вектор $\langle m; n \rangle$: $A(a; b) \rightarrow A_1(a + m; b + n)$.



Если координаты точки A удовлетворяют равенству $b = f(a)$, то координаты точки A_1 удовлетворяют равенству $y - n = f(x - m)$.

Таким образом, при параллельном переносе графика функции $y = f(x)$ на вектор $\langle m; n \rangle$ получается график функции $y = f(x - m) + n$. Заданный график смещается на $|m|$ единиц по горизонтали (при $m > 0$ вправо, при $m < 0$ влево) и на $|n|$ единиц по вертикали (при $n > 0$ вверх, при $n < 0$ вниз).





В случае $n = 0$ график параллельно переносится только по горизонтали, и при этом получается новая функция $y = f(x - m)$.

Пример.



В случае $m = 0$ график параллельно переносится только по вертикали, и при этом получается новая функция $y = f(x) + n$.

Пример.



Обучающие задания

1. Для каждой функции определите значения m и n . Запишите, в каком направлении произошло смещение - по горизонтали или по вертикали?

а) $y - 4 = f(x)$ б) $y = f(x) - 4$ в) $y = f(x + 1)$ г) $y + 3 = f(x - 7)$

2. Преобразуйте заданные функции методом выделения полного квадрата. Объясните, какие преобразования надо выполнить, чтобы из графика функции $y = x^2$ получить графики данных функций.

а) $f(x) = x^2 + 2x + 1$

б) $g(x) = x^2 - 4x + 3$

Пример. Постройте графики заданных функций при помощи графика функции $f(x) = \sqrt{x}$.

а) $g(x) = \sqrt{x} - 1$

б) $h(x) = \sqrt{x - 1}$

в) $m(x) = \sqrt{x + 3} - 2$

Решение:

Построим график функции $f(x) = \sqrt{x}$. Область определения функции $[0; +\infty)$. Составим таблицу значений, выбрав три значения, которые являются полными квадратами.

x	f(x)	(x, f(x))
0	0	(0; 0)
1	1	(1; 1)
4	2	(4; 2)




График функции $f(x) = \sqrt{x}$ смещается на 1 единицу вниз, из ординаты каждой точки на графике вычитается 1.

$g(x) = f(x) - 1$








График функции $f(x) = \sqrt{x}$ смещается на 1 единицу вправо.

$h(x) = f(x - 1)$




$f(x) = \sqrt{x}$



$y = m_1(x) = f(x + 3) = \sqrt{x + 3}$

График функции смещается на 3 единицы влево.

$m_1(x) = f(x + 3)$



$y = m(x) = m_1(x) - 2 = \sqrt{x + 3} - 2$

График функции смещается на 2 единицы вниз.

$m(x) = f(x + 3) - 2$

Обучающие задания



3. Постройте графики заданных функций при помощи графика функции $f(x) = \sqrt{x}$. Опишите словесно каждый из этапов преобразования.

а) $g(x) = \sqrt{x} - 3$

б) $h(x) = \sqrt{x - 2}$

в) $m(x) = \sqrt{x - 1} + 2$

4. По графику опишите преобразование функции $f(x)$ в функцию $g(x)$.
- Запишите соответствие координат для 5 точек функций $f(x)$ и $g(x)$.
 - Полученную в результате преобразования функцию $g(x)$ представьте в виде $y = f(x - m) + n$.



5. Для каждого преобразования функции $y = f(x)$:


- Определите координаты преобразованных точек для точек A, B, C, D и E.
- Начертите график функции, полученной в результате преобразования.

а) $g(x) = f(x) + 2$

б) $g(x) = f(x - 3)$

в) $g(x) = f(x + 1)$

г) $g(x) = f(x) - 4$



6. Для каждого параллельного переноса определите значения m и n . Полученную в результате преобразования функцию запишите в виде $y = f(x - m) + n$. Запишите своё мнения об области определения и множестве значений функции.


а) $f(x) = |x|$, 4 единицы влево и 2 единицы вниз;

б) $f(x) = x^2$, 6 единиц вправо и 4 единицы вверх.

7. Функция $f(x) = \frac{1}{x}$ не определена в точке $x = 0$.
- В какой точке не определена функция $f(x - 3)$?
 - Изобразите графики функций $f(x)$ и $f(x - 3)$ в одной системе координат.

8. Маляр может определить количество краски n (в литрах), необходимой для покраски стен дома площадью s , функцией $n = f(s)$. Представьте ситуации соответствующие $n = f(s) + 10$ и $n = f(s + 10)$.


9. Улькер на велосипеде проделала путь от дома до озера, расположенного на окраине города, и обратно. Пройденный путь и затраченное время она изобразила на графике А. а) Как изменился бы график, если бы Улькер выехала из дома на 2 часа позже? б) Как вы представите ситуацию, соответствующую графику В на рисунке?



Отражение

Относительно оси ординат

Каждая точка на графике преобразуется в точку, симметричную относительно оси y .




$$(1; 2) \rightarrow (-1; 2)$$

$$(x; y) \rightarrow (-x; y)$$

Ордината точки остаётся неизменной, абсцисса меняет знак.

Относительно оси абсцисс

Каждая точка на графике преобразуется в точку, симметричную относительно оси x .




$$(1; 2) \rightarrow (1; -2)$$

$$(x; y) \rightarrow (x; -y)$$

Абсцисса точки остаётся неизменной, ордината меняет знак.

Относительно начала координат

Каждая точка на графике преобразуется в точку, симметричную относительно начала координат.



$$(1; 2) \rightarrow (-1; -2)$$

$$(x; y) \rightarrow (-x; -y)$$


Каждая координата точки меняет знак.

Отражение графиков функции

Относительно оси y

$$f(x) \rightarrow f(-x)$$


$$(x; y) \rightarrow (-x; y)$$



Относительно оси x

$$f(x) \rightarrow -f(x)$$


$$(x; y) \rightarrow (x; -y)$$



Относительно начала координат

$$f(x) \rightarrow -f(-x)$$

$$(x; y) \rightarrow (-x; -y)$$



Обучающие задания

10. Изобразите точки, полученные при отражении заданных точек относительно: а) оси x ; б) оси y и запишите их координаты.

$A(5; 3)$, $B(-5; -5)$, $C(0; -3)$, $D(-6; 2)$, $F(9; 0)$

11. Для каждой из заданных функций запишите основную функцию и её преобразования.

а) $y = -x^2$


б) $y = -\sqrt{x}$

в) $y = -\frac{1}{x}$

г) $y = \sqrt{-x}$

12. Изобразите графики функций $-f(x)$ и $f(-x)$, полученные из графика функции $f(x)$ симметричным преобразованием относительно координатных осей.

Пример. а) $f(x) = x + 1$



а) $f(x) = x + 1$

б) $f(x) = -x + 3$




в) $f(x) = (x - 1)^2$

г) $f(x) = \sqrt{x - 1}$

13. Запишите по шагам, при помощи каких преобразований из графика параболы $y = x^2$ получается график функции $y = -(x+1)^2 + 3$. Каждый шаг изобразите графически.


14. Выполните задания по графику.

- 1) Запишите формулу функции, отражённой относительно оси x .
- 2) Для каждой функции найдите область определения и множество значений.



15. Постройте графики требуемых функций, используя график основных функций.

- 1) Основная функция: $f(x) = x^3$



а) $f(x) = (x + 1)^3$


б) $f(x) = x^3 - 4$

в) $f(x) = -x^3$

г) $f(x) = -(x - 2)^3$

д) $f(x) = -x^3 + 3$

- 2) Основная функция: $g(x) = \sqrt[3]{x}$



а) $g(x) = \sqrt[3]{x} + 2$

б) $g(x) = \sqrt[3]{x} - 4$


в) $g(x) = -\sqrt[3]{x}$

г) $g(x) = \sqrt[3]{-x}$

д) $g(x) = -\sqrt[3]{x} - 3$


Сжатие и растяжение графиков

Растяжение от оси x в 2 раза



На графике каждая точка в 2 раза удаляется от оси абсцисс

Сжатие к оси x в 2 раза




На графике каждая точка в 2 раза приближается к оси абсцисс

При растяжении от (сжатии к) оси абсцисс изменяется ордината точки, при этом абсцисса остаётся неизменной: $(a; b) \rightarrow (a; l \cdot b)$

Если точка $A(a; b)$ расположена на графике функции $y = f(x)$, то $b = f(a)$. Тогда точка $A_1(a; l \cdot b)$ расположена на графике функции $y = l \cdot f(x)$.


График функции $y = l \cdot f(x)$ получается из графика функции $f(x)$ растяжением в l раз от **оси абсцисс** при $l > 1$ и сжатием к **оси абсцисс** в $\frac{1}{l}$ раз при $0 < l < 1$.

Растяжение от оси y в 2 раза



На графике каждая точка в 2 раза удаляется от оси ординат

Сжатие к оси y в 2 раза



На графике каждая точка в 2 раза приближается к оси ординат

При растяжении от (сжатии к) оси ординат изменяется абсцисса точки, при этом ордината остаётся неизменной: $(a; b) \rightarrow (k \cdot a; b)$

Если точка $A(a; b)$ расположена на графике функции $y = f(x)$, то $b = f(a)$.

Тогда точка $A_1(k \cdot a; b)$ расположена на графике функции $y = f(\frac{x}{k})$.

График функции $y = f(\frac{x}{k})$ получается из графика функции $f(x)$ растяжением в k раз от **оси ординат** при $k > 1$ и сжатием в $\frac{1}{k}$ раз к **оси ординат** при $0 < k < 1$.



16. Постройте график функции, используя график основной функции.

а) $y = 2x^2$ б) $y = 2(x-1)^2$ в) $y = 3|x|$ г) $y = -|3x|$

17. Изобразите преобразования, при помощи которых получены следующие функции.

$$f(x) = \sqrt{x} \rightarrow g(x) = 2\sqrt{x} \rightarrow h(x) = 2\sqrt{x-2} \rightarrow k(x) = -2\sqrt{x-2} + 3$$

18. График функции $g(x)$ получен преобразованием графика функции $f(x)$. Напишите формулу функции $g(x)$.



19. Запишите, с помощью каких преобразований из основной функции $f(x)$ получены следующие функции.

1) $f(x) = x^2$ а) $y = 2x^2 + 3$ б) $y = 2(x-3)^2$ в) $y = 2(x-1)^2 + 3$

2) $f(x) = \sqrt{x}$ а) $y = 2\sqrt{x}$ б) $y = \sqrt{2x}$ в) $y = 2\sqrt{x-1} + 1$

20. Вопрос открытого типа. Запишите функцию, полученную из основной функции $f(x)$, в результате требуемых преобразований.

а) параллельным переносом: • налево • направо • вверх • вниз


б) отражением: • относительно оси x • относительно оси y

в) растяжением: • от оси x • от оси y

г) сжатием: • к оси x • к оси y

1) $f(x) = x^3$ 2) $f(x) = |x|$ 3) $f(x) = \sqrt{x}$ 4) $f(x) = \frac{1}{x}$

21. Прикладное искусство. На коврах можно наблюдать узоры, созданные преобразованием определённых графиков. В результате каких преобразований над функциями получены узоры на ковре вида килим на рисунке?




Исследование. Цена 1 литра бензина 0,95 манат. Автомобиль Фариды расходует 0,08 л бензина на каждый километр.

а) Если Фарид проедет 50 км, то как вы сможете посчитать, какую сумму он потратит? За сколько шагов можно выполнить эти вычисления?


б) Зависимость между объёмом бензина и пройденным путём задайте функцией $V(d)$; в) Зависимость между суммой за бензин и объёмом бензина задайте функцией $M(V)$; г) Запишите функцию $M(d)$, связывающую путь, который проделал Фарид и сумму, потраченную на бензин, объединив функции пункта б) и в). Какие переменные, в данном случае, формируют аргумент?

Сложная функция

Во многих случаях значения, которые может принимать аргумент функции, можно определить через значения других функций. Пусть заданы функции f и g . Рассмотрим схематическое представление двух ситуаций.



1. Если числа x принадлежат области определения функции g , а $g(x)$ - принадлежат области определения функции f , то в этом случае функция, которая каждому числу $x \in D(g)$ ставит в соответствие число $f(g(x))$, для функций f и g называется сложной функцией (композицией) и записывается так $(f \circ g)(x)$: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.



2. Если числа x принадлежат области определения функции f , а $f(x)$ - области определения функции g , то для функций g и f композицией $(g \circ f)(x)$ будет: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Обратите внимание! Запись $(f \circ g)(x)$ и $(g \circ f)(x)$, (так же как и запись $f(g(x))$ и $g(f(x))$) выражают две различные функции. Композиция $f(g(x))$ имеет смысл если $E(g) \subset D(f)$, а композиция $g(f(x))$, если $E(f) \subset D(g)$.



Из схемы видно, что композиция $f(g(x))$ получается, если в функции $f(x)$ аргумент x заменить функцией $g(x)$. Аналогично, композиция $g(f(x))$ получается, если в функции $g(x)$ аргумент x заменить функцией $f(x)$.

Пример 1. Для функций $f(x) = x + 2$ и $g(x) = x^2 - 2x - 3$:

а) запишите формулы композиций $(f \circ g)(x)$ и $(g \circ f)(x)$;

б) найдите значения композиций $(f \circ g)(x)$ и $(g \circ f)(x)$ при $x = 3$.

Решение: а) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 2x - 3) = x^2 - 2x - 3 + 2 = x^2 - 2x - 1$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 2) = (x + 2)^2 - 2(x + 2) - 3 = x^2 + 2x - 3$

Таким образом, $f(g(x)) = x^2 - 2x - 1$ и $g(f(x)) = x^2 + 2x - 3$

б) $(f \circ g)(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 - 1 = 2$

$(g \circ f)(3) = 3^2 + 2 \cdot 3 - 3 = 12$

Пример 2. Дано: $h(x) = f(g(x))$, запишите формулы для функции $f(x)$

а) $h(x) = (x - 2)^2 + (x - 2) + 1$; $g(x) = x - 2$

б) $h(x) = \sqrt{x^3 + 1}$; $g(x) = x^3 + 1$

Решение: а) $f(g(x)) = (g(x))^2 + g(x) + 1$; $f(x) = x^2 + x + 1$

б) $f(g(x)) = \sqrt{g(x)}$; $f(x) = \sqrt{x}$

Обучающие задания

1. Даны функции $f(x) = x^2$ и $g(x) = \sqrt{x} - 1$. Найдите:
а) $f(g(4))$; б) $g(g(25))$; в) $g(f(3))$; г) $g(g(4))$; д) $f(f(-3))$.

2. Для функций $f(x) = 4x$, $g(x) = 2x^2 - 1$ и $h(x) = x^2 + 1$ вычислите:

а) $f(g(-1))$

б) $h(g(2))$

в) $g(f(3))$

г) $f(h(-4))$

д) $g(g(-2))$

е) $f(f(-3))$

ж) $(f \circ (h \circ g))(1)$

з) $(h \circ (g \circ f))(\frac{1}{2})$

и) $(f \circ (g \circ h))(2)$

3. Для функций $f(x) = 2x + 1$ и $g(x) = x^2 - 3$ запишите формулы сложных функций.

а) $f(g(x))$

б) $g(f(x))$

в) $f(f(x))$

г) $g(g(x))$

4. Даны функции $f(x)$ и $g(x)$. Найдите $f(g(x))$ и $g(f(x))$.

а) $f(x) = 1 - x^2$ и $g(x) = 2x + 5$

б) $f(x) = 2x$ и $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

в) $f(x) = \sqrt{x - 1}$ и $g(x) = x^2 + 2$

г) $f(x) = x^2 + 1$ и $g(x) = \frac{2}{x}$

д) $f(x) = x^3 - 4$ и $g(x) = \sqrt[3]{x + 4}$

е) $f(x) = x^2 + 3x + 1$ и $g(x) = x + 1$

5. а) Решите неравенство $f(g(x)) < 0$, если $f(x) = x^2 - 5$, $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

б) Решите неравенство $f(g(x)) > 0$, если $f(x) = x^2 - 4$, $g(x) = x + 1$.

6. Даны функции $f(x) = |x|$ и $g(x) = x - 1$. Постройте графики композиций а) $y = f(g(x))$, б) $y = g(f(x))$.
Покажите область определения и множество значений.
7. а) Известно, что $f(x) = 2x - 1$ и $g(x) = x^2$. Составьте формулу для функции $f(g(x))$.
б) В одной системе координат постройте графики функций $f(x)$, $g(x)$ и $f(g(x))$.
в) Опишите преобразование графика функции $g(x)$ в график функции $f(g(x))$.
8. Если $h(x) = f(g(x))$, то запишите формулу функции $f(x)$.
а) $h(x) = (x+1)^2 - 5(x+1)$, $g(x) = x+1$ б) $h(x) = x^2 + 4x + 3$, $g(x) = x+2$
в) $h(x) = \sqrt{2x+3}$, $g(x) = x+1$ г) $h(x) = x + \sqrt{x-1}$, $g(x) = \sqrt{x-1}$
9. а) Для функции $f(x-1) = x+3$ найдите значения $f(1)$, $f(4)$, $f(-1)$, $f(0)$.
Запишите формулу для функции $f(x)$.
б) Для функции $f(x+1) = 2x+3$ найдите значения $f(-1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(0)$.
Запишите формулу для функции $f(x)$.
10. Дана функция $f(x) = \sqrt{25-x^2}$.
а) Найдите область определения функции $f(x)$, составьте таблицу значений и постройте график.
б) Запишите выражение для функции $f(2x)$, найдите область определения.
11. Отрезок $[-1; 3]$ является областью определения функции $f(x)$. Найдите область определения следующих функций:
а) $f(2x)$; б) $f(\frac{1}{2}x)$; в) $f(-x)$; г) $f(x-1)$
12. **Производство.** Количество стульев, производимых фирмой по производству мебели еженедельно с 2012 года, можно смоделировать формулой $N(t) = 144 + 25t$. Здесь, t - время (в годах) (значение $t = 0$ соответствует 2012 году), N - количество стульев. В этом случае объём рабочей силы можно определить как $W(N) = 3\sqrt{N}$.
а) Запишите функцию спроса на рабочую силу, в зависимости от времени.
б) Для данной функции представьте область определения и множество значений для реальной жизненной ситуации.


- Исследование:** 1) Запишите формулу площади квадрата со стороной a .
 2) По заданной площади найдите длину стороны квадрата.
 3) Расстояние от поверхности земли до тела, брошенного с начальной скоростью v_0 , находится по формуле $h = v_0 t - \frac{g t^2}{2}$.

Можно ли при заданном значении h найти однозначно значение t ?


Обратная функция

Если для заданной функции f обратное соответствие также является функцией, то функция f называется обратимой функцией.

Пример 1. На рисунке зависимость f между множествами X и Y задана стрелками. Поменяв направление стрелок, получим зависимость g - зависимость между множествами Y и X . Соответствие g является обратным для f .



Пример 2. Из множества $A = \{1, 2, 3, 4\}$ можно получить множество $B = \{5, 6, 7, 8\}$ при помощи функции $f(x) = x + 4$ следующим образом:
 $f(x) = x + 4: \{(1; 5), (2; 6), (3; 7), (4; 8)\}$



Функция, обратная для данной функции, обозначается f^{-1} и выражает как, из элементов множества B можно получить элементы множества A .
 $f^{-1}(x) = x - 4: \{(5; 1), (6; 2), (7; 3), (8; 4)\}$

Функции $f(x)$ и $f^{-1}(x)$ называются взаимно обратными функциями.

Как из схемы, так и из пар координат видно, что область определения заданной функции является множеством значений для обратной функции, а множество значений заданной функции - областью определения для обратной функции и наоборот. Таким образом, $D(f) = E(f^{-1})$, $E(f) = D(f^{-1})$. Из определения, $f(f^{-1}(x)) = x$ и $f^{-1}(f(x)) = x$. Для данного примера имеем:

$$f(f^{-1}(x)) = f(x - 4) = (x - 4) + 4 = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(x + 4) = (x + 4) - 4 = x$$

Для любой ли функции существует обратная функция? Например, из зависимости $y = 2x + 5$ переменную x можно единственным образом выразить через y , и обратная функция имеет вид: $x = \frac{y - 5}{2}$.
 Здесь каждому значению y соответствует единственное значение x .

У функции $y = x^2$ одному значению y , например, для $y = 9$, соответствует два значения аргумента $x = 3$ и $x = -3$ и на промежутке $(-\infty; +\infty)$ для неё не существует обратной функции.

Обратить можно ту и только ту функцию, которая каждое свое значение принимает в единственной точке области определения.

Если любая горизонтальная прямая пересекает график функции как максимум в одной точке, то для неё существует обратная функция.

Другими словами, если различным значениям x соответствуют различные значения y , то для функции $y = f(x)$ существует обратная функция.


Так как для монотонной функции при $x_1 \neq x_2$ имеем $f(x_1) \neq f(x_2)$, то:

- 1) Для возрастающей на области определения функции существует обратная функция.
- 2) Для убывающей на области определения функции существует обратная функция.

Пусть $y = f(x)$ функция для которой существует обратная функция, т.е. в отношении $y = f(x)$ можно однозначно выразить x через y и записать в виде $x = f^{-1}(y)$. Тогда функция $x = f^{-1}(y)$ называется обратной для функции $y = f(x)$. Обычно, аргумент обозначается через x , а функция обозначается через y . Поэтому функция, обратная для $y = f(x)$, записывается как $y = f^{-1}(x)$. Если f^{-1} функция, обратная для функции f , то функция f является обратной функцией для функции f^{-1} . Функции f и f^{-1} являются взаимно обратными функциями.

Графики взаимно обратных функций.


Если точка $(a; b)$ расположена на заданном графике, то точка $(b; a)$ будет расположена на графике обратной функции.



Заданная функция

x	-2	-1	0	1	2
y	4	2	0	-2	-4


График заданной функции




Обратная функция

x	4	2	0	-2	-4
y	-2	-1	0	1	2

График обратной функции



Пример отражения относительно оси $y = x$



Графики взаимно обратных функций симметричны относительно прямой $y = x$.

Для того, чтобы найти обратную функцию по формуле, надо:

- 1) Выразить переменную x через y .
- 2) В полученном равенстве вместо x запишем y , вместо y запишем x .

Пример 3. Запишем обратную функцию для функции $y = 2x - 3$

Решение:

Запишем функцию:


$$y = 2x - 3$$

выразим переменную x через y :

$$x = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$$

поменяем местами x и y :

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$



На всей числовой оси для функции $y = x^2$ не существует обратной функции. Однако на промежутках возрастания или убывания для этой функции обратная функция существует.


Пример 4. Для функции $y = x^2$ зададим обратную функцию при $x \geq 0$ и построим их графики в одной системе координат. Запишем координаты нескольких точек, расположенных на этом графике.

Решение: Заданная функция: $y = x^2, x \geq 0$.

Обратная функция: 1) $x = \sqrt{y}$, 2) $y = \sqrt{x}$

Точка $(2, 4)$ расположена на графике функции $y = x^2, x \geq 0$,

а точка $(4; 2)$ на графике обратной функции $y = \sqrt{x}$.



Для обратной функции справедлива следующая теорема:

Если функция f с областью определения X и множеством значений Y возрастающая (убывающая), то для неё существует обратная функция f^{-1} , определённая на промежутке Y , которая также является возрастающей (убывающей).

Обучающие задания

1. Используя данные в таблице, составьте таблицу значений для обратной функции.

x	1	2	3	4	5
y	-1	-2	-3	-4	-5

2. Функции $f(x)$ и $g(x)$ взаимно обратные функции. При $x = 10$ значение $f(x)$ равно 85. Как эти значения могут относиться к функции $g(x)$?
3. Функция f задана множеством точек. Так же известно, что вторые координаты некоторых точек одинаковы (например, как $(6; 5)$ и $(7; 5)$). Достаточно ли информации, чтобы установить, является ли обратная функция f обратимой функцией?
4. Если функция $f(x)$ имеет обратную функцию и $f(1) = 7$, $f(-3) = 9$, $f(6) = 2$, то найдите значения $f^{-1}(9)$, $f^{-1}(7)$ и $f^{-1}(2)$.
5. Для заданных функций запишите взаимно обратные функции. Установите, возрастающими или убывающими являются заданная и обратная функции.

а) $y = 4x$

б) $y = 2x - 8$

в) $y = -2x + 5$

г) $y = 12x + 6$

д) $y = -\frac{2}{3}x$

е) $y = \frac{3}{4}x + 6$




6. В одной системе координат постройте графики для заданных функций и функций, обратных заданным.

а) $f(x) = 4x$

б) $f(x) = 2x - 3$

в) $f(x) = x^2, x \geq 0$

7. Для графика на рисунке, постройте график обратной функции. Найдите область определения и множество значений.



8. Покажите, что для данной функции существует обратная.

1) Найдите обратную функцию

2) Укажите область определения, множество значений

3) Постройте её график.

а) $f(x) = x^3$

б) $f(x) = x^4, x \geq 0$

в) $y = \frac{1}{x-1}$

9. Постройте графики заданных функций. Определите, имеет ли функция обратную функцию.

а) $y = -2x + 3$

б) $y = x + 3$

в) $y = x^2 + 1$

г) $y = x^3 + 3$

д) $y = |x| + 2$

е) $y = (x + 1)(x - 3)$

10. Установите, являются ли функции взаимно обратными.

а) $f(x) = x + 7, g(x) = x - 7$

б) $f(x) = 3x - 1, g(x) = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$

в) $f(x) = \frac{1}{2}x + 1, g(x) = 2x - 2$

г) $f(x) = -2x + 4, g(x) = -\frac{1}{2}x + 2$

д) $f(x) = \frac{2}{x} - 3, g(x) = \frac{2}{x+3}$

е) $f(x) = \frac{1}{x-3}, g(x) = \frac{1+3x}{x}$

11. Для каждой степенной функции запишите формулу соответствующей обратной функции.

а) $f(x) = \frac{1}{4}x^4, x \geq 0$

б) $f(x) = 16x^4, x \leq 0$

в) $f(x) = -8x^3$

12. Формула $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ выражает зависимость температуры в градусах Цельсия от температуры по Фаренгейту. Для данной зависимости задайте формулу обратной зависимости, преобразовывающую температуру по Фаренгейту в температуру в градусы Цельсия. Найдите значение температуры по Фаренгейту для $15^\circ\text{C}, 20^\circ\text{C}, 0^\circ\text{C}$.

13. Хек - один из видов рыб. Между массой (в кг) и длиной (в см) для этого вида рыб установлена следующая зависимость: $m = (9,37 \times 10^{-6})l^3$.

а) Запишите функцию, обратную для данной зависимости.

б) Сколько сантиметров, приблизительно, составляет длина рыбы массой 0,875 кг?

Если для функции, заданной аналитически, область определения не указана, то под областью определения функции подразумеваются такие значения аргумента, при которых формула, при помощи которой задана функция, имеет смысл (такие значения x называются естественной областью определения функции). В этом случае необходимо выяснить, какие значения не может принимать аргумент.

Найдём область определения некоторых функций, заданных в алгебраической форме.

1. Если функция от независимой переменной **задана в виде многочлена**, то область определения такой функции множество всех действительных чисел. Например, область определения функции $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ является: $(-\infty; +\infty)$.

2. В рациональной функции значение выражения, стоящего в знаменателе не может равняться нулю. Например, для рациональной функции $g(x) = \frac{2x-1}{x^2-4}$ значения аргумента, которые удовлетворяют условию $x^2 - 4 = 0$, не входят в область определения функции. Это значения $x = -2$ и $x = 2$, т.е. функция $g(x)$ определена на множестве $(-\infty; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; +\infty)$

3. Подкоренное выражение **функции, содержащей квадратный корень** не может принимать отрицательных значений. Исследуем это на двух примерах:

1. Область определения функции $y = \sqrt{2x-6}$ все значения x удовлетворяющие условию $2x - 6 \geq 0$, $x \geq 3$, т.е. промежутку $[3; +\infty)$. С другой стороны, если $2x - 6 \geq 0$, то $\sqrt{2x-6} \geq 0$, т.е. $y \geq 0$. А это значит, что область значений функции $y = \sqrt{2x-6}$ промежуток $[0; +\infty)$.

2) Найдём область определения и множество значений функции $y = \sqrt{4-x^2}$. По определению квадратного корня $4 - x^2 \geq 0$. Решением данного неравенства является отрезок $[-2; 2]$. Значит функция определена на отрезке $[-2; 2]$. Для любого x из области определения $0 \leq 4 - x^2 \leq 4$.

Отсюда $0 \leq \sqrt{4-x^2} \leq \sqrt{4}$, т.е. $0 \leq y \leq 2$. Другими словами, множеством значений является отрезок $[0; 2]$.

Обучающие задания

1. Найдите (если это возможно) $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$.
Обоснуйте ответ, если соответствующее значение найти невозможно.

а) $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$

б) $f(x) = \sqrt{x+1}$

в) $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$

2. Найдите область определения и множество значений каждой функции.

а) $f(x) = x^2$

б) $f(x) = |x|$

в) $f(x) = \frac{1}{x}$

г) $f(x) = x^3$

д) $f(x) = \sqrt{x}$

3. Найдите область определения функции.

а) $y = \frac{x-2}{x^2}$

б) $y = \frac{x-3}{x^2-x-2}$

в) $y = \sqrt{3-x}$

г) $y = \sqrt{1-x^2}$

д) $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}$

е) $y = \frac{\sqrt{x}}{x-2}$

4. Найдите область определения и множество значений каждой функции.

а) $f(x) = 2x - 3$

б) $g(x) = -3(x+1)^2 + 6$

в) $h(x) = \sqrt{2-x}$

г) $\varphi(x) = \sqrt{x^2+9}$

д) $u(x) = \sqrt{9-x^2}$

е) $v(x) = \sqrt{4-(x-1)^2}$

5. Найдите область определения.

а) $f(x) = \frac{\sqrt{2x-x^2}}{x-1}$

б) $f(x) = \sqrt{\frac{2x-x^2}{x-1}}$

в) $f(x) = \frac{\sqrt{2x-x^2}}{\sqrt{x-1}}$


6. График функции $y = \sqrt{x^2 - mx} + 8$ проходит через точку $M(2; 2)$. Найдите наименьшее значение и укажите множество значений функции.

7. Лестница длиной 3 м прислонена к стене. Нижний конец находится на d метров от стены, а верхний - на высоте h метров.

а) Запишите формулу зависимости высоты от расстояния $h(d)$.

б) Установите область определения, множество значений функции и постройте график.

в) Изобразите положение лестницы при $d = 0$ м и $d = 3$ м.



8. Какое утверждение верно для данной функции?

а) Область определения: $(-1; 2)$

Множество значений: $(2; 5)$

б) Область определения: $[-1; 2]$


Множество значений: $(1; 5)$

в) Область определения: $[-1; 2)$

Множество значений: $[1; 5)$

г) Область определения: $[-1; 2]$

Множество значений: $[1; 5]$



9. **Задача открытого типа.** Запишите функцию, областью определения которой является множество:

а) всех действительных чисел;

б) всех действительных чисел, кроме 2;

в) всех действительных чисел не меньше 4;


г) всех действительных чисел не больше 3.

1. Постройте графики функций $g(x) = -\sqrt{x}$, $k(x) = \sqrt{-x}$, $h(x) = \sqrt{x} + 2$, используя преобразования графика основной функции $f(x) = \sqrt{x}$. Как при этом изменится область определения и множество значений функции?

2. а) На сколько единиц по горизонтали нужно параллельно перенести график функции $f(x) = x^2$, чтобы он прошёл через точку (5; 16)?
 б) На сколько единиц надо сдвинуть график функции $f(x) = \sqrt{x}$ вдоль оси y , чтобы график прошёл через точку (4; -1)?

3. а) Запишите функцию $g(x)$, обратную для функции $f(x) = x^3 - 1$.

б) Для графика на рисунке постройте график обратной функции.



4. Найдите область определения функций.

а) $f(x) = \sqrt{4x - 2}$	в) $f(x) = \frac{4}{\sqrt{4-x}}$	д) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2 - 2x - 3}$
б) $f(x) = \sqrt{12 - 3x}$	г) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$	е) $f(x) = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$

5. Найдите нули функции.

а) $f(x) = 4x + 6$	в) $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$	д) $f(x) = 3 - \sqrt{5 + x^2}$
б) $f(x) = x^2 - x - 6$	г) $f(x) = x^4 - 1$	е) $f(x) = \sqrt{x-1} - 2$


6. 1) Исследуйте функцию на чётность или нечётность.

а) $f(x) = (x - 2)^2 + (x + 2)^2$ б) $f(x) = (x - 4)^2 - (x + 4)^2$

2) Установите, является ли функция $y = x^2 + (m - 1)x + 3$ чётной или нечётной, если: а) $m = 1$; б) $m = 0$.

7. Известно, что $f(x) = x \cdot f(x - 1) + 2$. Найдите $f(2)$.

8. Дана часть графика функции $f(x)$ с областью определения $[-3; 3]$. Достройте график так, чтобы функция стала:
 а) нечётной; б) чётной. Покажите промежутки возрастания и убывания функции. Найдите экстремумы функций.



9. Постройте график кусочно - заданной функции.

$$а) f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{при } x \geq 1 \\ -x + 3, & \text{при } x < 1 \end{cases} \quad б) f(x) = \begin{cases} -1, & \text{при } x < -1 \\ x, & \text{при } -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & \text{при } x > 1 \end{cases}$$

10. При каких значениях аргумента значение функции:

$$а) f(x) = \sqrt{2x + 6} \text{ равно } 3; \quad б) f(x) = \frac{3x}{x^2 - 7} \text{ равно } \frac{1}{2}?$$

11. Даны $f: \{(0; 1), (1; 3), (2; 5), (3; 7)\}$ и $g(x) = 2x + 1$.

Найдите значение сложной функции для заданных значений переменных.

$$\begin{array}{llll} а) (g \circ f)(0) & б) (g \circ f)(1) & в) (g \circ f)(2) & г) (g \circ f)(3) \\ д) (f \circ g)(-0,5) & е) (f \circ g)(0) & ж) (f \circ g)(1) & з) (f \circ g)(0,5) \end{array}$$

12. 1) Покажите, что на промежутке $(-\infty; +\infty)$ следующие функции не имеют обратной функции.

$$а) f(x) = x^2 - 6x \quad б) f(x) = |x + 10|$$

2) Для следующих обратимых функций напишите соответствующие им обратные функции.

$$а) f(x) = \frac{1}{2x - 1} \quad б) f(x) = \frac{1 - x}{x - 2}$$

13. Для функции $f(x) = \frac{x + 2}{x - 1}$ найдите:

а) область определения; б) решения неравенства $f(x - 4) < 0$


14. Время, затраченное на один полный период колебания математического маятника (период колебания), зависит от длины маятника. Чем длиннее маятник, тем больше времени тратится.

а) По данной информации постройте график.

б) Определите, к какому классу принадлежит функция?

в) Если длина маятника равна 5 м; 12 м по графику найдите период колебания.

Длина маятника (м)	Время (мин.)
2	2,8
4	4
6	4,9
8	5,7
10	6,3



2

Точка, прямая и плоскость в пространстве

Точка, прямая и плоскость в пространстве

Параллельность прямой и плоскости

Перпендикулярность прямой и плоскости

Теорема о трёх перпендикулярах

Взаимное расположение плоскостей

Двугранный угол



Перпендикулярные плоскости

Параллельные плоскости



Практическая работа. Отметьте на листе бумаги точки А, В, С, D и Е и сложите лист по прямой, проходящей через точку А, как показано на рисунке. Затем раскройте лист. Каждая из частей листа, сложенного пополам, является моделью плоскости.

1. Какая из точек принадлежит каждой из плоскостей?
2. Укажите точки, принадлежащие и не принадлежащие каждой плоскости.



Раздел геометрии, который занимается изучением пространственных фигур, называется стереометрией. Принято считать, что точка, прямая и плоскость также являются пространственными фигурами. Плоскость бесконечна и, обычно, её условно изображают в виде параллелограмма и обозначают одной маленькой буквой или тремя буквами (указывающие три точки, не расположенные на одной прямой). Например, плоскость α или плоскость ABC.



Аксиома 1. Какова бы ни была плоскость, существуют точки, принадлежащие этой плоскости, и точки, не принадлежащие ей.


точка А принадлежит плоскости α .
 $A \in \alpha$



точка N не принадлежит плоскости α .
 $N \notin \alpha$

Аксиома 2. Если у двух различных плоскостей есть общая точка, то они пересекаются по прямой, проходящей через эту точку.


Прямая задаётся двумя точками, то есть через две точки можно провести одну и только одну прямую (а сколько прямых можно провести через одну точку?). Сколькими точками задаётся плоскость? Двумя точками плоскость задать нельзя. Как видно по рисунку, через точки А и В можно провести бесконечно много плоскостей. Однако, среди этих плоскостей есть такая плоскость, что точка С расположена на ней. Значит, плоскость можно задать тремя точками, не лежащими на одной прямой.



Аксиома 3. Через три точки, не лежащие на одной прямой можно провести плоскость и притом только одну.

Точки, расположенные на одной прямой, называются **коллинеарными точками**.

Покажем, что если две точки прямой принадлежат плоскости, то все точки прямой принадлежат этой плоскости.




Пусть точки A и B прямой l принадлежат плоскости α . Возьмём точку P , которая не принадлежит прямой l и плоскости α .

Через точки P , A и B проведём плоскость β . Так как плоскости α и β пересекаются по линии, проходящей через точки A и B , то она совпадает с прямой l . Все точки линии пересечения принадлежат плоскости α , т.е. все точки прямой l также принадлежат плоскости α .

Из аксиом стереометрии вытекают следующие следствия.

1. Через прямую и точку вне её можно провести плоскость, и притом только одну.




2. Через две пересекающиеся прямые можно провести плоскость, и притом только одну.



3. Через две параллельные прямые можно провести плоскость, и притом только одну.

Таким образом плоскость можно задать:


- 1) прямой и точкой не принадлежащей этой прямой;
- 2) двумя пересекающимися прямыми;
- 3) двумя параллельными прямыми.



Пример. Даны три точки A , B и C , не лежащие на одной прямой и точка P , не лежащая с ними в одной плоскости. Запишите названия всех плоскостей, проходящих через каждые три из них.

Решение: Через точки A , B и C проведём плоскость α и отметим точку P вне этой плоскости. Через эти точки можно провести 4 плоскости – ABP , BPC , ABC и APC .


Точки, принадлежащие одной плоскости, называются **компланарными**. Точки A , B , C и P из примера некопланарные.



Обучающие задания


1. При помощи каких букв вы бы назвали плоскость α ?

а) ABE б) ACE в) BDE г) DAC





2. Точки B, C и D лежат на одной прямой (коллинеарные), точки A, B, C и D лежат в одной плоскости (компланарные), а точка E расположена вне плоскости. Сколько плоскостей проходит через точки:

а) A, B и C б) B, C и D в) A, B, C и D г) A, B, C и E



3. Запишите плоскости, из которых состоят грани фигур.



4. а) Обычно фотографы для фиксации фотоаппарата используют трехногий штатив. Согласно какой аксиоме можно утверждать что, такой штатив более устойчив на земле?

б) Объясните, почему стол с четырьмя ножками порой не устойчив.

в) Как с помощью двух веревок, плотник может проверить устойчивость стола на четырех ножках? Объясните.






5. Нарисуйте фигуру по следующим данным: прямая AC расположена в плоскости α , точки B, E, A и C компланарны. Точка Z коллинеарна точкам A и C, а точка X коллинеарна точкам B и E.

6. а) Сколько плоскостей можно провести через три попарно пересекающиеся прямые?


б) Сколько плоскостей можно провести через четыре различные точки? Рассмотрите все возможные случаи.

Взаимное расположение прямых в пространстве


Две прямые в пространстве могут быть параллельными (в частном случае совпадать) или пересекаться.



Параллельные прямые лежат в одной плоскости и не пересекаются. Если две пересекающиеся прямые, пересекаются с третьей в одной точке, то они могут быть расположены как в одной плоскости, так и в разных.




Прямые расположены в одной плоскости. Они компланарные.




Прямые расположены в различных плоскостях. Они некомпланарные.

Две не параллельные прямые в пространстве не всегда пересекаются. Прямые, которые не параллельны и не пересекаются, называются **скрещивающимися** прямыми.




Если одна из двух прямых лежит в некоторой плоскости, а другая прямая пересекает эту плоскость в точке, не лежащей на первой прямой, то эти прямые скрещиваются.



Скрещивающиеся прямые a и b обозначаются так: $a \not\parallel b$. Через скрещивающиеся прямые нельзя провести плоскость. Угол между скрещивающимися прямыми называется углом, между пересекающимися прямыми, которые параллельны данным скрещивающимся прямым.


Пример. На модели куба $A_1 D_1 \not\parallel B_1$.

Так как $A_1 D_1 \parallel B_1 C_1$, то угол между скрещивающимися прямыми $A_1 D_1$ и B_1 равен углу между прямыми $B_1 C_1$ и B_1 , т.е. 90° .




Обучающие задания


7. При помощи прямых, содержащих отрезки на рисунке, выполните следующие задания:
- Перечислите параллельные прямые.
 - Покажите скрещивающиеся прямые.
 - Покажите прямую, пересекающую две пересекающиеся прямые, не лежащую с ними в одной плоскости.



8. а) Запишите прямые параллельные прямой AB
 б) Запишите прямые пересекающиеся прямой BC
 в) Запишите прямые скрещивающиеся с прямой EF
 г) Покажите три точки компланарные точке B
 д) Покажите три точки некомпланарные точке B
 е) Покажите прямые пересекающиеся с плоскостью ABC
 ж) Покажите прямые расположенные на плоскости CDF
 з) Найдите угол между прямыми AB и CG.
 и) Найдите угол между прямыми AB и DG.




9. На прямоугольном параллелепипеде $AB = AD = 3$, $AE = 4$. Найдите синус угла между прямыми DG и BH.




10. Прямые a и b лежат на одной плоскости. В каких взаимных расположениях могут находиться эти прямые?
- могут пересекаться
 - могут быть параллельны
 - могут быть скрещивающимися
11. Эльвин утверждает, что скрещивающимися линиям можно дать и такое определение: «Если две прямые не лежат в одной плоскости, то эти прямые - скрещивающиеся.» Верна ли эта мысль?
12. a и b - скрещивающиеся прямые. Точки A и B лежат на прямой a , а точки C и D — на прямой b . Исследуйте варианты взаимного расположения прямых AC и BD.

Взаимное расположение прямой и плоскости


Если прямая имеет с плоскостью одну общую точку, прямая пересекает плоскость. $l \cap \alpha = A$



Если прямая имеет с плоскостью две общие точки, то она полностью лежит в этой плоскости. $l \subset \alpha$



Если прямая не имеет общей точки с плоскостью, то прямая и плоскость параллельны. $l \parallel \alpha$




Обучающие задания

13. Какие предложения верны?


- Если две точки прямой принадлежат плоскости, то прямая пересекает эту плоскость.
- Через данную прямую можно провести только две плоскости.
- Через прямую и через точку, не лежащую на ней, можно провести только одну плоскость.
- Если одна из двух прямых лежит в плоскости, а другая пересекает эту плоскость в точке, не принадлежащей первой прямой, то эти две прямые скрещиваются.

14. Через середину M отрезка AB проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках A_1, B_1, M_1 . Найдите длину отрезка MM_1 , если:

- $AA_1 = 12$ см, $BB_1 = 4$ см;
- $AA_1 = a$, $BB_1 = b$.



15. Конец A отрезка AB расположен на плоскости α . Из конца отрезка B и точки C , расположенной на отрезке, проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α соответственно в точках B_1 и C_1 . Найдите длину отрезка CC_1 , если $AC : CB = 3 : 2$ и $BB_1 = 10$ см.




16. Дан параллелограмм $ABCD$ и не пересекающая его плоскость α . Из вершин параллелограмма проведены параллельные прямые, которые пересекают плоскость α в точках A_1, B_1, C_1, D_1 . Найдите длину отрезка DD_1 , если $AA_1 = 3$ см, $BB_1 = 4$ см, $CC_1 = 7$ см.

17. Концы отрезка прямой не пересекающего плоскость, удалены от плоскости на расстояния 15 см и 25 см. Точка делит отрезок как 3 : 7. Найдите расстояние от этой точки до плоскости (рассмотрите два случая).

Теорема 1. (Признак параллельности прямой и плоскости) Если прямая, не лежащая в данной плоскости, параллельна какой-нибудь прямой на этой плоскости, то эта прямая параллельна данной плоскости.

Доказательство. Пусть прямая a , не принадлежащая плоскости α параллельна прямой b , принадлежащей этой плоскости. Через прямые a и b проведём плоскость β . Тогда плоскости α и β пересекаются по прямой b . Если прямая a пересекает плоскость α , то точка пересечения должна быть расположена на прямой b , что невозможно при $a \parallel b$. Значит $a \parallel \alpha$.




Следствие. Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой плоскости и пересекает эту плоскость, то линия пересечения параллельна этой прямой.

Следствие. Если прямая параллельна каждой из двух пересекающихся плоскостей, то она параллельна линии их пересечения.

Теорема 2. Если плоскости, проходящие через две параллельные прямые пересекаются, то линия пересечения параллельна этим прямым.


Доказательство: Предположим, что $a \parallel b$. Проведём плоскости α и β соответственно через прямые a и b . Обозначим линию пересечения через c . По признаку параллельности прямой и плоскости $a \parallel \beta$. Отсюда $a \parallel c$. Аналогично, если $b \parallel \alpha$, то $b \parallel c$.




Обучающие задания

- а) Через данную точку проведите прямую, параллельную данной плоскости. Сколько таких прямых можно провести?
 б) Через данную точку проведите плоскость, параллельную данной прямой. Сколько таких плоскостей можно провести?
- Одна из сторон параллелограмма лежит в плоскости α . Каково расположение остальных сторон относительно плоскости α ?
- Плоскость, параллельная стороне AB треугольника ABC , пересекает сторону AC в точке A_1 , а сторону BC в точке B_1 . Найдите длину стороны A_1B_1 , если: а) $AB = 18$ см, $AA_1 : A_1C = 2 : 1$; б) $B_1C = 6$ см, $AB : BC = 3 : 4$; в) $AA_1 = a$, $AB = b$, $A_1C = c$.


- Дано:
 $BC \parallel a$
 $BC = a$
 $AD = b$
 $DF = c$
 Найдите: $EG = ?$



- K, E, L, F — середины отрезков MN, NP, MR, PR соответственно. Определите взаимное расположение прямых KL и EF .




Определение. Если прямая (a), пересекающая плоскость (α), перпендикулярна каждой прямой, которая лежит в данной плоскости и проходит через точку пересечения, то прямая (a) перпендикулярна плоскости (α) и это записывается так: $a \perp \alpha$









Теорема 1. (Признак перпендикулярности прямой и плоскости) Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна данной плоскости.

Дано. Пересекающиеся прямые a и b принадлежат плоскости α . $l \perp a$, $l \perp b$.



Доказать, что. $l \perp \alpha$

Пусть прямые a и b пересекаются в точке P , принадлежащей плоскости α , и прямая l перпендикулярна точке P . Проведём в плоскости α через точку P произвольную прямую m и прямую, проходящую через точки A , B и Q , соответствующих прямых a , b и m . Начиная от точки P на прямой l отметим конгруэнтные отрезки PR и PS . Выполним доказательство в следующей последовательности.



В равнобедренном треугольнике ΔRQS отрезок PQ является и медианой и высотой. Отсюда $m \perp l$. По определению имеем $l \perp \alpha$. Теорема доказана.


Теорема 3. Через точку на плоскости можно провести перпендикулярную ей прямую и притом только одну.

Дано. прямая l перпендикулярная плоскости α в точке P .

Доказать, что : через точку P можно провести единственную прямую l , перпендикулярную плоскости α .

Доказательство. Докажем теорему от обратного. Предположим, что существует ещё одна прямая z , перпендикулярная плоскости α в точке P . Прямые l и z лежат в плоскости β , пересекающей плоскость α вдоль прямой b . При пересечении прямых l и z образуется угол θ . По определению перпендикулярной прямой и плоскости прямая l (как и прямая z) перпендикулярна любой прямой в плоскости α , в том числе и прямой b .


Тогда и прямая l , и прямая z должны быть перпендикулярны плоскости α . Однако, это невозможно, так как $\theta + 90^\circ + 90^\circ > 180^\circ$. Таким образом, через точку P в плоскости α можно провести одну и только одну перпендикулярную прямую.




Обучающие задания

1. Для того чтобы установить новый телефонный столб перпендикулярно поверхности земли, мастер устанавливает его перпендикулярность относительно двух пересекающихся прямых. Докажите, что мастер прав.
2. Прямая выходящая из вершины треугольника перпендикулярна двум сторонам, выходящим из этой вершины. Найдите угол между этой прямой и третьей стороной треугольника.

3. Прямая перпендикулярна плоскости окружности и проходит через ее центр. Укажите что, любая точка, взятая на этой прямой находится на одинаковом расстоянии от всех точек этой окружности.



4. Отрезок AB перпендикулярен плоскости α , пересекает плоскость в точке C и $AC \cong CB$. Докажите, что любая точка, расположенная на плоскости α , находится на одинаковом расстоянии от точек A и B .



Отрезок AP прямой, проходящей через точку A пространства и перпендикулярной плоскости α в точке P, называется перпендикуляром, проведенным из точки A к плоскости α . Отрезок, соединяющий точку A с остальными точками плоскости α , называется наклонной.


Отрезок AP - перпендикуляр к плоскости.

Отрезок AB - наклонная.

Точка P - основание перпендикуляра,

Точка B - основание наклонной.

Отрезок BP называется проекцией наклонной на плоскость.



Угол между прямой и плоскостью называется углом между наклонной и её проекцией на плоскость.

Если из точки к плоскости провести перпендикуляр и наклонную, то:

- 1) перпендикуляр меньше наклонной;
- 2) равные наклонные имеют равные проекции;
- 3) большая наклонная имеет большую проекцию.


Пример. Из точки на плоскость проведены две наклонные длиной 20 см и 13 см. Найдите длину меньшей проекции, если длина большей проекции равна 16 см.

Решение: AD перпендикуляр, AB и AC наклонные. Пусть BD и CD являются проекциями наклонных. Из ΔABD по теореме Пифагора:

$$AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = \sqrt{20^2 - 16^2} = \sqrt{144} = 12 \text{ (см)}$$


Из ΔADC по теореме Пифагора:

$$DC = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ (см)}$$



Обучающие задания

1. По рисунку найдите x .




2. Из точки на плоскость проведены перпендикуляр длиной 8 см и наклонная длиной 16 см. Найдите:
а) проекцию наклонной;
б) проекцию перпендикуляра на наклонную.


3. Концы отрезка длиной 10 см пересекающего плоскость удалены от плоскости на расстояния 5 см и 3 см. Найдите проекцию отрезка на плоскость.

4. Концы отрезка длиной 8 см пересекающего плоскость удалены от неё на расстояние 1 см и 3 см. Найдите угол между отрезком и плоскостью.


5. Стороны основания прямоугольного параллелепипеда 4 см и 3 см, а высота 5 см. Найдите диагональ (d) и угол (φ) между диагональю и основанием параллелепипеда.



6. Сторона AD квадрата ABCD лежит на плоскости. Диагональ AC образует с плоскостью угол 30° . Найдите угол между стороной CD и этой плоскостью.



7. От точки к плоскости на расстоянии a проведены две наклонные, которые составляют с плоскостью углы 45° и 30° , а между собой прямой угол. Найдите расстояние между основаниями наклонных.




8. Из одной точки до плоскости проведены две равные наклонные, которые образуют между собой угол 60° , а их проекции образуют между собой прямой угол. Найдите угол между каждой наклонной и её проекцией.

9. Найдите длины наклонных, проведённых из данной точки к плоскости если:

- а) одна из наклонных на 8 см больше другой, а их проекции равны 20 см и 8 см;
б) длины наклонных относятся как 2 : 3, а проекции равны 2 см и 7 см.

Теорема. Если прямая на плоскости перпендикулярна проекции наклонной, то она перпендикулярна и самой наклонной.
То есть, если прямая a , принадлежащая плоскости α , перпендикулярна прямой BC в точке C , то она перпендикулярна и прямой AC .

Краткая запись: если $a \perp BC$ и $BC \perp BA$, то $a \perp AC$




Докажем теорему.

Дано: $AB \perp \alpha$

AC наклонная, проведённая к плоскости α
отрезок BC - проекция наклонной AC .

$CD \in \alpha, CD \perp BC$

Доказать: $CD \perp AC$



Утверждение	Обоснование
$CD \perp BC$ $AB \perp CD$	Дано Перпендикулярность прямой и плоскости
$CD \perp$ плоскости ABC	AB и BC прямые пересекающиеся на плоскости ABC и $CD \perp AB, CD \perp BC$
$CD \perp AC$	$CD \perp ABC$ (перпендикулярность прямой плоскости)

Для данной теоремы верна и обратная теорема.


Обратная теорема. Если прямая, лежащая в плоскости перпендикулярна наклонной, то она перпендикулярна и её проекции.

То есть, если прямая a , лежащая в плоскости α , перпендикулярна прямой AC в точке C , то она перпендикулярна и BC .

Краткая запись: если $a \perp AC$ и $BC \perp BA$, то $a \perp BC$

Обратную теорему докажите самостоятельно.

Пример 1. Длина перпендикуляра CM , восстановленного к вершине прямого угла прямоугольного треугольника ABC равна 7,2 единицам, а длина высоты, проведённой к гипотенузе равна 9,6 единицам. Найдите расстояние от точки M до гипотенузы.



Решение: по теореме о трёх перпендикулярах, т.к. $CH \perp AB$, то $MH \perp AB$. Расстояние от точки M до гипотенузы равно длине отрезка MH . Из $\triangle MCH$ по теореме Пифагора имеем:

$$MH = \sqrt{7,2^2 + 9,6^2} = 12 \text{ ед.}$$

Пример 2. Длина перпендикуляра, восстановленного к плоскости треугольника из вершины большего угла равна 15 ед. Найдите расстояние от вершины перпендикуляра до большей стороны, если стороны треугольника равны 10; 17 и 21 ед.

Решение: если $BF \perp AC$, то $KF \perp AC$. То есть, надо найти длину отрезка KF .

По формуле Герона найдём площадь $\triangle ABC$.

$$p = \frac{(a + b + c)}{2} = \frac{(10 + 17 + 21)}{2} = 24$$


$$\begin{aligned} S &= \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \\ &= \sqrt{24 \cdot (24-10)(24-17)(24-21)} = \\ &= \sqrt{24 \cdot 14 \cdot 7 \cdot 3} = \sqrt{3 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 3} = \sqrt{3^2 \cdot 7^2 \cdot 4^2} = 84 \end{aligned}$$

С другой стороны, $S = \frac{1}{2} AC \cdot BF$.

$$\text{Отсюда } BF = \frac{2 \cdot S}{AC} = \frac{2 \cdot 84}{21} = 8$$

Так как отрезок KB перпендикулярен BF , то $\triangle KBF$ прямоугольный.

$$KF = \sqrt{KB^2 + BF^2} = \sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{289} = 17$$



Обучающие задания

1. По данным рисунка докажите утверждения.

Дано: $DB \perp (ABC)$

Докажите: $DC \perp AC$

Дано: $MA \perp (ABC)$




$AB = AC, CD = DB$

Докажите: $MD \perp BC$


Дано: $KB \perp (ABC)$

AE, CF , - высоты

Докажите: $KD \perp AC$



2. Точка М, лежащая вне плоскости прямоугольника со сторонами 4 см и 6 см находится на одинаковом расстоянии от его вершин. Если $MA = MB = MC = MD = 7$ см, найдите расстояние от точки М до плоскости прямоугольника.




3. Точка М, лежащая вне плоскости прямоугольного треугольника ABC с катетами 6 см и 8 см, равноудалена от его вершин. Найдите расстояние от точки М до плоскости треугольника, если $MA = MB = MC = 13$ см.

4. Из центра окружности, вписанной в треугольник со сторонами 10 см, 10 см и 12 см, к плоскости треугольника восстановлен перпендикуляр длиной 4 см. Найдите расстояние от вершины перпендикуляра до сторон треугольника.

5. Точка М, лежащая вне плоскости равностороннего треугольника со стороной 3 см, находится на расстоянии $\sqrt{3}$ см от его плоскости и на равном расстоянии от его сторон. Найдите это расстояние.

6. Найдите расстояние от точки М до плоскости треугольника со сторонами 13 см, 14 см и 15 см, если расстояние от этой точки до сторон треугольника равно 5 см.





7. Точка М пространства находится на расстоянии 2,6 см от сторон ромба с диагоналями 6 см и 8 см. Найдите расстояние от точки М до плоскости ромба.


Практическая работа. Сгибание листа бумаги.

Возьмите два листа бумаги и пометьте один из них буквой М, а другой буквой N. Каждый лист разрежьте до середины. Соедините листы между собой, при помощи клейкой ленты. Выполните следующие задания.


1. Отметьте такие точки D и E, чтобы они принадлежали обеим плоскостям.
2. Проведите через точки D и E прямую.
3. Выразите своё мнение о пересечении плоскостей.

**Взаимное расположение плоскостей****Параллельные плоскости**

У параллельных плоскостей нет ни одной общей точки.

**Пересекающиеся плоскости**

Две плоскости пересекаются по одной прямой. Плоскости α и β пересекаются по прямой AB.


**Плоскости совпадают**

У двух плоскостей есть три общие точки, не расположенные на одной прямой.


**Двугранные углы**

Угол, образованный двумя полуплоскостями и имеющий общую границу называется **двугранным углом**. Полуплоскости называются гранями, их общая граница называется ребром. При пересечении двух плоскостей образуется 4 двугранных угла.

Если из любой точки (O) на ребре (l) двугранного угла в каждую полуплоскость провести перпендикулярные лучи ($a \perp l$, $b \perp l$), то они образуют угол (θ), который называется линейным углом двугранного угла.




Двугранный угол измеряется его линейным углом. Градусной мерой двугранного угла называется градусная мера его линейного угла. Все линейные углы двугранного угла при параллельном переносе совпадают, то есть они равны (прямые, перпендикулярные одной и той же прямой параллельны).



Значение линейного угла не зависит от места расположения его вершины.

Градусная мера двугранного угла лежит в пределах от 0° до 180° .


Углом между двумя пересекающимися плоскостями принято считать меньший из двух углов, образованных при пересечении плоскостей. На рисунке, говоря об угле между плоскостями α и β имеют ввиду угол θ , образованный перпендикулярными прямыми, опущенными на линию пересечения плоскостей.



Пример 1. На грани двугранного угла, градусная мера которого равна 30° , взята точка, удалённая от другой грани на расстояние a . Найдите расстояние от этой точки до ребра двугранного угла.

Решение. Пусть дана точка $A \in \alpha$.


Проведём $AB \perp l$, $AC \perp \beta$. По теореме о трёх перпендикулярах $BC \perp l$. Значит, $\angle ABC$ линейный угол и $\angle ABC = 30^\circ$. В прямоугольном треугольнике ABC катет, лежащий напротив угла 30° , равен половине гипотенузы: $AC = \frac{AB}{2}$
Отсюда $AB = 2a$.



Обучающие задания

1. Приведите пример двугранного угла в классной комнате. Чему, приблизительно, равна градусная мера двугранных углов?
2. На грани двугранного угла, градусная мера которого равна 45° , взята точка, удалённая от другой грани на расстояние a . Найдите расстояние от этой точки до ребра двугранного угла.

3. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 см и 8 см. Найдите расстояние от вершины прямого угла до плоскости, проходящей через гипотенузу, если она образует с плоскостью треугольника угол 30° .




4. Дан треугольник ABC со сторонами $AB = 18$, $BC = 12$, $AC = 18$. Через сторону AC проведена плоскость α , которая составляет угол 45° с плоскостью треугольника. Найдите расстояние от точки B до плоскости α .


5. Через стороны AC треугольника ABC проведена плоскость α , а из вершины B к этой плоскости проведен перпендикуляр BB_1 . Если двугранный угол между плоскостью треугольника и плоскостью α равен φ , покажите, что $S_{AB_1C} = S_{ABC} \cdot \cos \varphi$.

Указание: используйте отношения

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BD, \quad B_1D = BD \cdot \cos \varphi$$




6. Угол между плоскостью треугольника ABC и плоскостью α равен 30° . Найдите площадь ортогональной проекции треугольника A_1BC на плоскость α , если $BC = 12$ см, $AA_1 \perp \alpha$ и $AA_1 = 8$ см.




7. Дан равносторонний треугольник ABC со стороной a . Через стороны AB треугольника проведена плоскость и из вершины C к этой плоскости проведен перпендикуляр CC_1 . Найдите площадь треугольника ABC_1 , если угол между плоскостью треугольника и плоскостью равен:

а) 30° б) 45° в) 60°

8. Плоскость α проведена через стороны BC треугольника CAB, а из вершины A к этой плоскости проведен перпендикуляр AD. Если $S_{\triangle CAB} = 48$ см², $S_{\triangle CDB} = 24$ см², найти угол между плоскостью $\triangle BCA$ и плоскостью α .




9. Проекции сторон равностороннего треугольника ABC на плоскость α образуют прямоугольный треугольник BDC. Найдите DC, если $AC = 8$ см.



Практическая работа


Прикрепите листок бумаги к карандашу при помощи клейкой ленты. Карандаш есть модель прямой, а листок - модель плоскости. Расположите карандаш различным образом относительно стола и выскажите мнение по поводу двугранного угла, образованного плоскостью листа и плоскостью стола.



Перпендикулярные плоскости

Определение. Если двугранный угол, образованный при пересечении двух плоскостей прямой, то плоскости называются перпендикулярными плоскостями.

$SQ \perp SR$ на плоскости α и $TS \perp SR$ на плоскости β и $\angle QST$ равен линейному углу двугранного угла с ребром RS и гранями α и β . Если $\angle QST$ прямой, то $\alpha \perp \beta$.



Теорема (признак перпендикулярности плоскостей). Если плоскость проходит через прямую перпендикулярную другой плоскости, то эти плоскости перпендикулярны.



Дано: Прямая AB перпендикулярна плоскости α в точке A . Плоскость β проходит через AB .

Доказать: Плоскость β перпендикулярна плоскости α .


Доказательство: Обозначим прямую, по которой пересекаются плоскости α и β через AD . Эта прямая является ребром двугранного угла, образованного данными плоскостями. В плоскости α проведём линию AE перпендикулярную AD .

Так как $AB \perp \alpha$, то линия AB перпендикулярна любой прямой пересекающей её в точке A .


То есть, $AB \perp AD$, $AB \perp AE$. Угол $\angle BAE$ является линейным углом двугранного угла. А так как $AB \perp AE$, то двугранный угол прямой. Таким образом $\beta \perp \alpha$. Теорема доказана.



Можно смоделировать любую плоскость, проходящую через прямую l вращением плоскости β вокруг прямой l .




Пример прикладного задания. Примером перпендикулярных плоскостей служат крутящиеся двери, которые, обычно, устанавливают при входе в отелях или торговых центрах. Из схемы видно, что прямая ST перпендикулярна полу и дверь крутится вокруг этой прямой. При этом плоскости STU , STR также перпендикулярны плоскости пола RTU .



Обучающие задания


10. Покажите примеры перпендикулярных плоскостей и обоснуйте их перпендикулярность из того, что вы видите дома и в школе.

11. Точка расположена на расстоянии a и b от двух перпендикулярных плоскостей. Найдите расстояние от этой точки до линии пересечения плоскостей.




12. а) Запишите рёбра куба, перпендикулярные плоскости ADC.

б) Каким плоскостям перпендикулярно ребро AE? Запишите доказательство при помощи теоремы перпендикулярности прямой и плоскости.
в) Запишите тройку перпендикулярных плоскостей. Объясните их перпендикулярность, используя изученные теоремы.



13. Представьте, что вы разделили классную комнату на две части перегородками, как показано на рисунке. Мастер, который вам помогает, нарисовал мелом прямую линию DF на перегородке и линию FH на полу.

а) Как вы при помощи этих линий и угольника, по модели перегородки сможете определить перпендикулярность плоскости EFD и плоскости пола EFH?
б) Как вы убедитесь в том, что перегородка перпендикулярна стене (KGJ)?



14. Какое из утверждений верно, а какое неверно?

а) Из любой точки на прямой можно провести перпендикуляр и притом только один.


б) Если каждая из двух плоскостей перпендикулярна третьей, то они параллельны между собой.

в) Если прямая AB перпендикулярна плоскости α в точке A и прямая AB лежит в плоскости β , то $\alpha \perp \beta$.


г) Через точку на прямой можно провести единственную плоскость, перпендикулярную данной прямой.

д) Если плоскость перпендикулярна одной из пересекающихся прямых, то она перпендикулярна и другой прямой.

15. а) Покажите, какой ещё плоскости перпендикулярна плоскость MNL , если PN перпендикулярна плоскости MNL ?
 б) Какая прямая должна быть перпендикулярна плоскости MNL , чтобы и плоскость RSL , и плоскость PNL были перпендикулярны плоскости MNL ?



16. Прямая AB перпендикулярна плоскости α в точке B . Отрезки BC и BD , принадлежащие плоскости α конгруэнтны $BC \cong BD$. Докажите, что $AC \cong AD$ заполнив двухстолбчатую таблицу. Доказательство запишите в тетрадь.



Дано: $AB \perp \alpha$, $BC \cong BD$ C и $D \in \alpha$

Доказать: $AC \cong AD$

Утверждение	Обоснование
1. $AB \perp \alpha$, $BC \cong BD$, $C \forall D \in \alpha$	1. Дано
2. $AB \perp BC$, $AB \perp BD$	2.
3. Углы $\angle ABC$ и $\angle ABD$ прямые	3. По определению перпендикуляра
4. $\angle ABC \cong \angle ABD$	4. Оба угла прямые
5. $\triangle ABC \cong \triangle ABD$	5.
6. $AC \cong AD$	6.

17. Равносторонний треугольник ABC расположен в плоскости α . Отрезок AD перпендикулярен плоскости α . Докажите, что $BD \cong CD$.

18. Равнобедренные треугольники ABC и ABD с общим основанием AB расположены в перпендикулярных плоскостях. Найдите CD , если $AB = 16$ см, $AC = BC = 17$ см и $AD \perp BD$.

19. а) Нарисуйте плоскость NML и прямую AM , перпендикулярную плоскости.
 б) Нарисуйте три плоскости, проходящие через прямую AM , и перпендикулярные плоскости NML .

20. Из точек A и B , расположенных в перпендикулярных плоскостях, до прямой их пересечения проведены перпендикуляры AC и BD . Найдите длину отрезка AB , если:

а) $AC = 8$ см, $BD = 9$ см, $CD = 12$ см;


б) $AD = 6$ м, $BC = 7$ м, $CD = 2$ м;

в) $AC = a$, $BD = b$, $CD = c$

Параллельные плоскости

Теорема 1. (Признак параллельности плоскостей) Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны.


Доказательство: Пусть две пересекающиеся прямые a и b лежат в плоскости α , а две пересекающиеся прямые a_1 и b_1 расположены в плоскости β и $a \parallel a_1, b \parallel b_1$. Покажем, что $\alpha \parallel \beta$.



Предположим обратное. Пусть плоскости α и β пересекаются по прямой c . По признаку параллельности прямой и плоскости $a \parallel c$ и $b \parallel c$. Отсюда следует, что прямая c параллельна каждой из пересекающихся прямых a и b . А это невозможно. Получили противоречие. Значит, $\alpha \parallel \beta$.

Теорема 2. Если две параллельные плоскости пересекаются третьей плоскостью, то линии пересечения плоскостей параллельны.

То есть, если параллельные плоскости α и β пересекаются плоскостью γ , то линии пересечения l и m параллельны. Краткая запись: если $\alpha \parallel \beta$ плоскость γ пересекает плоскости α и β , то $l \parallel m$



Доказательство.

Дано: $\alpha \parallel \beta$. Пусть прямая l является линией пересечения плоскостей γ и α , прямая m является линией пересечения плоскостей γ и β .


Доказать: $m \parallel l$

Доказательство: так как прямые m и l лежат в плоскости γ , то они не являются скрещивающимися, а также не пересекающимися, так как в этом случае плоскости α и β имели бы общую точку. На самом деле, если прямые l и m пересекаются в какой-либо точке, то эта точка должна принадлежать как прямой l , то есть лежать в плоскости α , так и прямой m , то есть в плоскости β . Однако, плоскости α и β параллельны, а значит они не имеют ни одной общей точки. Значит, $m \parallel l$. Теорема доказана.

Пример прикладного задания. Плоскости ABG и DCF прямоугольного параллелепипеда параллельны. Какие плоскости образуют рёбра, пересекая эти плоскости?


Решение: 1. Плоскость ABC , пересекая параллельные плоскости ABG и DCF , образует параллельные рёбра AB и CD : $AB \parallel CD$. 2. Плоскость HGF , пересекая плоскости ABG и DCF , образует параллельные рёбра GH и FE : $GH \parallel FE$.

Теорема 3. Отрезки параллельных прямых, расположенных между двумя параллельными плоскостями равны. (докажите самостоятельно).




Теорема 4. Прямая, перпендикулярная одной из двух параллельных плоскостей, перпендикулярна и другой плоскости.

Доказательство. Пусть $\alpha \parallel \beta$ и $a \perp \alpha$. Плоскости α_1 и β_1 , проходящие через прямую a , пересекаются с плоскостями α и β по параллельным прямым: $AC \parallel BM$, $AD \parallel BN$. Так как $a \perp AC$, $a \perp AD$, то $a \perp BM$ и $a \perp BN$. По признаку перпендикулярности прямой и плоскости $a \perp \beta$. Теорема доказана.



Теорема 5. Две плоскости, перпендикулярные одной и той же прямой, параллельны.


Пример прикладного задания. Керим делает из картона модель автомобиля. Ось DG , соединяющая колёса автомобиля должна быть перпендикулярна. По какой линии должна быть перпендикулярна ось, чтобы колёса были параллельны?



Решение: если ось DG перпендикулярна пересекающимся в плоскости EFD прямым ED и FD и пересекающимся в плоскости HGJ прямым HG и GJ , то Керим может быть уверен, что колёса параллельны.

Обучающие задания


1. Плотники и сантехники для обработки деталей помещают их между двумя параллельными пластинами (зажимами), плотно сжимающих деталь, а затем выполняют необходимую работу. Какие линии на рисунке должны быть перпендикулярны, чтобы пластины были параллельны?




2. Прямая AB параллельна плоскости α и перпендикулярна плоскости β . Прямая CD лежит в плоскости β .

- 1) Нарисуйте рисунок по условию.
- 2) Что из следующего верно?
 - а) $\alpha \parallel \beta$ б) $\alpha \perp \beta$ в) $AB \parallel CD$ г) $CD \perp \alpha$

3. Определите взаиморасположение плоскости, проходящей через вершины куба A , F и C , и плоскости, проходящей через вершины E , B и G . Обоснуйте свое мнение.



4. Плоскости MNO и PQR параллельны. Можно ли утверждать, что, если $MP \parallel NQ \parallel QR$, то $NO = QR$? Ответ обоснуйте.




5. При помощи рисунка, обоснуйте, истинно или ложно высказывание.

а) Если две плоскости перпендикулярны, то прямая, параллельная одной из плоскостей, перпендикулярна другой плоскости.

б) Если две плоскости параллельны одной и той же прямой, то эти плоскости параллельны.

в) Прямые, перпендикулярные одной и той же прямой, параллельны.

г) Две плоскости, перпендикулярные одной и той же плоскости, параллельны.



д) Если скрещивающаяся прямая параллельна одной из двух параллельных прямых, то она скрещивается и с другой прямой.

6. Основание BC равнобедренного треугольника ABC лежит в плоскости α . Плоскость β , параллельная плоскости α , пересекает сторону AB в точке D и AC в точке E . Докажите, что $\triangle ADE$ равнобедренный.

7. **Теорема.** Две прямые, перпендикулярные одной плоскости, параллельны.


Дано: плоскость α , $LA \perp \alpha$, $MB \perp \alpha$

Докажите: $LA \parallel MB$

Для доказательства теоремы проведём прямую BN параллельно прямой LA . Надо показать, что прямые BN и BM совпадают.


Докажите теорему, выполнив следующие шаги.

1. Покажите, что $\angle LAC$ является линейным углом прямого двугранного угла между плоскостями α и β .
2. Покажите, что если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна третьей, то другая прямая также перпендикулярна этой прямой, то есть из условия $LA \perp AB$ следует, что $NB \perp AB$.
3. На плоскости α проведите $BD \perp AB$. Используя то, что двугранный угол между плоскостями α и β прямой, покажите, что $BD \perp NB$.
4. Покажите, что перпендикуляр MB к плоскости α восстановленный из точки B является единственным.




Расстояние между двумя параллельными плоскостями.

Расстояние между двумя плоскостями равно длине перпендикуляра, опущенного из любой точки одной плоскости до другой.




Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. Через каждую

из двух скрещивающихся прямых проходит плоскость, параллельная другой прямой. Например, проведём через прямую b плоскость, параллельную прямой a . Для этого, проведём прямую a_1 , которая пересекает прямую b так, чтобы она прошла параллельно прямой a . Плоскость, проходящая через прямые a_1 и b , параллельна прямой a . Расстояние от любой точки прямой a до этой плоскости равно расстоянию между скрещивающимися прямыми a и b . Если $b \cap a_1 = B$, то отрезок AB , перпендикулярный плоскости α , является общим перпендикуляром для скрещивающихся прямых a и b .




- 8. Расстояние между двумя параллельными плоскостями равно 8 см. Концы отрезка длиной 10 см опираются на эти плоскости. Найдите проекцию отрезка на каждую плоскость.
- 9. Между двумя параллельными плоскостями α и β проведены отрезки AC и BD ($A, B \in \alpha$; $C, D \in \beta$). $AC = 17$ см, $BD = 10$ см, сумма проекций AC и BD на одну из плоскостей равна 21 см. Найдите длины проекций и расстояние между плоскостями.

- 10. Дано: прямоугольный параллелепипед, $AB = AD = 15$ см, $AA_1 = 20$ см. Найдите расстояние между скрещивающимися прямыми A_1C и AD .
Указание: через диагональ A_1C проведите плоскость, параллельную AD .




- 11. Между двумя параллельными плоскостями проведены перпендикуляр длиной 4 м и наклонная, длиной 6 м. Расстояние между их концами на каждой из двух плоскостей равно 3 м. Найдите расстояние от середины перпендикуляра до середины наклонной.

- 12. Дан куб ребром a . Найдите расстояние между диагональю DN и ребром BC .




1. Выполните задания по рисунку.

а) Покажите, что треугольник ABC является прямоугольным треугольником.




б) Измените данные на рисунке так, чтобы треугольник BCD снова стал прямоугольным, а треугольник ABC перестал быть прямоугольным.

2. По рисунку найдите x .



3. Перила лестницы параллельны потолку. Найдите y , если $\angle x = 122^\circ$.



4. Концы отрезка прямой удалены от плоскости на расстояниях a и b ($a > b$). Найдите расстояние от середины отрезка до плоскости, если:
а) отрезок не пересекает плоскость; б) отрезок пересекает плоскость.

5. Из центра равностороннего треугольника со стороной 6 см к плоскости треугольника восстановлен перпендикуляр длиной 3 см. Найдите расстояние от вершины перпендикуляра до стороны треугольника.

6. Расстояние между точками A и B и плоскостью равно a и b соответственно, а расстояние между основаниями перпендикуляров, проведенных из этих точек к плоскости, равно c .

а) Найдите расстояние AB, считая, что точки A и B могут находиться по одну и по разные стороны плоскости.



б) Вычислите расстояние AB, если $a = 7$ см, $b = 2$ см, $c = 12$ см.

7. Отрезки AB, AC и AD попарно перпендикулярны. Если $AB = 5$, $BD = 13$, $CD = 20$, найдите AC.


8. Определите по рисункам, что из указанного ниже истинно, а что ложно. Нарисуйте рисунки в тетрадь и запишите решение.

1. Если две плоскости перпендикулярны одной и той же прямой, то они параллельны.

2. Если каждая из двух плоскостей перпендикулярна третьей, то они параллельны между собой.



9. На расстоянии 1 см, через вершины C прямоугольного треугольника ABC параллельно гипотенузе проведена плоскость. Если проекция одного из катетов на эту плоскость равна 5 см, а проекция гипотенузы равна 6 см, найдите проекцию другого катета.




10. Длина стороны равностороннего треугольника равна a . Длина перпендикуляра OM , восстановленного из центра O к плоскости треугольника, равна x .

а) Докажите, что $MA \perp BC$.

б) При каких значениях x двугранный угол между плоскостями ABM и ABC равен 60° ?

в) При каких значениях x отрезки MA , MB , MC будут взаимно перпендикулярны?




11. Из вершины A прямоугольника $ABCD$ к плоскости прямоугольника восстановлен перпендикуляр AT . Если $TB = 6$ см, $TD = 7$ см, $TC = 9$ см, найдите:

а) длину AT ;

б) расстояние от точки A до плоскости TBC

в) градусную меру угла TBA



3

Тригонометрические выражения и их преобразования

Углы поворота

Радианная мера угла

Длина дуги окружности. Площадь сектора

Тригонометрические функции

Единичная окружность и тригонометрические функции произвольного угла

Формулы приведения

Тригонометрические тождества

Формулы сложения


Следствие из формул сложения

Преобразование тригонометрических выражений





Угол поворота

Угол можно получить вращением луча вокруг начальной точки. Начальное положение луча соответствует одной стороне угла, конечное положение - другой стороне.



При описании углов поворота в декартовой плоскости принято считать луч, совпадающий с положительным направлением оси абсцисс начальной стороной угла. Луч, полученный при вращении относительно начала координат (вершины угла), назовём конечной стороной.


Координатные оси разбивают координатную плоскость на 4 четверти. Значение угла, в зависимости от того, в какой четверти расположена его конечная сторона, меняется в определенном интервале.




При вращении луча на координатной плоскости относительно начала координат в направлении по часовой стрелке или против часовой стрелки можно получить различные углы.

Принято считать, что если поворот происходит в направлении против часовой стрелки, то угол имеет положительное значение, при повороте в направлении по часовой стрелке угол имеет отрицательное значение.


положительный угол



отрицательный угол



Конечная сторона угла может совершить один или несколько оборотов относительно начала координат. Один полный оборот соответствует углу 360° . Существует бесконечное число углов поворота, у которых начальная и конечная стороны совпадают. Например, конечные стороны углов 30° и 390° совпадают. В общем, для углов поворота α° и $\alpha^\circ + 360^\circ \cdot n$ (здесь n произвольное целое число) конечные стороны совпадают.



Пример 1. Нарисуйте угол заданной величины. Определите какой четверти принадлежит конечная сторона угла.

а) 240°

б) -45°


в) 510°

Решение.

а) $240^\circ = 180^\circ + 60^\circ$


Знак угла положительный. Угол изображается поворотом, относительно начала координат, в направлении против часовой стрелки на угол $180^\circ + 60^\circ$.

Конечная сторона расположена в III четверти.




б) -45°

Знак угла отрицательный. Угол изображается поворотом, относительно начала координат, в направлении по часовой стрелке на угол 45° от положительного направления оси абсцисс. Конечная сторона расположена в IV четверти.



в) $510^\circ = 360^\circ + 150^\circ$

Угол изображается поворотом, относительно начала координат, в направлении против часовой стрелки на угол 150° . Конечная сторона расположена во II четверти.



Пример 2. На координатной плоскости покажите и запишите градусные меры двух положительных и одного отрицательного угла поворота, конечные стороны которых совпадают с конечной стороной угла 60° .

Решение.




Положительные углы:

Отрицательный угол:

$$60^\circ + 360^\circ = 420^\circ$$




$$60^\circ + 2 \cdot 360^\circ = 780^\circ$$

$$60^\circ - 360^\circ = -300^\circ$$



Обучающие задания

1. Какой четверти принадлежит угол α ?
 а) $\alpha = 170^\circ$ б) $\alpha = 290^\circ$ в) $\alpha = -100^\circ$ г) $\alpha = 320^\circ$ д) $\alpha = -10^\circ$
2. Покажите такой угол поворота α в промежутке от 0° до 360° , конечные стороны которого совпадают с заданным углом.
 а) 420° б) -210° в) -330° г) 700° д) -200°
3. Для заданного угла запишите и нарисуйте один положительный и один отрицательный угол так, чтобы их конечные стороны совпадали.
 а) 200° б) 80° в) -100° г) 130° д) -70°
4. Установите соответствие углов и рисунков?
 - 1) -210°
 - 2) 420°
 - 3) -780°




5. Если диаметр шины велосипеда равен 72 см, сколько градусов составит угол поворота шины, пока они преодолеют заданное расстояние? Проведите вычисления с помощью калькулятора.

- а) 10 м б) 27 м в) 240 м



Радианное измерение углов

Углом в **один радиан** называют центральный угол, которому соответствует длина дуги, равная длине радиуса окружности.




Радианная мера угла есть отношение длины соответствующей дуги к радиусу окружности: $\alpha = \frac{l}{r}$.

Длина окружности $2\pi r$. Если центральный угол, соответствующий дуге окружности радиуса (r) равен 1 радиану, то дуге, равной $2\pi r$, соответствует центральный угол 2π . Ниже показаны радианные меры углов поворота.


полный поворот:

2π радиан




поворот на 3/4:

$$\frac{3}{4} \cdot 2\pi = \frac{3\pi}{2}$$




поворот на 1/2:

$$\frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$$



поворот на 1/4:

$$\frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}$$



Радианная мера одного целого оборота равна 2π , градусная мера 360° . То есть, 2π радиан = 360° . Отсюда можно установить следующую связь между радианной и градусной мерой.

Преобразование радианы в градусы:

$$2\pi \text{ радиан} = 360^\circ$$

$$1 \text{ радиан} = \frac{360^\circ}{2\pi} = \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$1 \text{ радиан} \approx 57^\circ$$

Преобразование градусов в радианы:

$$2\pi \text{ радиан} = 360^\circ$$

$$1^\circ = \frac{2\pi}{360} = \frac{\pi}{180} \text{ радиан}$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0,0175 \text{ радиан}$$

Таким образом, π рад = 180° . Обозначение “рад” часто опускают.

Вместо π рад = 180° обычно пишут $\pi = 180^\circ$. Отсюда получаем, что

$$\frac{\pi}{2} = 90^\circ, \quad \frac{\pi}{3} = 60^\circ, \quad \frac{\pi}{4} = 45^\circ, \quad \frac{\pi}{6} = 30^\circ$$


Пример. Выразите углы, заданные в градусах радианами, а углы, заданные радианами в градусах. а) 60° ; б) $\frac{5\pi}{3}$

Решение. а) $60^\circ = 60 \cdot \frac{\pi}{180}$ радиан $= \frac{\pi}{3}$ радиан $\approx 1,047$ радиан

б) $\frac{5\pi}{3}$ радиан $= \frac{5\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 5 \cdot 60^\circ = 300^\circ$




Используя соответствующие радианные и градусные меры углов, расположенных в первой четверти, можно найти увеличенные в разы значения других углов.

Например, если $30^\circ = \frac{\pi}{6}$,
тогда $150^\circ = 5 \cdot 30^\circ = 5 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.



Обучающие задания

6. Какую часть полного оборота составляет каждый угол поворота, данный на рисунке? Напишите градусную величину этого угла.



7. Запишите градусные и радианные меры соответствующие углам поворота на единичной окружности.

- 1) поворот на $\frac{1}{9}$ части 2) поворот на $\frac{2}{3}$ части 3) поворот на $\frac{4}{5}$ части

8. Изобразите на координатной плоскости следующие углы поворота.

- а) 40° б) 310° в) -150° г) 150° д) 780°
 е) $\frac{2\pi}{3}$ ж) $-\pi$ з) $\frac{5\pi}{2}$ и) $-\frac{\pi}{2}$ к) $\frac{3\pi}{2}$

9. Углы, заданные в градусах, выразите в радианах.

- а) 60° б) 120° в) -45° г) 450° д) -270° е) 15°

10. Углы, заданные в радианах, выразите в градусах.

а) $\frac{\pi}{6}$ б) $\frac{2\pi}{3}$ в) $-\frac{3\pi}{8}$ г) $-\frac{5\pi}{2}$ д) 1 е) 2 ж) 3

11. Для заданного угла выразите в радианах углы, принадлежащие интервалу $(0; 2\pi)$, и конечные стороны которых совпадают с углом:

1) $-\frac{\pi}{3}$ 2) $-\frac{3\pi}{4}$ 3) $-\frac{19\pi}{4}$ 4) $\frac{16\pi}{3}$

12. а) Найдите 4 угла, конечные стороны которых, совпадают с углом:

1) $\frac{\pi}{4}$ 2) $\frac{7\pi}{5}$ 3) $-\frac{\pi}{6}$ 4) $-\frac{4\pi}{3}$

б) Для каких пар углов конечные стороны совпадают?

1) $\frac{5\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}$ 2) $\frac{5\pi}{2}, -\frac{9\pi}{2}$ 3) $410^\circ, -410^\circ$ 4) $227^\circ, -493^\circ$

в) Запишите общий вид углов, конечные стороны которых совпадают с углом:

1) -60° 2) $\frac{\pi}{5}$ 3) $-\frac{\pi}{2}$ 4) 100°

13. Запишите все углы, принадлежащие заданному промежутку, конечные стороны которых совпадают с заданным углом.

а) $65^\circ, 90^\circ \leq \theta < 720^\circ$ б) $-40^\circ, -180^\circ \leq \theta < 360^\circ$ в) $140^\circ, -720^\circ \leq \theta < 720^\circ$
 г) $\frac{\pi}{4}, -2\pi \leq \theta < 2\pi$ д) $\frac{3\pi}{4}, -4\pi \leq \theta < 4\pi$ е) $\frac{2\pi}{3}, -2\pi \leq \theta < 4\pi$

Пример. а) $65^\circ, 90^\circ \leq \theta < 720^\circ$

Все углы поворота, конечные стороны которых совпадают с углом 65° , можно найти по формуле $65^\circ + 360 \cdot n$ и $65^\circ - 360 \cdot n$.

$$n = 1 \quad 65^\circ + 360 \cdot 1 = 425^\circ \quad 65^\circ - 360 \cdot 1 = -295^\circ$$

$$n = 2 \quad 65^\circ + 360 \cdot 2 = 785^\circ \quad 65^\circ - 360 \cdot 2 = -655^\circ$$

Как видно, в заданном интервале расположен всего один угол 425° .

Пример. д) $\frac{3\pi}{4}, -4\pi \leq \theta < 4\pi$

Все углы поворота, конечные стороны которых совпадают с этим углом,

можно найти по формуле $\frac{3\pi}{4} + 2\pi n$ и $\frac{3\pi}{4} - 2\pi n$ ($n \in \mathbb{N}$).


n	1	2	3
$\frac{3\pi}{4} + 2\pi n$	$\frac{11\pi}{4}$	$\frac{19\pi}{4}$	$\frac{27\pi}{4}$
$\frac{3\pi}{4} - 2\pi n$	$-\frac{5\pi}{4}$	$-\frac{13\pi}{4}$	$-\frac{21\pi}{4}$

Интервалу $-4\pi \leq \theta < 4\pi$ принадлежат углы:

$$\frac{11\pi}{4}, -\frac{5\pi}{4}, -\frac{13\pi}{4}$$


Длина дуги. Площадь сектора

По определению радиана, если $\frac{l}{r} = \alpha$, тогда длина дуги равна произведению радиуса и радианной меры угла: $l = \alpha \cdot r$. Длина дуги окружности находится с радиусом в прямо пропорциональной зависимости.




Площадь сектора. Используя центральный угол в радианах, можно вывести формулу для вычисления площади сектора. Отношение площади сектора (S) к общей площади круга (πr^2) равно отношению соответствующего центрального угла в радианах (α radian) к полному обороту (2π).

$$\frac{S}{\pi r^2} = \frac{\alpha}{2\pi} \quad S = \frac{\alpha}{2\pi} \pi r^2 = \frac{1}{2} \alpha r^2 \quad S = \frac{1}{2} \alpha r^2$$



Пример 1. Длина секундной стрелки часов равна 12 см. Определите длину дуги, которую описывает конец секундной стрелки за 15 секунд.




Решение. Секундная стрелка за 60 минут совершает один полный оборот. Это соответствует 2π радианам.

15 секунд соответствуют $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ части полного оборота: $\frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}$ радиан. То есть, минутная стрелка за 15 секунд чертит дугу, соответствующую центральному углу $\frac{\pi}{2}$.

Длина этой дуги: $l = \alpha r = \frac{\pi}{2} \cdot 12 = 6\pi \approx 6 \cdot 3,14 = 18,84$ (см)

Пример 2. Найдите площадь и периметр закрашенного сектора на рисунке, если радиус круга равен 8 см.



Закрашенной части круга соответствует центральный угол:

$2\pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$. Площадь сектора равна:

$S = \frac{1}{2} \cdot \alpha r^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{5\pi}{4} \cdot 8^2 = 40\pi$ (см²). Периметр сектора равен сумме длин двух радиусов и длины дуги: $P = 2 \cdot 8 + \frac{5\pi}{4} \cdot 8 = 16 + 10\pi \approx 47,4$ (см)

Обучающие задания

1. По заданным значениям найдите следующие величины. Здесь r - радиус окружности, α - центральный угол, l - длина дуги.

а) $r = 8,5$ см, $\alpha = 72^\circ$, $l =$ см б) $r = 5$ м, $l = 13$ м, $\alpha =$ радиан

в) $r =$ мм, $\alpha = 1,8$ радиан, $l = 4,5$ мм





2. Найдите длину дуги и площадь сектора, соответствующих заданному радиусу и центральному углу:

а) $r = 30$ см; $\alpha = \frac{\pi}{3}$ б) $r = 12$ м; $\alpha = 90^\circ$ в) $r = 1,8$ дм; $\alpha = \frac{5\pi}{3}$


3. Длина секундной стрелки часов равна 12 см. Какой путь совершит конец стрелки за:

а) 45 секунд б) 1 минуту 20 секунд в) 2 минуты 15 секунд?

4. Для каждого рисунка найти радиус, центральный угол, длину дуги или площадь сектора.



5. Найдите площадь закрашенной части, если радиус меньшей окружности на рисунке равен 4 см, а радиус большей окружности равен 6 см.



6. Винтовая лестница состоит из 12 ступеней. Каждая ступенька имеет форму сектора с радиусом 80 см и центральным углом $\frac{\pi}{8}$. Высота каждой ступеньки 15 см.



1) Найдите длину дуги, соответствующую каждой ступеньке.


2) Сколько градусов составит поворот человека, поднявшийся по этим ступеням до конца?

3) Для покрытия ступеней необходимо приобрести ковер стоимостью 36 манатов за квадратный метр. Сколько денег потребуется для этого?

7. Система для полива, длина струи которой равна 16 м, за 15 секунд совершает один оборот.



а) Найдите площадь сектора, который может полить система при повороте на угол $\frac{3\pi}{2}$.

б) Выразите угол, на который поворачивается система за 2 минуты, в градусах и в радианах.



Линейная скорость и угловая скорость

Скорость при движении по окружности, например, скорость движения произвольной точки Р колеса, которое вращается вокруг точки О, может быть вычислена двумя способами. В первом случае её можно найти, используя расстояние и время. Эта скорость называется линейной скоростью. Во втором случае, используя угол поворота (центральный угол). Эта скорость называется угловой скоростью.



$$\text{линейная скорость} = \frac{\text{пройденный путь}}{\text{время}}$$


$$v_x = \frac{\alpha r}{t}$$

Если тело движется по окружности, то линейная скорость равна отношению пройденного пути (длины дуги окружности) к промежутку времени.

$$\text{угловая скорость} = \frac{\text{угол поворота}}{\text{время}}$$

$$\omega = \frac{\alpha}{t}$$

Если тело движется по окружности, то угловая скорость равна отношению угла поворота к промежутку времени.



Здесь α (в радианах) - угол вращения за промежуток времени t .

Между линейной и угловой скоростью существует следующая связь:

$$\text{линейная скорость} = r \cdot \text{угловая скорость} \rightarrow v_x = r \cdot \omega$$

Пример. Карусель совершает за минуту 8 полных оборотов.

а) Чему равна угловая скорость карусели за минуту (в радианах)?

б) На сколько метров за минуту передвигается лошадь, которая находится на расстоянии 3 м от центра окружности?

в) На сколько метров за минуту передвигается лошадь, которая находится на расстоянии 2 м от центра окружности?



Решение: а) Один целый оборот при вращении соответствует центральному углу 2π . За 8 оборотов этот угол равен $8 \cdot 2\pi = 16\pi$.

Угловая скорость за минуту равна $\omega = \frac{\alpha}{t} = \frac{16\pi}{1} = 16\pi$ радиан/мин.

б) Если лошадь находится на расстоянии 3 м от центра, то она движется по окружности радиуса 3 м.

Линейная скорость: $v_x = r \cdot \omega = 3 \cdot 16\pi = 48\pi \approx 151$ м/мин

в) Если лошадь находится на расстоянии 2 м от центра, то она движется по окружности радиуса 2 м.

Линейная скорость: $v_x = r \cdot \omega = 2 \cdot 16\pi = 32\pi \approx 101$ м/мин


1. Длина секундной стрелки часов равна 10 см.

а) Найдите угловую скорость (рад/сек) секундной стрелки.

б) Какой путь совершит конец стрелки за 2 минуты

15 секунд?

в) найдите линейную скорость ($\frac{\text{см}}{\text{сек}}$) конца секундной стрелки.



2. Найдите длину пути, пройденного телом за промежуток времени t по окружности радиуса r с угловой скоростью ω .

а) $r = 6$ дм, $\omega = \frac{\pi}{15}$ рад/сек, $t = 10$ мин;

б) $r = 12$ м, $\omega = \frac{3\pi}{2}$ рад/сек, $t = 100$ сек;

в) $r = 30$ см, $\omega = \frac{\pi}{10}$ рад/сек, $t = 25$ сек.




3. Тело, двигаясь по окружности радиусом 2 м, за каждые 20 секунд проходит путь 5 м. Найдите линейную и угловую скорость.

4. Карусель за минуту совершает 1,5 оборота.


а) Найдите угловую скорость (рад/минут) карусели.

б) Найдите линейную скорость (м/минут) для точки, которая находится на расстоянии 15 м от оси.



5. Колесо велосипеда диаметром 72 см за 0,05 секунды поворачивается на 45° . Какой путь проделает велосипед за 30 секунд?

6. Два диска радиусами 2 см и 8 см соединены ремнём, как показано на рисунке. Маленький диск за минуту совершает 3 оборота. Найдите, сколько оборотов совершает за 1 минуту большой диск. **Указание:** точки, расположенные на каждом из двух дисков, движутся с одинаковой линейной скоростью.




Практическая работа

1) Изобразите угол поворота, конечная сторона которого проходит через точку $P(4; 3)$ при повороте на угол α . Найдите расстояние от начала координат до точки P .

$$OP = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

2) Для острого угла α прямоугольного треугольника OPK α запишите следующие отношения.


$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \quad \cos \alpha = \frac{4}{5}, \quad \tan \alpha = \frac{3}{4}$$



3) Объясните, зависит ли значение тригонометрических отношений для угла поворота α от расположения точки на луче?

Тригонометрические функции

Пусть конечная сторона угла α при повороте пересекается с окружностью радиусом r , центр которой находится в начале координат в точке $P(x; y)$.



• Отношение ординаты точки P к длине радиуса называется синусом угла α :

$$\sin \alpha = \frac{y}{r}$$

• Отношение абсциссы точки P к длине радиуса называется косинусом угла α :

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}$$

• Отношение ординаты точки P к абсциссе называется тангенсом угла α :

$$\tan \alpha = \frac{y}{x} \text{ (здесь } x \neq 0, \text{ то есть точка } P \text{ не расположена на оси ординат)}$$

• Отношение абсциссы точки P к ординате называется котангенсом угла α :

$$\cot \alpha = \frac{x}{y} \text{ (здесь } y \neq 0, \text{ то есть точка } P \text{ не расположена на оси абсцисс)}$$

• cosecantом угла α называется обратное значение для синуса:

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{r}{y} \text{ (здесь } y \neq 0)$$

• secantом угла α называется обратное значение для косинуса:

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{r}{x} \text{ (здесь } x \neq 0)$$


Синус, косинус, тангенс, котангенс, cosecant и secant называют тригонометрическими функциями.

Пример. Точка А (-3; 4) расположена на конечной стороне угла поворота α .

а) Изобразите решение примера.

б) Определите значения тригонометрических отношений для угла поворота α .

Решение:



$$б) r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$$


$$\sin \alpha = \frac{y}{r} = \frac{4}{5} \quad \cos \alpha = \frac{x}{r} = -\frac{3}{5}$$

$$\tan \alpha = \frac{y}{x} = -\frac{4}{3} \quad \cot \alpha = \frac{x}{y} = -\frac{3}{4}$$


$$\sec \alpha = \frac{r}{x} = -\frac{5}{3} \quad \operatorname{cosec} \alpha = \frac{r}{y} = \frac{5}{4}$$

Для некоторых углов, конечная сторона расположена на одной из координатных осей. В этом случае, градусная мера угла поворота равна: $\varphi = 0^\circ$ или $\varphi = 0$ радиан, $\varphi = 90^\circ$ или $\varphi = \frac{\pi}{2}$ радиан, $\varphi = 180^\circ$ или $\varphi = \pi$ радиан, $\varphi = 270^\circ$ или $\varphi = \frac{3\pi}{2}$ радиан. В этом случае координаты x и y равны или нулю, или по абсолютному значению равны радиусу.


$\alpha = 0^\circ$ или
0 радиан




$\alpha = 90^\circ$ или $\frac{\pi}{2}$ радиан



$\alpha = 180^\circ$ или π радиан



$\alpha = 270^\circ$ или
 $\frac{3\pi}{2}$ радиан



Обучающие задания





1. Определите синус, косинус и тангенс для угла поворота, конечная сторона которого проходит через точку:

а) А(1; 2)

б) В(2; 4)

в) С(4; 8)

2. 1) Найдите значение тригонометрических соотношений для угла θ по рисунку.



2) Найдите значения тригонометрических отношений угла, конечная сторона которого проходит через точку:


а) (-12; -9)

б) (-1; 1)

в) (8; 6)

г) (3; -4)

3. Найдите значения (если это возможно) тригонометрических отношений для:
 а) $\alpha = 0^\circ$ б) $\alpha = 90^\circ$; в) $\alpha = 180^\circ$; г) $\alpha = 270^\circ$




Знаки тригонометрических функций

Знак тригонометрической функции зависит исключительно от координатной четверти, в которой располагается угол поворота.

Так как $\cos \alpha = \frac{x}{r}$, то знак косинуса совпадает со знаком x .

Так как $\sin \alpha = \frac{y}{r}$, то знак синуса совпадает со знаком y .



II четверть	y	I четверть	
$\sin \alpha, \csc \alpha$	+	$\sin \alpha, \csc \alpha$	+
$\cos \alpha, \sec \alpha$	-	$\cos \alpha, \sec \alpha$	+
$\tan \alpha, \cot \alpha$	-	$\tan \alpha, \cot \alpha$	+
III четверть	x	IV четверть	
$\sin \alpha, \csc \alpha$	-	$\sin \alpha, \csc \alpha$	-
$\cos \alpha, \sec \alpha$	-	$\cos \alpha, \sec \alpha$	+
$\tan \alpha, \cot \alpha$	+	$\tan \alpha, \cot \alpha$	-

Пример. Если $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, найдите возможные значения $\cos \alpha$.


Решение. Так как в I и во II четвертях синус положителен.

$\sin \alpha = \frac{1}{5}$, значит если $r = 5$, то $y = 1$.

Абсцисса этой точки $x = \pm \sqrt{r^2 - y^2} = \pm \sqrt{24} = \pm 2\sqrt{6}$

если α угол I четверти, то $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$

если II четверти, то $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{6}}{5}$



Обучающие задания

4. Установите знак тригонометрического отношения для каждого угла.

- | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| а) $\sin 20^\circ$ | в) $\cos 100^\circ$ | д) $\tan 250^\circ$ | ж) $\sin 200^\circ$ |
| б) $\cos 50^\circ$ | г) $\tan 140^\circ$ | е) $\sin 310^\circ$ | з) $\cos 280^\circ$ |

5. Определите знак выражения.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| а) $\sin \frac{5\pi}{4}$ | б) $\cos \frac{3\pi}{4}$ | в) $\tan \frac{5\pi}{6}$ | г) $\cot \frac{11\pi}{6}$ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|

6. Найдите, какой четверти принадлежит угол α .

- | | |
|--|--|
| а) $\sin \alpha > 0$ и $\cos \alpha < 0$ | б) $\sin \alpha < 0$ и $\cos \alpha < 0$ |
| в) $\cos \alpha < 0$ и $\tan \alpha > 0$ | г) $\cot \alpha < 0$ и $\sin \alpha > 0$ |

7. Определите знак выражения.

- | | |
|---|---|
| а) $\sin 200^\circ \cdot \cos \frac{5\pi}{7} \cdot \tan 172^\circ$ | б) $\sin 160^\circ \cdot \tan \frac{3\pi}{5} \cdot \cot 230^\circ$ |
| в) $\sin 310^\circ \cdot \tan \frac{5\pi}{6} \cdot \tan \frac{7\pi}{6}$ | г) $\cos \frac{7\pi}{5} \cdot \tan \frac{2\pi}{3} \cdot \sin \frac{11\pi}{6}$ |

8. Упростите выражение, зная что θ является углом второй четверти.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| а) $\sin \theta + \sin \theta $ | б) $\cos \theta + \cos \theta $ |
|----------------------------------|----------------------------------|

9. Если $\sin \theta = \frac{3}{5}$, найдите возможные значения $\cos \theta$.

10. На листе в клетку примите единичный отрезок за 1 клетку и изобразите окружность с центром в начале координат радиусом 5 единиц.

- | |
|--|
| а) Изобразите два различных угла поворота, синус которых равен $\frac{3}{5}$. |
| б) Изобразите углы поворота, косинус которых равен $\frac{4}{5}$. |
| в) Изобразите углы поворота, синус которых равен $-\frac{4}{5}$. |
| г) Изобразите углы поворота, косинус которых равен $-\frac{3}{5}$. |



Единичная окружность и тригонометрические функции

Значения тригонометрических функций зависят только от значения угла α и не зависят от радиуса окружности. Поэтому, не нарушая общности, можно принять $R = 1$. Окружность, центр которой находится в начале координат, с радиусом равным единице, называется **единичной окружностью**.

Координаты точки, принадлежащей окружности удовлетворяют уравнению $x^2 + y^2 = 1$.


Длина дуги на единичной окружности равна соответствующему центральному углу в радианах. Точку, соответствующую α радиан обозначим - $P(\alpha)$. Каждому значению угла α соответствует точка на окружности.

Например, если $\alpha = \pi$, то она соответствует точке $(-1; 0)$.




Если точка $P(\alpha) = (x; y)$ является точкой пересечения единичной окружности и конечной стороны угла поворота α , то между ней и тригонометрическими функциями существует следующая связь:

$$\sin \alpha = \frac{y}{1} = y \quad \cos \alpha = \frac{x}{1} = x$$



Таким образом, координаты точки принадлежащей единичной окружности, можно записать как:

$P(\alpha) = (\cos \alpha; \sin \alpha)$. При изменении значения α точка P меняет свое положение. Каждому значению угла α соответствует определенное значение синуса и косинуса этого угла. Аналогично можно говорить о синусе, косинусе, тангенсе и котангенсе, как о функциях числового аргумента. Таким образом, определенные функции называются тригонометрическими функциями.



Также по заданным координатам можно найти следующие тригонометрические функции: $\tan \alpha$, $\cot \alpha$, $\sec \alpha$ и $\csc \alpha$.

$$\tan \alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{x}{y} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$


$$\sec \alpha = \frac{1}{x} = \frac{1}{\cos \alpha}$$

$$\csc \alpha = \frac{1}{y} = \frac{1}{\sin \alpha}$$

На единичной окружности отметим координаты некоторых точек.


1) Используя специальные треугольники как $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ и $45^\circ-45^\circ-90^\circ$, можно определить координаты точек соответствующие углам поворота.

$$\alpha = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}.$$




На единичной окружности отметим координаты этих точек.

Углы поворота	Координаты точек
0	(1; 0)
$\frac{\pi}{6}$	$(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2})$
$\frac{\pi}{4}$	$(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2})$
$\frac{\pi}{3}$	$(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2})$
$\frac{\pi}{2}$	(0; 1)




2) Для некоторой точки, принадлежащей единичной окружности, например $A(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2})$, которая соответствует углу поворота $\frac{\pi}{3}$, определим координаты симметричных точек.

Как видно по рисунку, существуют 3 точки, симметричные точке А, которые расположены во II, III и IV четвертях.



Точка В симметрична точке А относительно оси y , точка С - относительно начала координат, а точка D - относительно оси x . Абсолютные значения координат этих точек равны и отличаются только знаком.

3) Таким образом, можно определить координаты новых точек, зная координаты точки, принадлежащей I четверти. Т.е. получаем единичную окружность, на которой отмечены углы поворота и координаты точек.



Перенесем в таблицу значения тригонометрических функций, соответствующих некоторым углам поворота. Используя эти значения, значения тригонометрических функций других углов, можно вычислить по-разному.

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	не определен	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

Пример. Точка А, с абсциссой $-\frac{3}{5}$ расположена в III четверти и пересекается с единичной окружностью на стороне угла φ .

а) Найдём ординату точки А.


б) Изобразим рисунок, соответствующий условию, и для угла φ найдём значения шести тригонометрических функций.

Решение: а) $(-\frac{3}{5})^2 + y^2 = 1$, $y^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, $y = \pm \frac{4}{5}$.

Так как точка расположена в III четверти $y = -\frac{4}{5}$

б) $\sin \varphi = -\frac{4}{5}$, $\cos \varphi = -\frac{3}{5}$,

$\tan \varphi = \frac{4}{3}$, $\cot \varphi = \frac{1}{\tan \varphi} = \frac{3}{4}$, $\sec \varphi = -\frac{5}{3}$, $\csc \varphi = -\frac{5}{4}$



Обучающие задания

11. Проверьте, лежат ли на единичной окружности точки:

а) $(\frac{3}{4}; -\frac{\sqrt{7}}{4})$

б) $(-\frac{\sqrt{5}}{3}; \frac{2}{3})$

в) $(-\frac{5}{7}; -\frac{2\sqrt{6}}{7})$

г) $(\frac{\sqrt{11}}{6}; \frac{5}{6})$

12. Найдите неизвестные координаты точек, лежащих на единичной окружности, по заданным условиям.

а) $(\frac{1}{4}; y)$ в I четверти


б) $(-\frac{7}{8}; y)$ в III четверти

в) $(x; \frac{2}{3})$ в II четверти

г) $(x; -\frac{5}{7})$ в IV четверти

13. а) Сколько точек на единичной окружности имеют абсциссу $\frac{1}{2}$? Найдите ординаты этих точек. Для каждой точки изобразите угол поворота.
б) Сколько точек на единичной окружности имеют ординату $\frac{1}{2}$? Найдите абсциссы этих точек. Для каждой точки изобразите угол поворота.

14. Запишите значения углов поворота, отмеченные шагами $\frac{\pi}{4}$ и $\frac{\pi}{6}$, на единичной окружности, также координаты соответствующих точек.



15. На единичной окружности найдите координаты точек, соответствующие углу поворота φ . найдите значение тригонометрических функций для этого угла.

а) $\varphi = \pi$ б) $\varphi = -\frac{\pi}{4}$ в) $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ г) $\varphi = -\frac{\pi}{2}$
 д) $\varphi = 3\pi$ е) $\varphi = \frac{5\pi}{6}$ ж) $\varphi = -\frac{4\pi}{3}$ з) $\varphi = \frac{3\pi}{2}$

16. При помощи единичной окружности найдите значение тригонометрических функций для угла:

а) $\varphi = -\frac{7\pi}{6}$ б) $\varphi = \frac{13\pi}{6}$


17. Точка $A(-\frac{4}{5}; \frac{3}{5})$ является точкой пересечения единичной окружности и стороны угла φ . Изобразите соответствующий условию рисунок и найдите значение тригонометрических функций для угла φ .

18. На единичной окружности укажите точки, соответствующие углу поворота и сравните значения тригонометрических функций.

а) $\sin 15^\circ$ и $\sin 20^\circ$ б) $\sin 40^\circ$ и $\sin 70^\circ$
 в) $\cos 20^\circ$ и $\cos 40^\circ$ г) $\cos 10^\circ$ и $\cos 50^\circ$

19. Согласно рисунку $a = \cos \alpha$, $b = \sin \alpha$, $c = \tan \alpha$, $d = \cot \alpha$. Запишите числа a, b, c и d в порядке возрастания.

- а) Если $\alpha = 45^\circ$
 б) Если $\alpha = 53^\circ$
 в) Если $\alpha = 20^\circ$



20. Если $\alpha = 30^\circ$, найдите значение выражений:

а) $3 \sin \alpha$ б) $\sin 3\alpha$ в) $2 \cos \alpha$ г) $\cos 2\alpha$

21. Найдите значение выражения $\sin \alpha - \cos 2\alpha - \cos 3\alpha + \sin 2\alpha$, если:

а) $\alpha = 30^\circ$ б) $\alpha = \frac{\pi}{2}$

22. Если $\alpha = 15^\circ$, найдите значение выражений:

а) $2 \sin(3\alpha + 15^\circ) + 3 \cot(90^\circ - 2\alpha)$ б) $\tan(4\alpha - 15^\circ) - 2 \cos(2\alpha + 30^\circ)$

Так как координаты точек на единичной окружности удовлетворяют условиям $-1 \leq x \leq 1$ и $-1 \leq y \leq 1$, то $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ и $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$. Наибольшее значение $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$ равно 1, а наименьшее значение равно -1 .

Пример. Найдём наибольшее и наименьшее значение выражения $3 + 2 \sin \alpha$.

Решение: $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ *умножим каждую из частей на 2*
 $-2 \leq 2 \sin \alpha \leq 2$ *прибавим к каждой части 3*
 $-2 + 3 \leq 3 + 2 \sin \alpha \leq 2 + 3$ $1 \leq 3 + 2 \sin \alpha \leq 5$

Таким образом, для выражения $3 + 2 \sin \alpha$ НМЗ равно 1, а НБЗ равно 5.

23. Возможно ли равенство?

а) $\sin \alpha = \frac{7}{12}$ б) $\cos \beta = \frac{4}{3}$ в) $\sin \alpha = \sqrt{5} - 1$ г) $\cos \beta = \sqrt{2} - 1$

24. Установите, верно ли неравенство?

а) $\sin 45^\circ + \cos 60^\circ > 1$ б) $\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} > 1$

25. Найдите НМЗ и НБЗ для выражений:

а) $2 + 3 \sin \alpha$ б) $1 - \sin \alpha$ в) $1 + \cos \alpha$ г) $3 - 2 \cos \alpha$

26. Найдите НМЗ и НБЗ для выражений:

а) $2 + |\sin \alpha|$ б) $2 - |\cos \alpha|$ в) $1 + \sin^2 \alpha$ г) $4 + \cos^2 \alpha$

27. Сколько точек на единичной окружности удовлетворяют условию

$\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$? Запишите общую формулу для нахождения соответствующих углов поворота.

28. На единичной окружности покажите точки, соответствующие углу поворота α .

а) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ б) $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ в) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

29. На единичной окружности координаты точки $P\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ соответствуют углу поворота $\frac{7\pi}{4}$. Покажите отрицательный угол, конечная сторона которого совпадает с данным углом, и найдите значения тригонометрических функций.

30. При помощи единичной окружности покажите углы поворота, удовлетворяющие равенству $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ и принадлежащие промежутку $[0; 2\pi]$.


31. Определите координаты точек, соответствующих заданным углам поворота, зная, что точка $A\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ лежит на единичной окружности и соответствует углу α .

а) $\alpha + \pi$ б) $\pi - \alpha$ в) $2\pi + \alpha$ г) $-\alpha$

Соответствующий острый угол и тригонометрические функции произвольного угла

Чтобы найти значения тригонометрических функций для углов больше 90° , или меньше 0° , удобно использовать значения тригонометрических функций соответствующего острого угла. Для любого угла поворота $90^\circ < \alpha < 360^\circ$ существует острый угол α' , образованный конечной стороной угла α и прямой, содержащей ось абсцисс.

Используя соответствующие острые углы, можно определить тригонометрические отношения для любого произвольного угла.



Значения тригонометрических функций данного угла и значение соответствующего ему острого угла по модулю равны.


Пример. Найдите соответствующий острый угол для $\alpha = 210^\circ$.
Найдите значений $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$.

Решение: Конечная сторона угла $\alpha = 210^\circ$ находится в III четверти

Соответствующий острый угол: $210^\circ - 180^\circ = 30^\circ$
 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Учитывая знак тригонометрических функций углов в третьей четверти, получим:

$\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}$ $\cos 210^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\tan 210^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$




Обучающие задания

32. Для следующих углов найдите соответствующий острый угол.

- 1) 240° 2) -515° 3) -170° 4) 315° 5) $\frac{25\pi}{4}$ 6) $-\frac{11\pi}{3}$ 7) $-\frac{3\pi}{4}$

33. Для следующих углов найдите значения $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$.



Число полных оборотов и соответствующий острый угол

Так как конечные стороны углов α ($0^\circ \leq \alpha < 360^\circ$) и $\alpha + 360^\circ \cdot k$ ($k \in \mathbb{Z}$) совпадают, то значения тригонометрических функций этих углов одинаковы. Если угол изменяется на целое число оборотов, то значение тригонометрических функций не меняется.

$$\sin(\alpha + 360^\circ \cdot k) = \sin \alpha$$

$$\sin(\alpha + 2\pi k) = \sin \alpha$$

$$\cos(\alpha + 360^\circ \cdot k) = \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha + 2\pi k) = \cos \alpha$$

Заметим, что если угол меняется на пол оборота, то значения тангенса и котангенса не изменяются.


В общем случае ($k \in \mathbb{Z}$) выполняются равенства:

$$\tan(\alpha + 180^\circ \cdot k) = \tan \alpha$$

$$\cot(\alpha + 180^\circ \cdot k) = \cot \alpha$$

$$\tan(\alpha + \pi k) = \tan \alpha$$

$$\cot(\alpha + \pi k) = \cot \alpha$$



Тригонометрические функции для произвольного угла можно определить следующим образом:

- определяем соответствующий острый угол;
- находим значение тригонометрических функций для этого угла;
- определяем знак значения тригонометрических функций в зависимости от четверти.


Пример. Для угла поворота $\alpha = \frac{8\pi}{3}$ вычислите значения функций $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$.

Решение: Поскольку $\frac{8\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi$, значит конечная сторона этого угла попадает на II четверть.

Определяем соответствующий острый угол: $\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$

Находим значение тригонометрических функций для $\frac{\pi}{3}$:

$$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$



Учитываем знак значения тригонометрических функций на II четверти:

$$\sin \frac{8\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \cos \frac{8\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \quad \tan \frac{8\pi}{3} = -\sqrt{3}$$

Обучающие задания

34. Не используя калькулятор, вычислите значения тригонометрических функций.

- 1) $\sin 405^\circ$ 2) $\cos 420^\circ$ 3) $\tan 405^\circ$ 4) $\sin 390^\circ$ 5) $\csc 450^\circ$
 6) $\cot 390^\circ$ 7) $\sec 420^\circ$ 8) $\cos \frac{33\pi}{4}$ 9) $\sin \frac{9\pi}{2}$ 10) $\tan \frac{4\pi}{3}$

35. а) Какой острый угол соответствует углу -60° ?

б) Найдите $\cos(-60^\circ)$, $\sin(-60^\circ)$, $\tan(-60^\circ)$, $\cot(-60^\circ)$.

д) Сравните значений тригонометрических функций для углов -60° и 60° .

36. Не используя калькулятор, вычислите значения выражений.

- а) $\cos(-60^\circ)$ б) $\sin(-315^\circ)$ в) $\sin 495^\circ$ г) $\cos 600^\circ$
 д) $\sin(-120^\circ)$ е) $\tan(-210^\circ)$ ж) $\cos(-225^\circ)$ з) $\tan 420^\circ$

37. Зная, что $\sin 25^\circ \approx 0,42$ и $\cos 25^\circ \approx 0,91$, вычислите (не используя калькулятор).

- а) $\sin 155^\circ$ б) $\cos 335^\circ$ в) $\sin 205^\circ - \cos 155^\circ$
 г) $\cos 205^\circ$ д) $\sin 335^\circ$ е) $\cos 385^\circ - \sin 515^\circ$


38. а) Зная, что $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ угол α принадлежит II четверти, найдите возможные значения $\cos \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$.

б) Зная, что $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ и угол α принадлежат IV четверти, найдите возможные значения $\sin \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$.

39. Не используя калькулятор, вычислите

- а) $\sin 400^\circ - \sin 40^\circ$ в) $\frac{\cos 410^\circ}{\cos 50^\circ}$ г) $\frac{\tan 200^\circ}{\tan 20^\circ}$
 б) $\sin(-270^\circ) + \cos 450^\circ$ д) $\cos(-720^\circ) + \tan 720^\circ$

40. Длина “руки” робота 2 м. Робот перенёс предмет из точки А в точку В. При этом “рука” робота совершила поворот на угол 140° . Если движение робота принять за угол поворота, то найдите координаты точки В.




Формулы приведения

Значение тригонометрических функций любого угла также можно найти с помощью формул приведения.

Запишем для углов α и $90^\circ - \alpha$ прямоугольного треугольника с острым углом α тригонометрические отношения:

$$\begin{array}{l} \sin \alpha = \frac{y}{r} \quad \leftarrow \quad \sin(90^\circ - \alpha) = \frac{x}{r} \\ \cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \leftarrow \quad \cos(90^\circ - \alpha) = \frac{y}{r} \\ \tan \alpha = \frac{y}{x} \quad \leftarrow \quad \tan(90^\circ - \alpha) = \frac{x}{y} \\ \cot \alpha = \frac{x}{y} \quad \leftarrow \quad \cot(90^\circ - \alpha) = \frac{y}{x} \end{array}$$



При попарном сравнении равенств можно увидеть следующую связь между значениями тригонометрических функций углов α и $90^\circ - \alpha$.

$$\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$


$$\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$$

$$\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha$$

Повернём конечную сторону угла поворота α ещё на 90° . При этом точка $P(x; y)$, расположенная на стороне, преобразуется в точку $P'(-y; x)$.

По определению тригонометрических функций:


$$\begin{array}{l} \sin(\alpha + 90^\circ) = \frac{x}{r} = \cos \alpha, \\ \cos(\alpha + 90^\circ) = -\frac{y}{r} = -\sin \alpha, \\ \tan(\alpha + 90^\circ) = -\frac{x}{y} = -\cot \alpha \\ \cot(\alpha + 90^\circ) = -\frac{y}{x} = -\tan \alpha \end{array}$$



Запишем эти формулы в следующем виде:


$$\begin{array}{ll} \sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha & \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha \\ \tan(90^\circ + \alpha) = -\cot \alpha & \cot(90^\circ + \alpha) = -\tan \alpha \end{array}$$

Как видно по рисунку отражение относительно оси y эквивалентно отражению относительно оси x и повороту на 180° . Изменение координат можно записать следующим образом:



$$\begin{aligned} \sin(180^\circ - \alpha) &= \sin \alpha & \cos(180^\circ - \alpha) &= -\cos \alpha \\ \tan(180^\circ - \alpha) &= -\tan \alpha & \cot(180^\circ - \alpha) &= -\cot \alpha \end{aligned}$$

Как видно по рисунку, при повороте угла α на 180° конечная сторона расположена в противоположных четвертях, но на одной прямой.



$$\begin{aligned} \sin(180^\circ + \alpha) &= -\sin \alpha \\ \cos(180^\circ + \alpha) &= -\cos \alpha \\ \tan(180^\circ + \alpha) &= \tan \alpha \\ \cot(180^\circ + \alpha) &= \cot \alpha \end{aligned}$$


Для получения аналогичных формул тригонометрических функций угла поворота $270^\circ + \alpha$ достаточно записать $270^\circ + \alpha = 90^\circ + (180^\circ + \alpha)$ и применить последовательность соответствующих формул. Например:

$$\begin{aligned} \sin(270^\circ + \alpha) &= \sin(90^\circ + (180^\circ + \alpha)) = \cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha \\ \cos(270^\circ + \alpha) &= \cos(90^\circ + (180^\circ + \alpha)) = -\sin(180^\circ + \alpha) = -(-\sin \alpha) = \sin \alpha \end{aligned}$$

Теперь запишем соответствующие формулы для угла поворота $270^\circ - \alpha$.

$$\begin{aligned} \text{Например: } \sin(270^\circ - \alpha) &= \sin(270^\circ + (-\alpha)) = -\cos(-\alpha) = -\cos \alpha \\ \cos(270^\circ - \alpha) &= \cos(270^\circ + (-\alpha)) = \sin(-\alpha) = -\sin \alpha \end{aligned}$$

При симметричном отображении относительно оси x , точка, расположенная на конечной стороне угла, изменяет координаты, как показано на рисунке. То есть, при этом знак меняет только координата y .




Таким образом, так как косинус зависит от x он не меняется, но у синуса меняется знак. Отсюда, для углов α и $-\alpha$ можно записать следующие зависимости между тригонометрическими функциями.

$$\begin{aligned} \sin(-\alpha) &= -\sin \alpha & \tan(-\alpha) &= -\tan \alpha \\ \cos(-\alpha) &= \cos \alpha & \cot(-\alpha) &= -\cot \alpha \end{aligned}$$

Конечные стороны углов поворота α и $360^\circ - \alpha$ симметричны относительно оси x . То есть $(x; y) \rightarrow (x; -y)$.

Отсюда получаем:

$$\begin{aligned} \sin(360^\circ - \alpha) &= -\sin \alpha & \cos(360^\circ - \alpha) &= \cos \alpha \\ \tan(360^\circ - \alpha) &= -\tan \alpha & \cot(360^\circ - \alpha) &= -\cot \alpha \end{aligned}$$



1) Если аргумент имеет вид $180^\circ \pm \alpha$ или $360^\circ \pm \alpha$, то функция преобразуется в одноимённую функцию угла α .

2) Если аргумент имеет вид $90^\circ \pm \alpha$ или $270^\circ \pm \alpha$, то функция меняет название (синус в косинус или наоборот, а тангенс в котангенс или наоборот) преобразуется в тригонометрическую функцию угла α .

В каждом из обоих случаев, функция в правой части равенства берётся с тем же знаком, какой имеет исходная функция в соответствующей четверти, если считать, что угол α является углом I четверти.

Пример 1. Если $\sin \frac{\pi}{5} \approx 0,5878$ Найдите значения: $\cos \frac{3\pi}{10}$ с помощью формул приведения.

Решение: Конечная сторона угла $\frac{3\pi}{10}$ находится на I четверти.

$$\frac{3\pi}{10} = \frac{\pi}{2} - \alpha \quad \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{10} \quad \alpha = \frac{5\pi}{10} - \frac{3\pi}{10} \quad \alpha = \frac{\pi}{5}$$

$$\cos \frac{3\pi}{10} = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} \right) = \sin \frac{\pi}{5} \approx 0,5878$$

$$\cos \frac{3\pi}{10} \approx 0,5878$$

Пример 2. Применив формулы приведения, найдите значения:

а) $\sin 210^\circ$ б) $\cos 300^\circ$ в) $\tan 135^\circ$

Решение: а) $\sin 210^\circ = \sin (180^\circ + 30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$

б) $\cos 300^\circ = \cos (270^\circ + 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$

в) $\tan 135^\circ = \tan (90^\circ + 45^\circ) = -\cot 45^\circ = -1$

Обучающие задания

1. а) Укажите что, $\cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ применив формулы приведения, так как $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

б) Применив формулы приведения, укажите что $\sin \frac{7\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, так как $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. а) Так как $\cos \frac{\pi}{7} = \sin \theta$, применив формулы приведения, найдите острый угол для θ .

б) Так как $\cot \frac{\pi}{5} = \tan \beta$, применив формулы приведения, найдите острый угол для β .

- 3.** Представьте некоторые значения для c , которые удовлетворяют тождеству $\cot\left(6c - \frac{\pi}{4}\right) = \tan\left(2c + \frac{\pi}{4}\right)$.
- 4.** а) Известно что, $\cos 35^\circ \approx 0,8191$. Найдите значение $\sin 125^\circ$, применив формулы приведения.
 б) Известно что, $\tan \frac{2\pi}{9} \approx 0,8391$. Найдите значение $\cot \frac{5\pi}{18}$, применив формулы приведения.
- 5.** 1) Найдите наименьший положительный угол, конечная сторона которого получена отражением конечной стороны угла $\alpha = 32^\circ$:
 а) относительно оси x ;
 б) относительно оси y ;
 в) относительно начала координат.
 2) Выполните аналогичное задание для $\alpha = 220^\circ$.
- 6.** Вычислите значения тригонометрических функций двумя способами:
 1) Приведя к тригонометрической функции угла, конечная сторона которого совпадает с заданным углом и принадлежит интервалу $[0^\circ; 360^\circ)$;
 2) Применив связь между углами $-\alpha$ и α для тригонометрических функций:
 а) $\alpha = -30^\circ$ б) $\alpha = -120^\circ$ в) $\alpha = -60^\circ$
- 7.** Упростите.
 а) $\sin(180^\circ + \alpha)$ б) $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$ в) $\cos(180^\circ + \alpha)$
 г) $\tan(180^\circ - \alpha)$ д) $\cot(90^\circ + \alpha)$ е) $\cos(\pi - \alpha)$
- 8.** а) Выше было доказано тождество $\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$ для угла α в I четверти. Докажите это тождество для угла, принадлежащего II четверти.
 б) Покажите справедливость тождества $\sin(90^\circ + \alpha) = \cos \alpha$ для углов $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$.
- 9.** Следующие выражения выразите через тригонометрическую функцию острого угла, применив формулы приведения, и найдите их значения.
 а) $\cos 210^\circ$ б) $\cos 120^\circ$ в) $\sin 150^\circ$ г) $\tan 300^\circ$
 д) $\cos \frac{5\pi}{4}$ е) $\tan \frac{7\pi}{6}$ ж) $\cot \frac{5\pi}{3}$ з) $\sin \frac{2\pi}{3}$

10. Упростите выражение.

а) $\sin(\alpha - 180^\circ)$

б) $\cos(\alpha - 270^\circ)$

в) $\tan(\alpha - 90^\circ)$

г) $\sin(\alpha - \frac{3\pi}{2})$

д) $\cos(\alpha - \pi)$

е) $\tan(\alpha - \frac{3\pi}{2})$

11. Упростите.

а) $\sin^2(\pi + \alpha)$

б) $\cos^2(180^\circ - \alpha)$

в) $\cot^2(90^\circ + \alpha)$

12. Приведите к тригонометрическим функциям угла от 0° до 90° .

а) $\sin(-170^\circ)$

б) $\cos(-160^\circ)$

в) $\tan 130^\circ$

г) $\cot 320^\circ$

13. Покажите, что синусы смежных углов равны, а косинусы противоположны.

14. α, β, γ - углы треугольника. Докажите, что:

а) $\sin(\alpha + \beta) = \sin \gamma$

б) $\cos(\alpha + \beta) = -\cos \gamma$

15. Упростите выражение.

а) $\frac{\sin 80^\circ}{\cos 10^\circ}$

б) $\frac{\cos 70^\circ}{\sin 20^\circ}$

в) $\tan 40^\circ \cdot \cot 50^\circ$

г) $\sin 72^\circ - \cos 18^\circ$

16. Упростите.

а) $\sin(90^\circ - \alpha) - \cos(180^\circ - \alpha) + \tan(180^\circ - \alpha) + \cot(270^\circ - \alpha)$

б) $\cos(20^\circ - \alpha) + \sin(250^\circ + \alpha)$

17. Найдите все углы из промежутка $[0^\circ; 360^\circ)$, синусы которых равны:

а) $\sin \alpha = 0,6018$


б) $\sin \alpha = 0,3$

в) $\sin \alpha = 0,8$

Пример. а) $\sin \alpha = 0,6018$

Решение: Нажав на калькуляторе кнопку \sin^{-1} , наберите 0,6018. На экране высветится $\approx 37^\circ$.

Так как во II четверти синус положительный, то синус угла $180^\circ - 37^\circ = 143^\circ$ тоже будет $\approx 0,6018$ так как $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$.



18. Найдите все углы из промежутка $[0^\circ; 360^\circ)$, синусы которых равны:

а) $\sin \alpha = \frac{1}{2}$

б) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$


в) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Связь между тригонометрическими функциями одного и того же угла

Тождество $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ можно доказать, используя уравнения окружности (или же теорему Пифагора).

$x^2 + y^2 = 1$ **уравнение для единичной окружности**

$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$ **замена $x = \cos \alpha$ и $y = \sin \alpha$**



По координатам точки на единичной окружности и по определениям тригонометрических функций имеем:

Для всех значений α , при которых $\cos \alpha \neq 0$,

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Для всех значений α , при которых $\sin \alpha \neq 0$,

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Из данных равенств имеем, что, если для угла α одновременно выполняются условия $\cos \alpha \neq 0$ и $\sin \alpha \neq 0$, то справедливо тождество:

$$\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$$

Разделив обе части равенства $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ поочередно на $\cos^2 \alpha$ и на $\sin^2\alpha$ будем иметь:

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha},$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

Полученные выше равенства являются тождествами. Их называют основными тригонометрическими тождествами.

На основании основных тригонометрических тождеств можно написать:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \begin{cases} \rightarrow \sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha \\ \rightarrow \cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha \end{cases}$$

$$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \begin{cases} \rightarrow \tan\alpha = \frac{1}{\cot\alpha} \\ \rightarrow \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} \end{cases}$$

При помощи основных тригонометрических тождеств можно упрощать тригонометрические выражения и вычислять модуль значения всех остальных функций, зная значение одной из них.

Пример 1. Используя основные тригонометрические тождества, докажите, что:

$$\frac{1 + \sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x} = \frac{2}{\cos x}$$

Доказательство

$$\begin{aligned} \frac{1 + \sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{1 + \sin x} &= \frac{(1 + \sin x)^2 + \cos^2 x}{\cos x (1 + \sin x)} = \frac{1 + 2\sin x + \sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x (1 + \sin x)} = \\ &= \frac{1 + 2\sin x + 1}{\cos x (1 + \sin x)} = \frac{2 + 2\sin x}{\cos x (1 + \sin x)} = \frac{2(1 + \sin x)}{\cos x (1 + \sin x)} = \frac{2}{\cos x} \end{aligned}$$

Пример 2. Зная, что $\sin \beta = -\frac{4}{5}$ и угол β принадлежит III четверти, найдите остальные тригонометрические функции.

Из формулы $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$ получаем: $\cos^2 \beta = 1 - \sin^2 \beta$

Так как угол β принадлежит III четверти, то

$$\cos \beta = -\sqrt{1 - \sin^2 \beta} = -\sqrt{1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2} = -\frac{3}{5}$$

$$\text{Тогда } \tan \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \frac{-\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = \frac{4}{3} \text{ и } \cot \beta = \frac{1}{\tan \beta} = \frac{3}{4}$$

Обучающие задания

1. Упростите.

а) $1 - \sin^2 \alpha$

б) $1 - \cos^2 \alpha$

в) $\sin^2 \beta - 1$

г) $\cos^2 \beta - 1$

д) $1 - \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$

е) $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \cot^2 \alpha$

ж) $\tan \alpha \cdot \cot \alpha - \cos^2 \alpha$

з) $\cos^4 \alpha + \cos^2 \alpha \cdot \sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha$

2. Найдите $\cos \alpha$ и $\tan \alpha$, если $\sin \alpha = 0,6$ и $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

3. Найдите $\sin \alpha$ и $\cot \alpha$, если $\cos \alpha = 0,8$ и $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

4. По данным для угла β , найдите значения тригонометрических функций.

а) $\sin \beta = -\frac{4}{5}$ и $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$

б) $\cos \beta = -\frac{12}{13}$ и $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$

в) $\tan \beta = 1$ и $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$

г) $\cot \beta = -\sqrt{3}$ и $\frac{3\pi}{2} < \beta < 2\pi$

5. Упростите.

а) $(1 - \cos^2 \alpha) \cdot (1 + \tan^2 \alpha)$

б) $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 + (\sin \alpha - \cos \alpha)^2$

в) $\frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} - \frac{\cos \alpha}{1 - \sin \alpha}$

г) $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha}$

д) $\frac{1 + \cos \alpha}{\sin^2 \alpha} : (1 + (\frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha})^2)$

е) $\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} : (1 + (\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha})^2)$

6. Зная, что $\tan \alpha = 2$, найдите значение выражения.

а) $\frac{\sin \alpha + 3 \cos \alpha}{\cos \alpha}$

б) $\frac{3 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}{4 \sin \alpha + \cos \alpha}$

7. Упростите выражение $\sqrt{4 - 4 \sin^2 \alpha}$, зная что:

а) $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$

б) $\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \pi$.

8. Докажите тождества.

а) $\frac{1 - (\sin x - \cos x)^2}{2} = \cos x \cdot \sin x$

б) $\frac{1 + \sec x}{\sin x + \tan x} = \csc x$

в) $\frac{1 - \cos^2 x}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)} = \tan^2 x$

г) $\frac{1 + \tan x}{\sin x + \cos x} = \sec x$

9. Найдите значение выражения.

а) $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha + \cot^2 \alpha$, при $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$

б) $\sin^4 \alpha + \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$, при $\tan \alpha = 2$

10. Упростите выражение и найдите его значения.

а) $\frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} + \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha}$

при $\cos \alpha = 0,1$

б) $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$

при $\sin \alpha = -\frac{1}{8}$

11. Зная, что $\sin \alpha + \cos \alpha = 0,6$, найдите произведение $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$.

12. Зная, что $\tan \alpha + \cot \alpha = \frac{5}{2}$, найдите значение выражения $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha$.

13. Существует ли угол поворота, удовлетворяющий равенствам?

а) $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ и $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ б) $\sin \beta = \frac{1}{3}$ и $\cos \beta = \frac{2}{3}$
 в) $\tan \gamma = \frac{3}{4}$ и $\cot \gamma = \frac{4}{3}$ г) $\tan \theta = \frac{2}{3}$ и $\cot \theta = \frac{3}{4}$

14. Упростите выражение.

а) $(1 - \sin(-\alpha)) \cdot (1 - \sin \alpha)$ б) $\cos(-\alpha) + \cos \alpha \cdot \tan^2(-\alpha)$
 в) $\frac{1 - \sin(-\alpha)}{\cos(-\alpha)} + \tan(-\alpha)$ г) $\sin^2(-\alpha) + \tan \alpha \cdot \cot(-\alpha)$

15. Докажите, что значение выражения не зависит от β при всех допустимых значениях β .

а) $(\sin \beta + \cos \beta)^2 + (\sin \beta - \cos \beta)^2$ б) $(\tan \beta + \cot \beta)^2 - (\tan \beta - \cot \beta)^2$

16. Найдите наибольшее и наименьшее значение выражений.


а) $3 \cos^2 \alpha - 4 \sin^2 \alpha$ б) $\sin \alpha - 2 \sin^2 \alpha - 2 \cos^2 \alpha$

17. Используя формулы приведения и основные тригонометрические тождества, найдите значение выражения.

а) $\cos^2 74^\circ + \cos^2 16^\circ$
 б) $\tan 48^\circ \cdot \tan 42^\circ$
 в) $\sin 20^\circ \cdot \cos 70^\circ + \cos 20^\circ \cdot \sin 110^\circ$
 г) $\cos 40^\circ \cdot \sin 130^\circ + \sin 50^\circ \cdot \cos 140^\circ$

18. Освещённость света, вычисляется по формуле

$$E = \frac{I}{R^2 \cos \varphi}$$
 Здесь I - сила света, R - расстояние от источника. Докажите, что данная формула эквивалентна формуле
$$E = \frac{I \cdot \tan \varphi}{R^2 \sin \varphi}$$
.



Тригонометрические функции суммы и разности двух углов

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta \end{aligned}$$

✓ Сначала докажем тождество $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$.

На рисунке а) для угла α координаты точки P_1 , взятой на единичной окружности равны $(\cos\alpha; \sin\alpha)$, а для угла β координаты точки P_2 равны $(\cos\beta; \sin\beta)$. Разместим углы $\alpha - \beta$, как показано на рисунке б) .

Тогда, для угла $\alpha - \beta$ координаты точки P_3 будут $(\cos(\alpha - \beta); \sin(\alpha - \beta))$.

Из того, что $\Delta P_1OP_2 \cong \Delta P_3OA$ (по признаку СУС) следует, что $P_1P_2 \cong P_3A$.



$$P_1P_2 = \sqrt{(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2}$$

$$P_3A = \sqrt{(\cos(\alpha - \beta) - 1)^2 + (\sin(\alpha - \beta) - 0)^2}$$

формула нахождения расстояния между двумя точками

$$(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 = (\cos(\alpha - \beta) - 1)^2 + (\sin(\alpha - \beta) - 0)^2$$

по свойству равенств

$$\cos^2\alpha - 2\cos\alpha \cos\beta + \cos^2\beta + \sin^2\alpha - 2\sin\alpha \sin\beta + \sin^2\beta =$$

$$= \cos^2(\alpha - \beta) - 2\cos(\alpha - \beta) + 1 + \sin^2(\alpha - \beta) \quad \text{по формулам сокращённого умножения}$$

$$(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) - 2(\cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta) + (\cos^2\beta + \sin^2\beta) =$$

$$= (\cos^2(\alpha - \beta) + \sin^2(\alpha - \beta)) - 2\cos(\alpha - \beta) + 1 \quad \text{по свойству сложения и применению тригонометрических тождеств}$$

$$2 - 2(\cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta) = 2 - 2\cos(\alpha - \beta) \quad \text{по свойству равенств}$$

$$2(\cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta) = 2\cos(\alpha - \beta) \quad \text{тождество доказано}$$

✓ Доказательство тождества $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha - (-\beta)) = \cos\alpha \cos(-\beta) + \sin\alpha \sin(-\beta)$$

$$\text{учитывая, что } \cos(-\beta) = \cos\beta \quad \sin(-\beta) = -\sin\beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta \quad \text{тождество доказано}$$

- ✓ Доказательство тождества $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta$

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right) =$$

по формулам приведения *группируя*

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cdot \cos\beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cdot \sin\beta = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

по формуле косинуса разности *с учётом формул приведения*

- ✓ Доказательство тождества $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha - \beta) &= \sin(\alpha + (-\beta)) = \sin\alpha \cos(-\beta) + \cos\alpha \sin(-\beta) = \\ &= \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta \end{aligned}$$

Пример 1. Найдём значение выражения $\cos \frac{7\pi}{12}$.

Решение.
$$\begin{aligned} \cos \frac{7\pi}{12} &= \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \end{aligned}$$

Пример 2. Найдём значение выражения $\sin(\alpha - \beta)$, если


$$\sin\alpha = -\frac{3}{5}, \quad \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \quad \text{и} \quad \cos\beta = \frac{12}{13}, \quad 0 < \beta < \frac{\pi}{2}.$$

Решение. Известно, что $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta$. Если углу α соответствует острый угол α' , то $\sin\alpha' = \frac{3}{5}$. Так как противолежащий катет равен 3, а гипотенуза 5, тогда прилежащий катет равен $x = \sqrt{25 - 9} = 4$ и учитывая, что α угол III четверти, получим:

$$\cos\alpha = -\frac{4}{5}. \quad \text{Аналогично, если зная, что } \cos\beta = \frac{12}{13},$$

$$\text{получаем, что } \sin\beta = \frac{5}{13}.$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha \cos\beta - \cos\alpha \sin\beta = -\frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} = -\frac{16}{65}$$



Можно записать формулы сложения для тангенса и котангенса:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin\alpha \cos\beta + \cos\alpha \sin\beta}{\cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha \sin\beta} =$$

по определению *по формулам сложения*

$$= \frac{\frac{\sin\alpha \cdot \cos\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta} + \frac{\cos\alpha \cdot \sin\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta}}{\frac{\cos\alpha \cdot \cos\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta} - \frac{\sin\alpha \cdot \sin\beta}{\cos\alpha \cdot \cos\beta}} = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta} \quad \text{Значит:}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\beta}$$

упрощаем *разделив числитель и знаменатель на $\cos\alpha \cdot \cos\beta$*

Аналогичным образом можно показать, что :
$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha \cdot \tan\beta}$$

Обучающие задания

1. Вычислите значения выражения.

- а) $\sin 75^\circ$ б) $\cos 75^\circ$ в) $\sin(-15^\circ)$ г) $\cos 105^\circ$
 д) $\cos(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3})$ е) $\sin(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3})$ з) $\sin \frac{\pi}{12}$ ж) $\cos \frac{7\pi}{12}$

2. Упростите. Найдите значение выражения.

- 1) $\sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{12} + \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{12}$ 2) $\cos \frac{5\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} + \sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{\pi}{12}$
 3) $\sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{12} - \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{12}$ 4) $\cos \frac{5\pi}{12} \cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{5\pi}{12} \sin \frac{\pi}{12}$

3. Установите истинность равенств, используя формулы сложения.

- а) $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ б) $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$
 в) $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ г) $\cos(270^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$

4. Упростите.

- а) $\sin 12^\circ \cdot \cos 18^\circ + \cos 12^\circ \cdot \sin 18^\circ$ б) $\cos 17^\circ \cdot \cos 43^\circ - \sin 17^\circ \cdot \sin 43^\circ$
 в) $\cos 68^\circ \cdot \cos 8^\circ + \cos 82^\circ \cdot \cos 22^\circ$ г) $\sin 23^\circ \cdot \cos 7^\circ + \cos 157^\circ \cdot \cos 97^\circ$

5. Упростите.

- а) $\cos(36^\circ + \alpha) \cdot \cos(24^\circ - \alpha) - \sin(36^\circ + \alpha) \cdot \sin(24^\circ - \alpha)$
 б) $\sin(\frac{\pi}{4} - \alpha) \cdot \cos(\frac{\pi}{4} + \alpha) + \cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) \cdot \sin(\frac{\pi}{4} + \alpha)$

6. Найдите значение выражения.

- а) $\frac{\sin 20^\circ \cdot \cos 10^\circ + \cos 20^\circ \cdot \sin 10^\circ}{\sin 21^\circ \cdot \cos 9^\circ + \cos 21^\circ \cdot \sin 9^\circ}$ б) $\frac{\cos 66^\circ \cdot \cos 6^\circ + \sin 6^\circ \cdot \cos 24^\circ}{\cos 65^\circ \cdot \cos 5^\circ + \sin 65^\circ \cdot \sin 5^\circ}$

7. а) $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ и $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, найдите $\sin(\frac{\pi}{6} + \alpha)$

б) $\sin \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ и $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$, найдите $\cos(\frac{\pi}{3} + \beta)$.

8. $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \beta = \frac{1}{2}$, α угол III четверти, а угол β угол IV четверти. Найдите: а) $\sin(\alpha + \beta)$ б) $\cos(\alpha - \beta)$

9. α и β углы III четверти и $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$, $\cos \beta = -\frac{5}{13}$. Найдите:
 а) $\sin(\alpha - \beta)$ б) $\cos(\alpha + \beta)$

10. Синусы двух острых углов треугольника равны $\frac{7}{25}$ и $\frac{4}{5}$. Найдите косинус третьего угла.

11. Упростите.

$$а) \frac{\tan 13^\circ + \tan 47^\circ}{1 - \tan 13^\circ \cdot \tan 47^\circ} \quad б) \frac{\tan 46^\circ - \tan 1^\circ}{1 + \tan 46^\circ \cdot \tan 1^\circ}$$

12. Найдите $\tan(45^\circ + \alpha)$, если $\tan \alpha = \frac{2}{3}$.

13. Если $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \beta = \frac{1}{3}$, то найдите :

$$а) \tan(\alpha + \beta) \quad б) \tan(\alpha - \beta)$$

14. Найдите значение выражения.

$$а) \tan 15^\circ \quad б) \tan 75^\circ \quad в) \cot 105^\circ$$

15. Найдите значение выражения $\cos 72^\circ \sin 48^\circ + \cos 18^\circ \sin 42^\circ$, используя формулы приведения и формулы сложения.

16. Упростите.

$$а) \frac{\sin(\alpha + \beta) - \cos \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha - \beta) + \cos \alpha \sin \beta} \quad б) \frac{\cos(\alpha + \beta) + \sin \alpha \sin \beta}{\cos(\alpha - \beta) - \sin \alpha \sin \beta}$$

17. Упростите.


$$а) \frac{\tan(45^\circ + \alpha) - \tan \alpha}{1 + \tan(45^\circ + \alpha) \cdot \tan \alpha} \quad б) \frac{\tan(\frac{\pi}{8} + \alpha) + \tan(\frac{\pi}{8} - \alpha)}{1 - \tan(\frac{\pi}{8} + \alpha) \cdot \tan(\frac{\pi}{8} - \alpha)}$$

18. а) $\tan(\alpha + \beta) = -1$, $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$. Найдите $\tan 2\beta$.

б) $\cot(\alpha + \beta) = 2$, $\cot(\alpha - \beta) = 1$. Найдите $\tan 2\alpha$.


Прикладные задания

19. Оборудование для ходьбы по канату закреплено между двумя столбами высотой 9 м. Канатоходец движется по канату В, на расстоянии 5 м от земли. Канаты А и В закреплены на расстоянии 12 м от столба. Найдите синус и градусную меру угла φ между канатами А и В, с точностью до десятых.



20. Угол $\theta_2 - \theta_1$, полученный при пересечении двух прямых с угловыми коэффициентами k_1 и k_2 , можно определить по следующей формуле:

$$\tan(\theta_2 - \theta_1) = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$$



Найдите острый угол, образованный при пересечении двух прямых:

а) $y = \frac{1}{2}x - 1$ и $y = 2x - 1$;

б) $y = x + 2$ и $y = 3x - 1$.

Практическая работа

Преобразуйте сумму $\sin 70^\circ + \sin 10^\circ$ в произведение, выполнив следующие шаги:

- $\begin{cases} x + y = 70^\circ \\ x - y = 10^\circ \end{cases}$ решив систему уравнений найдите такие углы, чтобы их сумма была равна 70° , а разность 10° : $x = 40^\circ$ $y = 30^\circ$
- Запишите следующее $70^\circ = 40^\circ + 30^\circ$, $10^\circ = 40^\circ - 30^\circ$ и упростите $\sin 70^\circ + \sin 10^\circ = \sin(40^\circ + 30^\circ) + \sin(40^\circ - 30^\circ) = \sin 40^\circ \cdot \cos 30^\circ + \cos 40^\circ \cdot \sin 30^\circ + \sin 40^\circ \cdot \cos 30^\circ - \cos 40^\circ \cdot \sin 30^\circ = 2 \sin 40^\circ \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3} \sin 40^\circ$

Преобразование суммы (разности) в произведение

Если $\begin{cases} \alpha = x + y \\ \beta = x - y \end{cases}$, тогда $x = \frac{\alpha + \beta}{2}$, $y = \frac{\alpha - \beta}{2}$

$\sin \alpha + \sin \beta = \sin(x + y) + \sin(x - y) =$

$\sin x \cos y + \cos x \sin y + \sin x \cos y - \cos x \sin y = 2 \sin x \cos y$. Итак

$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$

Аналогично получаем: $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$

$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$

- Преобразуйте в произведение: а) $\sin 52^\circ + \sin 32^\circ$ б) $\sin 72^\circ - \sin 32^\circ$
в) $\cos 32^\circ + \cos 2^\circ$ г) $\cos 42^\circ - \cos 22^\circ$

- Вычислите значение выражения.

а) $\cos 130^\circ + \sin 80^\circ - \sin 20^\circ$ б) $\sin 40^\circ + \sin 20^\circ - \cos 10^\circ$

- Преобразуйте сумму (разность) в произведение.

$\sin 6x + \sin 2x$ | $\cos 4x - \cos 2x$ | $\sin \frac{\pi}{12} - \sin \frac{5\pi}{12}$ | $\cos \frac{\pi}{12} + \cos \frac{5\pi}{12}$

- Упростите.


а) $\frac{\sin 8\alpha + \sin 2\alpha}{\cos 8\alpha + \cos 2\alpha}$ б) $\frac{\cos 6\alpha - \cos 2\alpha}{\sin 6\alpha - \sin 2\alpha}$ в) $\frac{\sin 3\alpha + \sin \alpha}{\cos 3\alpha + \cos \alpha}$

- Покажите справедливость равенств, согласно рисунку.

$\theta = \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\gamma = \frac{\alpha + \beta}{2}$

$\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{2} = s = \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \sin \frac{\alpha + \beta}{2}$

$\frac{\cos \alpha + \cos \beta}{2} = t = \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$



- Представьте в виде произведения.

а) $\frac{1}{2} + \sin \alpha$ б) $\frac{1}{2} + \cos \alpha$ в) $2 \cos \alpha - \sqrt{3}$

Преобразование произведения в сумму

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x + y) + \sin(x - y))$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{1}{2} (\cos(x - y) - \cos(x + y))$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x + y) + \cos(x - y))$$

Справедливость данных тождеств можно показать при помощи формул сложения:

почленно складываем

$$\begin{aligned} \sin(x + y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y \\ + \sin(x - y) &= \sin x \cos y - \cos x \sin y \end{aligned}$$

$$\sin(x + y) + \sin(x - y) = 2 \sin x \cos y$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x + y) + \sin(x - y))$$

почленно складываем

$$\begin{aligned} \cos(x + y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y \\ + \cos(x - y) &= \cos x \cos y + \sin x \sin y \end{aligned}$$

$$\cos(x + y) + \cos(x - y) = 2 \cos x \cos y$$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x + y) + \cos(x - y))$$

✓ Следующее тождество можно доказать аналогичным образом.

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{1}{2} (\cos(x - y) - \cos(x + y))$$

7. Для вычисления примените тождества преобразования в произведения.

а) $\sin 15^\circ \cdot \cos 15^\circ$ б) $\sin 105^\circ \cdot \sin 15^\circ$ в) $\cos 75^\circ \cdot \cos 75^\circ$

8. Представьте выражения в виде разности или суммы.

$\sin 6x \cdot \sin 2x$	$\sin x \cdot \cos 2x$	$\cos 9x \cdot \cos 2x$	$\cos \frac{3x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2}$
$\cos 7x \cdot \cos 3x$	$\sin 8x \cdot \sin 4x$	$\sin 2x \cdot \cos 3x$	$\cos \frac{5x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2}$

9. Докажите, что $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$.

10. Вычислите.

а) $2 \cos 40^\circ \cdot \cos 20^\circ - \cos 20^\circ$ б) $2 \sin 40^\circ \cdot \sin 10^\circ + \cos 50^\circ$

11. Найдите значение выражения.

а) $\sin 15^\circ \cdot \cos 7^\circ - \cos 79^\circ \cdot \cos 11^\circ - \sin 86^\circ \cdot \sin 4^\circ$

б) $\cos 73^\circ \cdot \cos 17^\circ - \sin 13^\circ \cdot \cos 21^\circ - \cos 86^\circ \cdot \cos 4^\circ$

12. Разложите на множители.

а) $\sin 2x \cdot \cos 4x - \sin 6x \cdot \cos 8x$ б) $\cos 5x \cdot \cos x - \cos 4x \cdot \cos 2x$

Тригонометрические функции двойного аргумента

Формулы сложения позволяют выразить $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$, $\tan 2\alpha$ через тригонометрические функции угла α .

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \cos \alpha \cdot \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cdot \cos \alpha - \sin \alpha \cdot \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Таким образом, получаем тождества, которые называются формулами двойного аргумента:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha, \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Формулы половинного аргумента

Имеем, что $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) = 2 \cos^2 \alpha - 1$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

Отсюда:

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \quad \tan^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}$$

Заменяем в данной формуле α на $\frac{\alpha}{2}$, получаем:

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2} \quad \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

Для половинных аргументов справедливы тождества.

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

Знак в правой части в данном равенстве зависит от того, в какой четверти находится угол $\frac{\alpha}{2}$.

Пример 1. Упростим выражение $\sin \alpha \cdot \cos^3 \alpha - \sin^3 \alpha \cdot \cos \alpha$.

Решение.

$$\begin{aligned} \sin \alpha \cdot \cos^3 \alpha - \sin^3 \alpha \cdot \cos \alpha &= \sin \alpha \cdot \cos \alpha (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = \frac{1}{2} \sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha = \frac{1}{4} \sin 4\alpha \end{aligned}$$

Пример 2. Не используя калькулятор, вычислим значения $\sin 2\alpha$ и $\cos 2\alpha$, зная, что угол α принадлежит IV четверти и $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$.


Решение. $r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$

$$\sin \alpha = -\frac{3}{5}$$

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2\left(-\frac{3}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \left(\frac{4}{5}\right)^2 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{7}{25}$$



Пример 3. Найдём значение $\cos \frac{\pi}{8}$.

Решение:

Используем формулу половинного аргумента $\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$

$\frac{\pi}{8}$ угол I четверти и в этой четверти косинус положителен.

$$\cos \frac{\pi}{8} = \cos \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{\frac{1 + \cos(\pi/4)}{2}} = \sqrt{\frac{1 + (\sqrt{2}/2)}{2}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

Обучающие задания

13. Упростите.

а) $\frac{\sin 2\alpha}{\cos^2 \alpha \cdot \tan^2 \alpha}$

б) $\frac{\cos 2\alpha}{\cos \alpha + \sin \alpha} - \cos \alpha$

в) $(\tan \alpha + \cot \alpha) \cdot \sin 2\alpha$

г) $\frac{1 + \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}$

14. Если $\cos \alpha = -0,8$, $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, найдите:

а) $\sin 2\alpha$

б) $\cos 2\alpha$

в) $\tan 2\alpha$

15. Если $\sin \beta = -\frac{12}{13}$ и угол β расположен в III четверти, найдите:

а) $\sin 2\beta$

б) $\cos 2\beta$

в) $\tan 2\beta$

16. Упростите.

а) $\frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} - \frac{\cos 3\alpha}{\cos \alpha}$

б) $\frac{\sin 3\alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos 3\alpha}{\sin \alpha}$

17. Найдите значение выражения.

а) $2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ$

б) $2 \sin \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{8}$

в) $\cos^2 \frac{\pi}{12} - \sin^2 \frac{\pi}{12}$

г) $\cos^2 \frac{\pi}{8} - \sin^2 \frac{\pi}{8}$

д) $\frac{2 \tan 22^\circ 30'}{1 - \tan^2 22^\circ 30'}$

е) $\frac{4 \tan 75^\circ}{1 - \tan^2 75^\circ}$

18. Найдите:

а) $\sin 22^\circ 30'$

б) $\cos 22^\circ 30'$

в) $\tan 22^\circ 30'$

г) $\tan 15^\circ$

д) $\cos 67,5^\circ$

19. Если $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $270^\circ < \alpha < 360^\circ$, то найдите:

а) $\sin \frac{\alpha}{2}$

б) $\cos \frac{\alpha}{2}$

в) $\tan \frac{\alpha}{2}$

20. Найдите $\sin 2\alpha$, $\cos 2\alpha$, $\tan 2\alpha$, зная что:

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \quad \left| \quad \tan \alpha = \frac{3}{4}; \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} \quad \left| \quad \cos \alpha = \frac{4}{5}; 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right.$$

21. Найдите $\sin \frac{\alpha}{2}$, $\cos \frac{\alpha}{2}$, $\tan \frac{\alpha}{2}$, если:

а) $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

б) $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$

22. Докажите справедливость тождеств при помощи формул суммы и разности тригонометрических функций.

а) $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ б) $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$.

23. Угол α расположен во II четверти $\sin \alpha = \frac{8}{17}$

а) Найдите значение $\sin 2\alpha$. б) Найдите значение $\cos 2\alpha$.

в) При помощи калькулятора найдите радианную меру угла α .


г) Проверьте результаты пунктов а и б при помощи калькулятора.

24. Докажите тождества.


а) $\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \tan \frac{\alpha}{2}$ б) $\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \tan \frac{\alpha}{2}$

Прикладные задания

25. Геометрия. По данным на рисунке докажите справедливость тождества $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$ для единичной окружности с центром в точке O.




26. Чтобы найти высоту горы, на плане выбраны две точки A и B, расстояние между которыми равно 175 м, и измерены углы подъема, которые соответственно равны $\angle A = 36^\circ 40'$, $\angle B = 21^\circ 10'$. Чему равна высота горы?



27. Если точки A, B, C являются вершинами $\triangle ABC$, то докажите справедливость следующих тождеств (учтите, что $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$).


а) $\sin(A + B) = \sin C$
 б) $\cos C = \sin A \cdot \sin B - \cos A \cdot \cos B$

28. а) Докажите справедливость формулы $S_{\text{сер.}} = \frac{1}{2} r^2 (\alpha - \sin \alpha)$ для нахождения площади сегмента. α – центральный угол в радианах.



б) Радиус круга на рисунке равен 2 см, а длина хорды 3 см. Найдите площадь сегмента, отсекаемого хордой.

29. Три окружности касаются внешним образом, как показано на рисунке. Найдите площадь закрашенной части, если их радиусы соответственно равны 1; 2; 3.



Пример 1. Раскроем скобки и упростим выражение $\cos x (\tan x - \sec x)$

Решение:

$$\begin{aligned} \cos x (\tan x - \sec x) &= && \text{по распределительному закону умножения} \\ &= \cos x \cdot \tan x - \cos x \cdot \sec x = \\ &= \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} - \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} = && \text{упрощение при помощи замены } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \\ &= \sin x - 1 && \text{и } \sec x = \frac{1}{\cos x} \end{aligned}$$

Пример 2. Разложим на множители и упростим выражение $\sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x$

Решение:

$$\begin{aligned} \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x &= \\ &= \cos^2 x (\sin^2 x + \cos^2 x) = && \text{вынесем общий множитель за скобку} \\ &= \cos^2 x \cdot 1 = \cos^2 x && \text{применив формулу } \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \end{aligned}$$

Пример 3. Упростим выражение $\frac{\cos x}{1 + \sin x} + \tan x$

Решение:

$$\begin{aligned} \frac{\cos x}{1 + \sin x} + \tan x &= \frac{\cos x}{1 + \sin x} + \frac{\sin x}{\cos x} = && \text{заменим } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \\ &= \frac{\cos x}{1 + \sin x} \cdot \frac{\cos x}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1 + \sin x}{1 + \sin x} = && \text{умножим числитель и знамена-} \\ & && \text{тель на одно и тоже число} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin x + \sin^2 x}{\cos x(1 + \sin x)} = && \text{приведём к общему знаменателю} \\ &= \frac{1 + \sin x}{\cos x(1 + \sin x)} = && \text{применим тождество } \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \\ &= \frac{1}{\cos x} = \sec x && \text{упростим} \end{aligned}$$

Пример 4. Освободим знаменатель от радикала $\sqrt{\frac{2}{\tan x}}$

Решение: Здесь $\tan x > 0$.

$$\sqrt{\frac{2}{\tan x}} = \sqrt{\frac{2}{\tan x} \frac{\tan x}{\tan x}} = \sqrt{\frac{2 \tan x}{\tan^2 x}} = \frac{\sqrt{2 \tan x}}{\tan x}$$

Обучающие задания

1. Раскройте скобки и упростите выражение.

- 1) $(\sin x - \cos x)(\sin x + \cos x)$ 3) $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 + \sin 2\alpha$
 2) $\tan x (\cos x + \cot x)(1 - \sin x)$ 4) $(1 + \tan \alpha)^2 - \sec^2 \alpha$

2. Разложите на множители.

- 1) $\sin^2 x \cos x + \cos^3 x$ 2) $\sin^4 x - \cos^4 x$ 3) $\sin^3 x + 27$
 4) $4\sin^2 y + 8\sin y + 4$ 5) $3\cot^2 \beta + 6\cot \beta + 3$ 6) $2\cos^2 x + \cos x - 3$

3. Упростите.

1) $\frac{\cos^2 \alpha - 1}{\cos \alpha + 1}$

2) $(\frac{\sin x}{\cos x})^2 - \frac{1}{\cos^2 x}$

3) $\frac{\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha}{\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha}$

4) $\frac{4\cos^3 x}{\sin^2 x} \cdot (-\frac{\sin x}{4\cos x})^2$

5) $\frac{\sin^2 \alpha - \sin \alpha - 2}{2 \sin \alpha - 4}$

6) $\frac{\sin^2 \alpha - 9}{2 \cos \alpha + 1} \cdot \frac{10 \cos \alpha + 5}{3 \sin \alpha + 9}$

4. Представьте выражение в виде множителей, содержащих одноимённую функцию (например, $(\sin x - 3)(1 + 2 \sin x)$).

1) $\cos^2 x + 2 \cos x + 1$

2) $\cos x - 2 \sin^2 x + 1$

3) $\sin x - \cos^2 x - 1$

5. Освободитесь от радикала в знаменателе.

а) $\frac{\sqrt{1 - \cos x}}{\sqrt{1 + \cos x}}$

б) $\frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\tan x}}$

в) $\frac{\sqrt{\cot x}}{\sqrt{\sin x}}$

6. Упростите.

а) $(\frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} + \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}) \cdot \sin 2\alpha$

б) $\frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha + 2 \sin^2 \alpha}$

в) $\frac{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1 - \cos 2\alpha + \sin 2\alpha}$

г) $\frac{\sin \alpha + \sin 3\alpha + \sin 5\alpha}{\cos \alpha + \cos 3\alpha + \cos 5\alpha}$

7. Докажите тождства.

1) $\frac{\cos \theta}{1 - \tan \theta} + \frac{\sin \theta}{1 - \cot \theta} = \sin \theta + \cos \theta$

2) $\frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} + 1 = 2 \cos^2 \theta$

3) $\frac{\tan \theta - \cot \theta}{\tan \theta + \cot \theta} + 1 = 2 \sin^2 \theta$

4) $\tan \theta + \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \sec \theta$

8. Найдите наибольшее и наименьшее значение выражения.

а) $\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha$

б) $\sqrt{3} \sin \alpha + \cos \alpha$

в) $\sin \alpha + \cos \alpha$

Указание: Запишите выражение $a \sin x + b \cos x$ в виде $c \cdot (\frac{a}{c} \cdot \sin x + \frac{b}{c} \cdot \cos x)$ и введите вспомогательные углы: $\frac{a}{c} = \cos \varphi$ и $\frac{b}{c} = \sin \varphi$ Здесь $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

Пример. $\sin \alpha + \sqrt{3} \cos \alpha = 2(\frac{1}{2} \sin \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha) =$
 $= 2(\cos 60^\circ \cdot \sin \alpha + \sin 60^\circ \cdot \cos \alpha) = 2 \sin(\alpha + 60^\circ)$ НБЗ = 2 НМЗ = -2


9. Если $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, найдите значение выражения $\sqrt{\frac{1 - \sin \alpha}{1 + \sin \alpha}} + \sqrt{\frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}}$

10. Упростите выражение $\frac{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}}{\cos \alpha}$, если

а) $90^\circ < \alpha < 180^\circ$

б) $270^\circ < \alpha < 360^\circ$

11. Найдите значение выражения $\sin 18^\circ \cdot \cos 36^\circ$.

1. Углы треугольника относятся как 2 : 3 : 5. Найдите радианные меры углов.
2. Имеет ли смысл выражение?
 а) $\sqrt{\sin 170^\circ}$ б) $\sqrt{\cos 150^\circ}$ в) $\sqrt{\tan 200^\circ}$
3. Какой четверти принадлежит угол α , если $|\sin \alpha| = \sin \alpha$, $|\cos \alpha| = -\cos \alpha$?
4. Докажите, что $\tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \cdot \dots \cdot \tan 87^\circ \cdot \tan 88^\circ \cdot \tan 89^\circ = 1$
5. Выразите через a , если $\sin 10^\circ = a$:
 а) $\cos 80^\circ$ б) $\cos 100^\circ$ в) $\sin 170^\circ$ г) $\sin 190^\circ$
6. Вычислите, не используя калькулятор.
 а) $\frac{2 \tan \frac{\pi}{8}}{1 - \tan^2 \frac{\pi}{8}}$ б) $4 \sin \frac{2\pi}{3} \cos \frac{2\pi}{3}$
7. Какое из равенств верное, а какое ложное?
 а) $\sin 151^\circ = \sin 29^\circ$ б) $\cos 135^\circ = \sin 225^\circ$ в) $\tan 135^\circ = \tan 225^\circ$
 г) $\sin 60^\circ = \cos 330^\circ$ д) $\sin 270^\circ = \cos 180^\circ$ е) $\cos(-60^\circ) = -\sin 330^\circ$
8. Радиус одного зубчатого колеса равен 5,4 см, а радиус другого 3 см. Если маленькое колесо поворачивается на угол 135° , то на какой угол при этом поворачивается большое колесо?
- 
9. а) Система для полива может совершать поворот на угол 120° и при этом струя имеет длину 18 м. Схематично изобразите ту часть, которую может полить система и найдите её площадь.
 б) На какой угол должна поворачиваться система для полива площади в 400 м^2 , если длина струи равна 18 м?
10. Докажите.
 а) $\frac{\sin 3x - \sin x}{\cos 3x - \cos x} = -\cot 2x$ б) $\frac{\sin 2x + \sin 4x}{\cos 2x + \cos 4x} = \tan 3x$
 в) $\frac{\sin x + \sin 3x}{\cos x + \cos 3x} = \tan 2x$ г) $\frac{\cos 4x - \cos 2x}{\sin 2x - \sin 4x} = \tan 3x$
11. Найдите значение выражения $\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta}$, если $\alpha - \beta = 90^\circ$.
12. Докажите, что: а) $\cos(60^\circ - \alpha) = \sin(30^\circ + \alpha)$
 б) $\cot(80^\circ - \alpha) = \tan(10^\circ + \alpha)$.
13. Покажите, что: $\frac{\cos 20^\circ - \cos 50^\circ}{\cos 31^\circ + \sin 11^\circ} = \frac{\sin 80^\circ - \sin 70^\circ}{\sin 29^\circ - \sin 19^\circ}$

14. Найдите значение выражения $\left| \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} \right|$, если $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = 0,4$.

15. Найдите значение выражения.

а) $4 \sin 15^\circ \cos 15^\circ (\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ)$

б) $\sin \frac{\pi}{16} \cdot \cos^3 \frac{\pi}{16} - \sin^3 \frac{\pi}{16} \cdot \cos \frac{\pi}{16}$

17. Вычислите.

а) $\frac{1}{2 \sin 10^\circ} - 2 \sin 70^\circ$

б) $8 \sin 10^\circ \cdot \cos 20^\circ \cdot \cos 40^\circ$

18. Упростите: $\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) \cdot \frac{1 - \sin 2x}{\cos 2x}$

19. Если $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ и $\sin \beta = -\frac{1}{2}$, $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$, найдите значение выражений:

а) $\sin(\alpha + \beta)$

б) $\cos(\alpha + \beta)$

в) $\tan(\alpha + \beta)$

г) $\sin(\alpha - \beta)$

д) $\cos(\alpha - \beta)$

е) $\tan(\alpha - \beta)$

20. Упростите.

а) $\frac{6 \cos 64^\circ}{\sqrt{3} \cos 34^\circ - \sin 34^\circ}$

б) $\frac{\cos 36^\circ + \sqrt{3} \sin 36^\circ}{4 \cos 24^\circ}$

21. Распылитель (лейка) распыляет воду на объект под углом α на расстояние d .


а) Докажите, что площадь полива находится по формулам

$$S = \pi d^2 \tan^2 \frac{\alpha}{2}, \text{ а также } S = \frac{\pi d^2 (1 - \cos \alpha)}{1 + \cos \alpha}$$

б) Какова площадь полива, если

угол распыления $\alpha = 45^\circ$,


а расстояние $d = 30$ см?



22. 1) Докажите тождества. а) $\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$ б) $\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$

2) Если $\tan \alpha = \frac{1}{3}$, то найдите: а) $\sin 2\alpha$

б) $\cos 2\alpha$




4


Теорема синусов и теорема косинусов

Теорема синусов Теорема косинусов

Живший в XII веке и занимающий особое место в истории человечества великий азербайджанский учёный Насреддин Туси сделал особый вклад в астрономию, математику и философию. Насреддин Туси впервые отделил тригонометрию от астрономии и представил доказательство теоремы синусов.



Практическая работа. 1) По данным рисунка выразите стороны АВ и ВС через высоту h треугольника ABC.



2) Проверьте справедливость равенства.

$$\frac{AB}{\sin \angle C} = \frac{BC}{\sin \angle A}$$

3) Выразите длину стороны AC через h и, зная, что $\angle B = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 105^\circ$, вычислите $\sin \angle B$.

4) Найдите отношение $\frac{AC}{\sin \angle B}$ и сравните его результат с результатом пункта 2.


5) Есть ли связь между сторонами $\triangle ABC$ и синусами противолежащих углов.

Теорема синусов

Для произвольного $\triangle ABC$ со сторонами a, b, c и соответствующими противолежащими углами $\angle A, \angle B, \angle C$ имеет место:

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} = \frac{c}{\sin \angle C}$$

Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов.



Доказательство: Докажем теорему для остроугольного и тупоугольного треугольников. Из вершины C треугольника проведём к стороне АВ высоту h_c . Получим два прямоугольных треугольника, для которых имеем:

$$\frac{h_c}{b} = \sin \angle A \quad \text{и} \quad \frac{h_c}{a} = \sin \angle B$$

Из тупоугольного треугольника имеем:

$$\frac{h_c}{a} = \sin(180 - \angle B) = \sin \angle B.$$


Найдём из этих отношений h_c :

$$h_c = b \sin \angle A, \quad h_c = a \sin \angle B$$


Отсюда получаем, что: $b \sin \angle A = a \sin \angle B$ или

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B}$$

остроугольный треугольник



тупоугольный треугольник



По аналогичному правилу, если провести высоту из вершины угла A на сторону BC, то можно показать, что

$$\frac{b}{\sin \angle B} = \frac{c}{\sin \angle C}$$

По свойству равенства имеем: $\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} = \frac{c}{\sin \angle C}$ Теорема доказана.

Обратите внимание, что эти отношения равны диаметру описанной окружности.

Справедливость теоремы для прямоугольного треугольника покажите самостоятельно.

Следствие 1. В треугольнике, напротив равных углов лежат стороны, длины которых равны.

Следствие 2. В треугольнике напротив большего угла лежит большая сторона, а напротив большей стороны лежит больший угол.


На самом деле, для острых углов α и β , если $\alpha > \beta$, то $\sin \alpha > \sin \beta$. Так как $\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b}$, то $a > b$. Для тупого угла α угол $(180^\circ - \alpha)$ является острым, а также угол $(180^\circ - \alpha)$ является внешним углом треугольника не смежными с углом β и больше него.

Поэтому, $\sin \alpha = \sin(180^\circ - \alpha) > \sin \beta$. Отсюда снова получаем, что $a > b$.

Если для треугольника заданы два угла и одна сторона, две стороны и угол, противолежащий одной из сторон, то, применив теорему синусов, можно найти остальные стороны и углы.

I случай. Даны два угла и одна сторона треугольника.

Пример 1. В $\triangle ABC$ $a = 10$, $\angle A = 41^\circ$, $\angle C = 75^\circ$



Решение: Зная, что сумма внутренних углов треугольника равна 180° , по двум заданным углам найдём третий, а по теореме синусов неизвестные стороны.

$$\angle B = 180^\circ - (\angle A + \angle C) = 180^\circ - (41^\circ + 75^\circ) = 64^\circ$$

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} \Rightarrow b = \frac{a \cdot \sin \angle B}{\sin \angle A} \Rightarrow \frac{10 \sin 64^\circ}{\sin 41^\circ} \approx \frac{10 \cdot 0,899}{0,656} \approx 13,7$$

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{c}{\sin \angle C} \Rightarrow c = \frac{a \cdot \sin \angle C}{\sin \angle A} \Rightarrow \frac{10 \sin 75^\circ}{\sin 41^\circ} \approx \frac{10 \cdot 0,966}{0,656} \approx 14,7$$


Обучающие задания

1. Найдите неизвестные.



а) $\frac{b}{\sin 45^\circ} = \frac{6\sqrt{2}}{\sin 30^\circ}$

б) $\frac{a}{\sin 35^\circ} = \frac{10}{\sin 40^\circ}$




2. Запишите теорему синусов для треугольника с вершинами M, N, P.



3. По данным рисунка найдите длину стороны обозначенного буквой a .



4. Найдите неизвестные углы и стороны.



5. Изобразите треугольник согласно равенству $\frac{x}{\sin 60^\circ} = \frac{10}{\sin 80^\circ}$.
Найдите значение x .

6. Изобразите $\triangle ABC$ и найдите неизвестную сторону.

а) **Дано:** $\triangle ABC$, $\angle A = 57^\circ$,
 $\angle B = 73^\circ$, $AB = 24$ см.
 $AC = ?$

б) **Дано:** $\triangle ABC$, $\angle B = 38^\circ$,
 $\angle C = 56^\circ$, $BC = 63$ см
 $AB = ?$


в) **Дано:** $\triangle ABC$, $\angle A = 50^\circ$,
 $\angle B = 50^\circ$, $AC = 27$ м.
 $AB = ?$

г) **Дано:** $\triangle ABC$, $\angle A = 23^\circ$,
 $\angle C = 78^\circ$, $AB = 15$ см.
 $BC = ?$

II случай. Даны две стороны и угол, противолежащий одной из сторон.

Пример 2. 1) В $\triangle ABC$ $a = 18$, $\angle A = 25^\circ$, $b = 30$

Решение.
$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B}$$



$$\sin \angle B = \frac{b \cdot \sin \angle A}{a} = \frac{30 \cdot \sin 25^\circ}{18} \approx 0,7044$$

Введём число 0,7044 в калькулятор и нажмём кнопку со знаком $\boxed{\sin^{-1}}$. Увидим, что угол B равен $44,8^\circ$: $\angle B \approx 44,8^\circ$

Однако, зная, что $\sin \angle B = \sin (180^\circ - \angle B)$, тогда получается, что у угла B есть ещё второе значение: $\angle B \approx 180^\circ - 44,8^\circ = 135,2^\circ$: $\angle B \approx 135,2^\circ$


Для $\angle B \approx 44,8^\circ$

$$\angle C \approx 180^\circ - (25^\circ + 44,8^\circ) = 110,2^\circ$$

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{c}{\sin \angle C}$$

$$c = \frac{a \sin \angle C}{\sin \angle A}$$

$$c = \frac{18 \sin 110,2^\circ}{\sin 25^\circ} \approx \frac{10 \cdot 0,938}{0,423} \approx 40$$




Для $\angle B \approx 135,2^\circ$

$$\angle C \approx 180^\circ - (25^\circ + 135,2^\circ) \approx 19,8^\circ$$

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{c}{\sin \angle C}$$

$$c = \frac{a \sin \angle C}{\sin \angle A}$$

$$c = \frac{18 \sin 19,8^\circ}{\sin 25^\circ} \approx \frac{10 \cdot 0,338}{0,423} \approx 14,4$$



Таким образом, для заданных значений существует два треугольника.

- $\angle B \approx 44,8^\circ$, $\angle C \approx 110,2^\circ$, $c \approx 40$
- $\angle B \approx 135,2^\circ$, $\angle C \approx 19,8^\circ$, $c \approx 14,4$

Рассмотрим для II случая следующую ситуацию.

Пример 3. Можно ли построить треугольник у которого длина одной стороны 12, а другой 5, противолежащим углом 30° ?

По теореме синусов









$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} \quad \sin \angle B = \frac{b \sin \angle A}{a} = \frac{12 \cdot \sin 30^\circ}{5} = 1,2$$

$\sin \angle B = 1,2$ Так как $|\sin \angle B| \leq 1$, то он не может принимать значение 1,2.

Значит, такой треугольник не существует.



Количество возможных решений треугольников по двум сторонам и одному углу может меняться в зависимости от значений длины сторон и вида угла (градусной меры).

Возможные решения для ТТВ

$\angle A < 90^\circ$	$\angle A \geq 90^\circ$
<p>1. $a < h_c < b$ решений нет</p> 	<p>а) a при $a < b$ решений нет</p> 
<p>2. при $a = h_c < b$ одно решение</p> 	<p>б) при $a = b$ решений нет</p> 
<p>3. при $h_c < a < b$ два решения</p> 	<p>в) при $a > b$ одно решение</p> 
<p>4. при $a = b$ одно решение</p> 	
<p>5. при $a > b$ одно решение</p> 	

Обучающие задания

7. Найдите градусную меру угла θ по рисунку. В каждом случае выясните, сколько существует решений.




8. Установите, выполнив соответствующие вычисления, в каком случае можно построить два или один треугольник, а в каком решения не существует.

- 1) $a = 10, \angle A = 35^\circ, \angle B = 25^\circ$
- 3) $\angle A = 40^\circ, \angle B = 45^\circ, c = 15$


- 2) $b = 40, \angle B = 50^\circ, c = 50$
- 4) $a = 4, \angle A = 42^\circ, b = 7$

9. а) В $\triangle ABC$ $AC = 7$ см, $AB = 11$ см, $\angle B = 25^\circ$. Найдите $\angle C$.
 б) В $\triangle KLM$ $LM = 16,8$ см, $KM = 13,5$ см, $\angle K = 56^\circ$. Найдите $\angle L$.
 Верно ли, что для каждой из задач, при решении будем искать два угла “один острый”, “один тупой”?
10. Одна из сторон треугольника равна 43 м, а другая 11 м. Угол, лежащий напротив одной из сторон, равен 35° . Найдите неизвестную сторону и углы треугольника.
11. Докажите теорему синусов при помощи треугольников, вписанных в окружность на рисунке.

1. Центр окружности внутри треугольника.



2. Центр окружности вне треугольника



План для доказательства:

Сначала покажите справедливость равенства $\frac{a}{\sin \angle A} = 2R$,

а затем, аналогичным образом, равенств $\frac{b}{\sin \angle B} = 2R$ и $\frac{c}{\sin \angle C} = 2R$.

12. Для более точного измерения кроме градусных единиц, используют более маленькие единицы, такие как минута (') и секунда ("). Приняв $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$ выразите в виде десятичной дроби градусные измерения углов.

а) $20^\circ 15' 36''$

б) $45^\circ 12' 18''$



в) $45^\circ 20' 54''$

По формуле площади треугольника:

$$S = \frac{1}{2} ab \cdot \sin \angle C$$

$$S = \frac{1}{2} bc \cdot \sin \angle A$$

$$S = \frac{1}{2} ac \cdot \sin \angle B$$



13. По следующим данным найдите площадь треугольника.




1) $\angle B = 42^\circ$, $a = 6$ м, $c = 8$ м

2) $\angle A = 17^\circ 12'$, $b = 10$ см, $c = 13$ см

3) $\angle C = 82^\circ 54'$, $a = 4$ дм, $b = 6$ дм

4) $\angle C = 75,16^\circ$, $a = 1,5$ м, $b = 2,1$ м

14. Найдите неизвестные углы и стороны.



15. а) Найдите большую высоту треугольника со сторонами:


5 м, 6 м и 7 м.

б) Найдите меньшую высоту треугольника со сторонами:

13 см, 14 см и 15 см.

16. Докажите, что площадь выпуклого четырёхугольника равна полупроизведению диагоналей и синуса угла между диагоналями.


$$S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2 \cdot \sin \varphi$$



17. а) Найдите площадь параллелограмма с диагоналями 10 см и 12 см, если угол между ними равен 60° .

б) Найдите площадь равнобедренной трапеции, если диагонали трапеции равны $12\sqrt{2}$ см, а угол между ними равен 45° .

18. Заполните двухстолбчатую таблицу доказательством теоремы синусов. Перепишите доказательство в тетрадь.



Предположение	Обоснование
$\frac{1}{2} bc \cdot \sin \angle A = \frac{1}{2} ac \cdot \sin \angle B = \frac{1}{2} ab \cdot \sin \angle C$	
$bc \cdot \sin \angle A = ac \cdot \sin \angle B = ab \cdot \sin \angle C$	
$\frac{bc \cdot \sin \angle A}{abc} = \frac{ac \cdot \sin \angle B}{abc} = \frac{ab \cdot \sin \angle C}{abc}$	
$\frac{\sin \angle A}{a} = \frac{\sin \angle B}{b} = \frac{\sin \angle C}{c}$	
$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} = \frac{c}{\sin \angle C}$	

19. Для каждого возможного случая изобразите соответствующий треугольник.

а) Найдите, какому интервалу должна принадлежать сторона BC в $\triangle ABC$, чтобы задача имела два решения для $\angle A = 30^\circ$ и $AB = 50$ см.

б) Найдите, какому интервалу должна принадлежать сторона BC в $\triangle ABC$, чтобы задача не имела решения для $\angle A = 60^\circ$ и $AB = 12\sqrt{3}$ см.


в) Найдите, какому интервалу должна принадлежать сторона BC в $\triangle ABC$, чтобы задача имела одно решение для $\angle A = 45^\circ$ и $AB = 18\sqrt{2}$ см.

Прикладные задания.

Пример. Водохранилище находится от комплекса 4-ая Вершина на расстоянии 15 км по направлению на северо-запад под углом 25° . Комплекс Гянджилик находится на расстоянии 7,5 км в направлении на северо-восток от комплекса 4-ая Вершина. Найдите расстояние от Гянджилика до водохранилища.



Решение: Согласно плану изобразим треугольник, вершинам которого соответствуют буквы объектов: водохранилище - S, 4-ая Вершина - T, Гянджилик - G. Соответствующие расстояния обозначим буквами s , t и g .



По теореме синусов:

$$\frac{s}{\sin \angle S} = \frac{g}{\sin \angle G}, \quad \frac{7,5}{\sin 25^\circ} = \frac{15}{\sin \angle G}$$


$$\sin \angle G = \frac{15 \cdot \sin 25^\circ}{7,5} \approx \frac{15 \cdot 0,4226}{7,5} = 0,8452$$

$$\angle G \approx 58^\circ \quad \angle T \approx 180^\circ - 25^\circ - 58^\circ \approx 97^\circ$$


$$\frac{s}{\sin \angle S} = \frac{t}{\sin \angle T}, \quad \frac{7,5}{\sin 25^\circ} \approx \frac{t}{\sin 97^\circ}$$

$$t \approx \frac{7,5 \cdot \sin 97^\circ}{\sin 25^\circ} \approx \frac{7,5 \cdot 0,9925}{0,4226} \approx 17,6 \text{ км}$$


- 20.** Наблюдение с самолёта зафиксировало, что углы снижения для двух точек A и B на противоположных берегах озера соответственно равны 45° и 32° . По данным на рисунке, найдите, приблизительно, расстояние между точками наблюдения.




- 21.** Часть деревянной конструкции длиной 8 см образует угол 60° с основанием. Другая часть длиной 7 см, соединена с концом первой и закреплена с основанием. По рисунку найдите возможную градусную меру угла θ .




22. Навигация - занимается определением места расположения и курса движения морского и воздушного транспорта. Обычно, в навигации направление определяется при помощи азимута. Азимут — это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между направлениями на север и на ориентир. Например, азимут на рисунке равен 140° .




Парусник, в котором находится Улькер, находится на расстоянии 52 м от парусника Айтен в восточном направлении. Айтен видит научную станцию, занимающуюся наблюдением за обитателями моря, по азимуту 30° , а Улькер по азимуту 320° . На каком расстоянии от станции находится Улькер?




23. Мостостроение. Какой длины должен быть мост, который нужно построить по данным на рисунке?



24. Конструкция. Найдите угол φ зубчатой конструкции на рисунке.






25. Люстра закреплена к крючку цепями на расстоянии 1,8 м и 2,4 м. Цепь длиной 1,8 м образует с плоскостью крепления угол 62° . Найдите, какой угол образует с этой плоскостью другая цепь.




Исследование 1. Выполните следующие задания для каждого треугольника с заданными размерами:

- 1) Запишите углы треугольника в порядке возрастания.
- 2) Можно ли найти неизвестные стороны или углы, применив теорему синусов?



Исследование 2. 1) В тетради изобразите треугольники по двум сторонам и углу между ними и измерьте третью сторону согласно следующим данным.

1. $a = 3$ см, $b = 4$ см, $\angle C = 90^\circ$
2. $a = 3$ см, $b = 4$ см, $\angle C = 60^\circ$
3. $a = 3$ см, $b = 4$ см, $\angle C = 120^\circ$



- 2) Для полученных треугольников заполните таблицу

Стороны треугольника (см)	c^2	$a^2 + b^2$	$2ab \cos \angle C$
$a = 3, b = 4, c = 5$			
$a = 3, b = 4, c = \blacksquare$			
$a = 3, b = 4, c = \blacksquare$			

- 3) Сравните значения выражений $a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \angle C$ и c^2 .


Теорема косинусов

Для произвольного треугольника ABC со сторонами a, b и c

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \angle A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \angle B$$


$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \angle C$$



Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между сторонами.

Доказательство: Для доказательства теоремы косинусов расположим треугольник ABC в координатной плоскости так, чтобы вершина A совпадала с началом координат. В этом случае координаты вершин равны: $A(0; 0)$, $B(c; 0)$, $C(b \cdot \cos \angle A; b \cdot \sin \angle A)$. По формуле расстояния между двумя точками имеем:

$$\begin{aligned} a^2 &= (c - b \cos \angle A)^2 + (b \sin \angle A - 0)^2 = \\ &= c^2 - 2bc \cdot \cos \angle A + b^2 \cos^2 \angle A + b^2 \sin^2 \angle A = \\ &= c^2 - 2bc \cdot \cos \angle A + b^2 (\cos^2 \angle A + \sin^2 \angle A) = \\ &= b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \angle A \end{aligned}$$



Таким образом, мы доказали, что: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \angle A$.

Доказать эту формулу для других сторон можно, расположив другие вершины (В и С) в начале координат. **Замечание:** Пусть $\angle C = 90^\circ$. Так как $\cos 90^\circ = 0$, то формула $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos \angle C$ будет выглядеть так: $c^2 = a^2 + b^2$, т.е. выражает теорему Пифагора.

Поэтому теорему косинусов называют обобщённой теоремой Пифагора

Решение треугольника по двум сторонам и углу между ними.

Пример 1. Решите треугольник, если в $\triangle ABC$ $a = 12$ см, $c = 16$ см, $\angle B = 38^\circ$.

Решение.

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \angle B$$

теорема косинусов

$$b^2 = 144 + 256 - 2 \cdot 12 \cdot 16 \cdot \cos 38^\circ$$


*запишем значения
a, c и $\angle B$*

$$b^2 \approx 97,4$$

упрощаем

$$b \approx \sqrt{97,4} \approx 9,87 \text{ (см)}$$

извлекаем квадратный корень



Если известны три стороны и один из углов треугольника, то можно применить теорему синусов. Найдём угол А. Известно, если сторона a меньше стороны c , то угол напротив этой стороны также будет меньшим, то есть $\angle A$ не может быть тупым.

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} \quad \frac{12}{\sin \angle A} = \frac{9,87}{\sin 38^\circ} \quad \sin \angle A = \frac{12 \sin 38^\circ}{9,87} \approx 0,7485$$

Нажмите кнопку \sin^{-1} на калькуляторе и введите число 0,7485, тогда можно найти $\angle A = \sin^{-1}(0,7485) \approx 48,5^\circ$. Теперь, для треугольника ABC известны три стороны и два угла. Третий угол можно найти из формулы суммы внутренних углов треугольника:

$$180^\circ - 38^\circ - 48,5^\circ = 93,5^\circ, \quad \angle C \approx 93,5^\circ$$


$$a = 12 \text{ см}, b \approx 9,87 \text{ см}, c = 16 \text{ см}, \angle A \approx 48,5^\circ, \angle B = 38^\circ, \angle C \approx 93,5^\circ$$

Решение треугольника по трём сторонам.

Пример 2. В $\triangle ABC$ $a = 5$ см, $b = 8$ см, $c = 12$ см.

Решение.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \angle A$$




$$\cos \angle A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos \angle A = \frac{8^2 + 12^2 - 5^2}{2 \cdot 8 \cdot 12} = \frac{183}{192} \approx 0,9531$$

$$\angle A \approx \cos^{-1}(0,9531) \approx 18^\circ$$


По тому же правилу находим углы для вершин В и С.

Обучающие задания

1. Найдите углы треугольника, зная его стороны. Результат округлите до десятых.



2. Найдите неизвестную сторону и углы треугольника по двум заданным сторонам и углу между ними.



3. Найдите неизвестные по условию. Результат округлите до десятых.

1) Дано: $\triangle ABC$
 $a = 27, b = 22$
 $\angle C = 40^\circ$

Найдите: сторону c

2) Дано: $\triangle ABC$,
 $a = 18, c = 15$
 $\angle B = 110^\circ$

Найдите: сторону b

3) Дано: $\triangle ABC$,
 $a = 9, b = 10, c = 11$.

Найдите: $\angle A$




4) Дано: $\triangle ABC$,
 $a = 120, b = 90, c = 105$.

Найдите: наибольший угол треугольника.

5) Дано: $\triangle ABC$,
 $a = 16, b = 21, c = 19$.


Найдите: наименьший угол треугольника.

4. Решите треугольники. Результат округлите до десятых.




5. а) В $\triangle ABC$ со сторонами $AB = 4, BC = 8, AC = 9$, проведена биссектриса BT . Найдите длину BT по данным пунктам.

1. Найдите отрезок AT и TC .
2. Найдите $\cos \angle A$ из $\triangle ABC$.
3. Найдите BT из $\triangle ABT$.






- б) В $\triangle ABC$ со сторонами $AB = 4, BC = 8, AC = 10$ проведена медиана BM . Найдите длину BM .



6. а) Острый угол параллелограмма равен 60° . Найдите диагонали параллелограмма, если стороны равны 6 см и 8 см.
 б) Для параллелограмма докажите, что $d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2)$, где a и b стороны параллелограмма с диагоналями d_1 и d_2 .

7. Отрезок AD перпендикулярен плоскости $\triangle BCD$. Найдите неизвестные по данным на рисунке.




Прикладные задания

Пример. Поезд прошёл путь 60 км из пункта А в пункт С. После чего он изменил направление на 15° и прошёл ещё 80 км до пункта В. На сколько километров удалился поезд от пункта А?


Решение: Изобразим решение задачи.

По рисунку видно, что в треугольнике известны две стороны и угол между ними.




Сторону c можно найти по теореме косинусов: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \angle C$
 $c^2 = 80^2 + 60^2 - 2 \cdot 80 \cdot 60 \cos 165^\circ \approx 19273$; $c \approx 139$ км

8. Между точками горы А и В планируется построить туннель. По рисунку определите длину туннеля.




9. Судно проделало путь 60 км на восток, а затем изменило направление в сторону севера, как показано на рисунке, и прошло ещё 100 км.




По рисунку определите угол азимута - угла, отсчитанного по ходу движения часовой стрелки между направлениями на север и на ориентир.

10. Два судна начали движение из точки А, как показано на рисунке. Первое пришло в пункт В, второе - в пункт С.


а) Найдите угол между направлениям движения судов.
 б) Найдите расстояние между пунктами В и С.




11. Угол между двумя автомобилями, начавшими движение из одной точки, равен 70° . Один из них движется со средней скоростью 40 км/ч, другой со скоростью 60 км/ч. Через 45 минут автомобили доезжают до места назначения. Найдите расстояние между автомобилями в конце движения.




12. Лейла, стоя на мосту, с высоты 50 м наблюдает за движением лодок. Лодка А движется по азимуту 230° , а лодка В по азимуту 120° . Лейла видит лодки, приблизительно, под углом снижения 38° и 35° соответственно для лодок А и В. По этим данным, найдите расстояние между лодками.






13. **Астрономия.** Определённое время в году по утрам на небе можно наблюдать планету Венеры. Расстояние между Венерой и Солнцем приблизительно равно 67 млн. миль. Расстояние между Землёй и Солнцем 93 млн. миль. Если Солнце и Венеру можно наблюдать под углом 34° , то докажите, что расстояние между Землёй и Венерой равно или 35 млн. миль или 119 млн. миль.



14. Наблюдение за некоторым объектом высотой h под углом подъёма 40° и 32° происходит из двух разных точек А и В, расстояние между которыми 105 м. Найдите высоту объекта.




1. Решите треугольники. Результат округлите до десятых.




2. Два лыжника начали одновременно двигаться из точки М, как показано на рисунках. Решите следующие задачи:


а) Найдите расстояние между двумя лыжниками.




б) Найдите расстояние, пройденное каждым из лыжников.




3. Найдите высоту дерева на опушке, если она составляет угол 15° с горизонтом, длина тени дерева 7 м, а угол подъема солнечных лучей равен 57° .



4. а) Сколько метров составляет расстояние между наблюдателем, находящимся на земле и наивысшей точкой крана, используемого при строительстве здания. Угол подъема под которым наблюдатель видит здание равен 32° , а угол подъема под которым наблюдатель видит наивысшую точку крана равен 43° . Высота здания 27 м.




б) Эльдар хочет измерить высоту флага в парке. Для этого он измерил угол подъема сначала из точки Q, а затем из точки P. Расстояние между точками P и Q оказалось равным 20 м. Зная, что $\angle Q = 28^\circ$ и $\angle P = 53^\circ$, найдите высоту флага.




5. Ахмед и Рашад начали пробежку из одной точки в разных направлениях под углом 120° . Ахмед пробегает за час 8 км, а Рашад 7 км. Какое расстояние будет между ними через 30 минут?

Решите задачу, изобразив соответствующий чертёж.

6. Для того чтобы пройти из точки P в точку R, Ибрагим сначала дошёл до точки Q, а оттуда в точку R. Найдите расстояние между точками P и R по данным на рисунке.





7. **Вычисление расстояния.** Найдите расстояние от очага возгорания до каждой из пожарных станций по данным на рисунке.



8. Докажите теорему косинусов для треугольника на рисунке.

План для доказательства. 1) Выразите высоту h из $\triangle ADB$ и $\triangle BDC$ и запишите равенство полученных выражений.


2) Используйте теорему Пифагора и тождество $\cos(180 - \angle A) = -\cos \angle A$.



9. Найдите градусную меру острого угла параллелограмма, если его стороны равны 10 см и 12 см, а меньшая диагональ равна 15 см.

10. Дано: $\triangle ABC$, $AB=15$, $BC=21$, $AC=24$
 BM -медиана, BL -биссектриса.
 Найдите:

1) $\angle A$ 2) AM и BM 3) AL и BL



11. Полицейский вертолёт летит на высоте 400 м. Если офицер полиции смотрит на север под углом снижения 20° , он видит место аварии, а если он смотрит на юг под углом снижения 15° , то он видит машину скорой помощи, движущуюся к месту происшествия.

а) На каком расстоянии от места происшествия находится машина скорой помощи?

б) Если скорость машины скорой помощи равна 100 км в час, то через сколько времени она достигнет места аварии?

12. Составьте задачу, отражающую реальную ситуацию, для решения которой нужно решить остроугольный треугольник. Обсудите задачу вместе с одноклассниками.



Тригонометрические функции и их графики

Периодические функции

Графики функций $y = \sin x$ и $y = \cos x$

Преобразование графиков функций $y = \sin x$ и $y = \cos x$

Тригонометрические функции и периодические события

Графики функций $y = \tan x$ и $y = \cot x$





Периодические функции


Многие события, происходящие в природе - восход и закат солнца, сезонные изменения температуры воздуха, всплеск и затухание волн в океане и т.п., являются циклически повторяющимися событиями. Процесс по производству оборудования, движение частей машины и т.д., так же могут быть заданы периодической функцией.

Рассмотрим периодические переменные на примере.

Работа станка по нарезке ленты. В фирме по производству измерительной ленты имеется станок, при помощи которого тонкая лента разрезается на кусочки по 3 м и сворачивается. График работы станка и описание принципа работы висит на стене.



- 0,5 см-наибольшая высота, на которую поднимается нож.
- Нож бездействует 3 секунды, с 0-3, 4 -7 секунды и т.д.
- Нож опускается вниз в интервале с 3 до 3,5 сек., отрезает ленту, и с 3,5 до 4 сек. нож поднимается вверх.
- На один полный цикл тратится 4 секунды.




На какой, по вашему секунде, нож снова отрежет ленту?

Станок по изготовлению измерительной ленты циклически повторяет работу. Один цикл длится 4 секунды. График зависимости высоты ножа от времени, также соответствует одному циклу. В следующий раз нож разрежет ленту на 11,5 секунде. Такие функции называются циклическими (периодическими) функциями. Значения периодических функций повторяются на определённом интервале.

Пусть существует такое число $T \neq 0$, что для произвольного x из области определения функции $x \pm T$, также принадлежит области определения и удовлетворяют условию $f(x - T) = f(x) = f(x + T)$. Тогда $f(x)$ называется периодической функцией и, если период равен T , то $n \cdot T$ также является периодом ($n \in \mathbb{Z}$). Например, $f(x \pm 2T) = f((x \pm T) \pm T) = f((x \pm T)) = f(x)$. Наименьший положительный период функции называется его основным периодом.




Пример. По графику определите, является ли функция периодической?



Как видно из графика, значение функции повторяется каждые 4 единицы. Например, $f(1) = f(5) = f(9) = \dots$ Эта функция является периодической функцией с основным периодом 4.

Обучающие задания

1. По графику определите, является ли функция периодической? Укажите основной период.



2. Вода может вытекать из бака за определённое время, затем бак наполняется до прежнего уровня, и вода снова начинает вытекать и т.д.

- 1) Сколько времени понадобится, чтобы заполнить и опустошить бак за 1 раз?
- 2) Запишите область значений функции.
- 3) Чему равна глубина воды в баке на 60-ой минуте?
- 4) Когда в следующий раз уровень воды в баке составит 1 м?





3. **Вопрос открытого типа.** Схематично изобразите график какой либо функции с основным периодом $T = 6$.

Движение карусели. Один оборот карусель, диаметром 50 м совершает за 4 минуты. По таблице найдите, на какой высоте окажется человек в 1, 5, 9 минут, если он сел в кабинку карусели на высоте $h = 0$?


Зависимость высоты кабины от времени представлена в виде таблицы. На координатной системе отмечены соответствующие точки. Начертите таблицу и диаграмму в тетрадь. Соедините соответствующие каждому целому периоду точки цветными карандашами.

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8
h	0	25	50	25	0	25	50	25	0



Тригонометрические функции

Координаты точки, соответствующей углу поворота θ на окружности с радиусом R , равны $x = R \cos \theta$, $y = R \sin \theta$. Это означает что координаты x и y являются тригонометрическими функциями угла θ .



Значения синуса и косинуса повторяются с периодом 2π .

$$\sin(\theta + 2\pi n) = \sin \theta, \quad \cos(\theta + 2\pi n) = \cos \theta, \quad n \in \mathbb{Z}$$

То есть функции синус и косинус являются периодическими функциями.


График функции $y = \sin x$

$f(\theta) = \sin \theta$ показывает ординату соответствующей точки при повороте на угол θ при движении по единичной окружности.


График функции $f(\theta) = \sin \theta$ можно построить следующими шагами.

1. Разобьём дугу, принадлежащую I четверти на три равных дуги $(0; \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2})$
2. Через точки деления проведём прямые, параллельные оси абсцисс.
3. Отметим точки пересечения прямых $x = 0$, $x = \frac{\pi}{6}$, $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \frac{\pi}{2}$, с соответствующими параллельными линиями.
4. Проведём сплошную линию через эти точки.

Получим график, $f(\theta) = \sin \theta$ на промежутке $[0; \frac{\pi}{2}]$



Известно, что единичная окружность совершает полный оборот за 360° или 2π радиана. Построим аналогичным образом график функции $f(\theta) = \sin \theta$ на промежутке $[0; 2\pi]$:



Так как синус является периодической функцией, то на промежутке длиной 2π график $f(\theta) = \sin \theta$ будет повторяться заново. Если обозначить функцию через y , а аргумент через x , то можно записать $y = \sin x$. График функции $y = \sin x$ на промежутке $[-2\pi; 2\pi]$ можно начертить как показано ниже:





График функции $y = \sin x$ называется синусоидой.

График функции $y = \sin x$ и её свойства

1. Область определения множества всех действительных чисел.
2. Область значений отрезок $[-1; 1]$.
3. Функция $\sin x$ нечётная: $\sin(-x) = -\sin x$, т.е. график симметричен относительно начала координат.
4. Функция периодическая с основным периодом 2π : $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
5. Синусоида пересекает ось абсцисс в точках $\dots, -2\pi; -\pi; 0; \pi; 2\pi; 3\pi, \dots$, и т.д., т.е. при $x = \pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$) функция $y = \sin x$ обращается в нуль. Синусоида проходит через начало координат.
6. Наибольшее значение, равное 1 функция принимает при $x \dots, -\frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}; \frac{9\pi}{2}; \dots$, т.е. при $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$).
7. Наименьшее значение равное -1 функция принимает при $x \dots, -\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{2}; \frac{11\pi}{2}; \dots$, т.е. при $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$).

Пять основных точек для построения графика $y = \sin x$

Последовательность основных пяти точек для функции $y = \sin x$ на промежутке $[0; 2\pi]$ может быть задана так:

нуль точка максимума нуль точка минимума нуль





График функции $y = \cos x$

График функции $y = \cos x$ на отрезке $[0; 2\pi]$ можно построить аналогично графику функции $y = \sin x$ геометрическим способом, используя единичную окружность, а также при помощи таблицы значений.

Так как $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$, переместив график функции $y = \sin x$ на $\frac{\pi}{2}$ влево., получаем график функции $y = \cos x$.




По графику перечислим свойства функции $y = \cos x$:

1. Область определения: множество всех действительных чисел $x \in \mathbb{R}$.
 2. Область значений: отрезок $[-1; 1]$.
 3. Функция $y = \cos x$ чётная (график симметричен относительно оси y)
 $\cos(-x) = \cos x$
 4. Функция периодическая с периодом 2π : $\cos(x + 2\pi) = \cos x$
 5. График пересекает ось абсцисс в точках $\dots, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$ т.д., т.е. при $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$) функция $y = \cos x$ обращается в нуль.
- График пересекает ось ординат в точке $(0; 1)$.
6. Наибольшее значение, равное 1 функция принимает при $x \dots, -2\pi; 0; 2\pi; 4\pi, 6\pi, \dots$, т.е. при $x = 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$).
 7. Наименьшее значение, равное -1 функция принимает при $x \dots, -\pi; \pi; 3\pi; 5\pi, \dots$, т.е. при $x = \pi + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$).

Можно построить график функции $y = \cos x$ при помощи пяти основных точек (точек пересечения с осью абсцисс и точками экстремума).

Последовательность пяти точек для функции $y = \cos x$ на промежутке $[0; 2\pi]$ может быть задана так:



Обучающие задания

1. а) Постройте график функции $y = \sin x$ на отрезке $[0; 2\pi]$ по пяти основным точкам.

б) Сколько чисел x удовлетворяют условию $\sin x = \frac{1}{3}$ на промежутке $[0; 2\pi]$?

2. а) Постройте график функции $y = \cos x$ на промежутке $[0; 2\pi]$ по пяти основным точкам.

б) Сколько чисел x удовлетворяют условию $\cos x = 0,6$ на промежутке $[0; 2\pi]$?

3. Постройте графики функций на заданном промежутке.

$$y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 4\pi$$

$$y = \cos x, \quad 0 \leq x \leq 4\pi$$


$$y = \sin x, \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

$$y = \cos x, \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

4. Для максимального значения функции $y = \sin x$ запишите три значения аргумента.

5. В одной системе координат построьте графики функций $y = \cos x$ и $y = \sin x$ и запишите схожие и отличительные черты.

6. Для регулировки движения диска диаметром 2 м на нём сделали метку и проверяли расстояние между поверхностью воды и меткой. Изобразите рисунок и проведите математические вычисления. Для этого разделите единичную окружность на углы по 15° и отметьте для каждого шага расстояние от этой точки до оси x . Выполните заданный алгоритм для двух полных оборотов (720°). Необходимо ли выполнить данную проверку для ещё одного оборота? Если такой необходимости нет, то запишите их сразу, иначе вычислите их.



а) На каком расстоянии от уровня воды окажется метка при повороте диска на 15° , 375° , 735° ?

б) Отметьте значения единичной окружности на координатной плоскости и построьте график. На график какой функции он похож?

Графики функций $y = a \cdot \sin x$ и $y = a \cdot \cos x$

Рассмотрим влияние коэффициента a на графики функций

$y = a \cdot \sin x$, $y = a \cdot \cos x$ на примерах.


Пример 1. В одной системе координат постройте график функций $y = \sin x$, $y = 2 \sin x$, $y = \frac{1}{2} \sin x$ на отрезке $[0; 2\pi]$

Решение: Если на графике функции $y = \sin x$ абсциссы оставить без изменения, а ординаты умножить на 2, то получим точки, принадлежащие графику функции $y = 2 \sin x$. Если на графике функции $y = \sin x$ абсциссы оставить без изменения, а ординаты разделить на 2, то получим точки, принадлежащие графику функции $y = \frac{1}{2} \sin x$.

Составим таблицу значений в 5 основных точках заданных функций.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin x$	0	1	0	-1	0
$2 \sin x$	0	2	0	-2	0
$\frac{1}{2} \sin x$	0	$\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0

- $y = \sin x$
- $y = 2 \sin x$
- $y = \frac{1}{2} \sin x$




Пример 2. В одной системе координат постройте график функций $y = \cos x$ и $y = 2 \cos x$ на отрезке $-2\pi \leq x \leq 2\pi$.

Решение: График функции $y = 2 \cos x$ получается растяжением графика функции $y = \cos x$ от оси Ox . Чтобы построить график этой функции, на отрезке $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ достаточно изобразить его на отрезке $[0; 2\pi]$, длина которого равна периоду, а затем повторить его на отрезке $[-2\pi; 0]$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$	1	0	-1	0	1
$2 \cos x$	2	0	-2	0	2

- $y = \cos x$
- $y = 2 \cos x$



Пример 3. В одной системе координат постройте график функций

а) $y = \cos x$, $y = -\cos x$; б) $y = \sin x$, $y = -\frac{1}{2} \sin x$

Решение:

а)




График функции $y = -\cos x$ симметричное преобразование графика $y = \cos x$ относительно оси x .

б)




График функции $y = -\frac{1}{2} \sin x$ получается симметричным преобразованием относительно оси x и сжатием в 2 раза к оси x графика функции $y = \sin x$

Влияние коэффициента a на графики функций $y = a \cdot \cos x$ ($y = a \cdot \sin x$)

♦ $a > 0$

✓ $a > 1$ график функции растянут вертикально от оси абсцисс.


✓ $0 < a < 1$, график сжимается к оси абсцисс.

♦ $a < 0$, график отображается симметрично относительно оси x .

✓ $-1 < a < 0$, график симметрично отображается относительно оси x и сжимается к оси абсцисс.

✓ $a < -1$, график симметрично отображается относительно оси x и растягивается вертикально от оси абсцисс.

С помощью инструментов www.geogebra.org/calculator постройте графики функций при произвольных значениях a .



Обучающие задания

1. Как изменится синусоида для функции $y = a \cdot \sin x$ с изменением коэффициента a ? Опишите словами, изобразите схематично.

а) $a = 4$ б) $a = \frac{1}{2}$ в) $a = -3$ г) $a = -\frac{1}{2}$

2. Постройте график функции $y = \sin x$ на отрезке $[0; 2\pi]$ по пяти основным точкам. Преобразуйте эти пять точек при помощи растяжения (сжатия) по координатным осям в соответствующие точки и изобразите график функции:

а) $y = 3 \sin x$ и $y = -3 \sin x$ б) $y = \frac{1}{2} \sin x$ и $y = -\frac{1}{2} \sin x$

3. Постройте график функции $y = \cos x$ на отрезке $[0; 2\pi]$ по пяти основным точкам. Преобразуйте эти пять точек при помощи растяжения (сжатия) по координатным осям в соответствующие точки и изобразите график функции:

а) $y = 3 \cos x$ б) $y = \frac{1}{2} \cos x$ в) $y = -2 \cos x$ г) $y = -\frac{1}{2} \cos x$


4. Установите соответствие между графиками функций и их формулами.

а) $y = \sin x$

б) $y = -2 \sin x$


в) $y = \frac{1}{2} \sin x$

г) $y = 3 \sin x$



5. По координатам отмеченных точек на графиках функций определите их формулы.

$A(\frac{\pi}{2}; 1)$, $B(\frac{\pi}{2}; -\frac{1}{2})$, $C(\frac{\pi}{2}; -2)$



6. В одной системе координат построьте графики функций $y = \cos x$, $y = -\cos x$, $y = -2 \cos x$ и $y = 2 \cos x$.

Графики функций $y = \sin bx$ и $y = \cos bx$

Рассмотрим влияние коэффициента b на графики функций $y = \sin bx$, $y = \cos bx$ на примерах.

Пример 2. В одной системе координат постройте график функций $y = \sin x$, $y = \sin 2x$ и $y = \sin \frac{1}{2}x$

Решение. Построим график функций по пяти основным точкам.

	нуль	максимум	нуль	минимум	нуль
$y = \sin x$	$x = 0$	$x = \frac{\pi}{2}$	$x = \pi$	$x = \frac{3\pi}{2}$	$x = 2\pi$
$y = \sin 2x$	$2x = 0$ $x = 0$	$2x = \frac{\pi}{2}$ $x = \frac{\pi}{4}$	$2x = \pi$ $x = \frac{\pi}{2}$	$2x = \frac{3\pi}{2}$ $x = \frac{3\pi}{4}$	$2x = 2\pi$ $x = \pi$
$y = \sin \frac{1}{2}x$	$\frac{1}{2}x = 0$ $x = 0$	$\frac{1}{2}x = \frac{\pi}{2}$ $x = \pi$	$\frac{1}{2}x = \pi$ $x = 2\pi$	$\frac{1}{2}x = \frac{3\pi}{2}$ $x = 3\pi$	$\frac{1}{2}x = 2\pi$ $x = 4\pi$

- $y = \sin x$
- $y = \sin 2x$
- $y = \sin \frac{1}{2}x$




График функции $y = \sin 2x$ в 2 раза “обгоняет” график функции $y = \sin x$. Если функция $y = \sin x$ принимает значения от 0 до 1 на промежутке $[0; \frac{\pi}{2}]$, то функция $y = \sin 2x$ эти же значения принимает в промежутке $[0; \frac{\pi}{4}]$. Точки графика функции $y = \sin 2x$ можно получить, умножив абсциссы точек графика функции $y = \sin x$ на $\frac{1}{2}$, при этом не меняя значения ординат.

График функции $y = \sin 2x$ получается из графика $y = \sin x$ сжатием в 2 раза и целый период уместается в отрезке $[0; \pi]$.

График функции $y = \sin \frac{1}{2}x$ получается растяжением от оси ординат графика функции $y = \sin x$ в 2 раза и целый период уместается в отрезок $[0; 4\pi]$.

Обучающие задания

- 7.** График какой функции получится из графика 1) $y = \sin x$, 2) $y = \cos x$ при: а) растяжении от оси ординат в 4 раза; б) сжатие к оси ординат в 3 раза.
- 8.** Представьте словесно, в результате каких преобразований из графика функции $y = \cos x$ получается график функции: а) $y = \cos \frac{1}{3}x$ б) $y = \cos 4x$ в) $y = -4 \cos 3x$

Амплитуда и период функций вида $y = a \cdot \sin bx$, $y = a \cdot \cos bx$

Как видно из графиков функции $y = a \cdot \sin bx$ или $y = a \cdot \cos bx$, ($b \neq 0$) период этих функций при $|b| \neq 1$ отличается от 2π .

Чтобы найти период функции, заданной в виде $y = \sin bx$ или $y = \cos bx$, достаточно решить следующее двойное неравенство:

$$0 \leq |b|x \leq 2\pi$$

$$0 \leq x \leq \frac{2\pi}{|b|}$$

Отсюда находим, что период функции можно найти по формуле $T = \frac{2\pi}{|b|}$

$|a|$ является **амплитудой**.

Пример 1. Найдите амплитуду и основной период функции $y = -3\sin 4x$.

Решение: Для функции $y = -3\sin 4x$ амплитуда равна $|-3|$ или 3,


Основной период:

$$0 \leq 4x \leq 2\pi \quad 0 \leq x \leq \frac{2\pi}{4} \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

$$T = \frac{\pi}{2}$$

Пример 2. Запишите формулу функций согласно ее графику в виде $y = a \cdot \sin bx$

Решение: По графику можно определить амплитуду. $a = 2$



По графику видно, что основной период этой функции - $T = \frac{\pi}{4}$.

Поскольку и $T = \frac{2\pi}{b}$ получаем равенство $\frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{b}$. Отсюда, $b = 8$.

Формула функции: $y = 2 \sin 8x$

Пример 3. Найдите амплитуду и основной период функции $y = 2\sin 2x$, постройте ее график на отрезке $[-\pi; \pi]$.


Решение. Амплитуда: $a = 2$.

Основной период: $T = \frac{2\pi}{|b|}$, $b = 2$; $T = \pi$.


Разделим отрезок $[0; \pi]$ (один период) на 4 равные части. Построим график отрезка $[0; \pi]$ по пяти основным точкам.

Составим таблицу для значений x и соответствующих значений функции.

	x	$y = 2 \sin 2x$
нули	0	0
максимум	$\frac{\pi}{4}$	2
нули	$\frac{\pi}{2}$	0
минимум	$\frac{3\pi}{4}$	-2
нули	π	0



Если полученный график повторим на отрезке $[-\pi; 0]$, то получится график функции $y = 2 \sin 2x$ на отрезке $[-\pi; \pi]$



Обучающие задания

9. Найдите амплитуду и основной период функции.

а) $y = \frac{1}{2} \cos \pi x$

б) $y = \sin 2x$

в) $y = 3 \cos \frac{1}{4} x$


г) $y = 5 \cos \frac{1}{2} x$

д) $y = 2 \sin \frac{1}{2} \pi x$


е) $y = \frac{1}{3} \sin 4\pi x$

10. Найдите амплитуду и основной период функции.


а)






б)






в)



11. Запишите формулу функции вида $y = a \sin bx$, соответствующую графику.



12. Запишите формулу функции вида $y = a \cos bx$, соответствующую графику.



13. 2) Для заданной амплитуды и периода, напишите формулу функции $y = a \sin bx$ (здесь $a > 0, b > 0$).

а) Амплитуда : $\frac{1}{2}$

б) Амплитуда: 4

в) Амплитуда: 2

Период: 3π

Период: π

Период: 2π

- 2) Для заданной амплитуды и периода напишите формулу функции $y = a \cos bx$ (здесь $a > 0, b > 0$).

а) Амплитуда : $\frac{1}{3}$

б) Амплитуда: 2

в) Амплитуда: 5

Период: 5π

Период: π

Период: $\frac{\pi}{2}$

14. Определите основной период функций и постройте график по пяти основным точкам.

а) $f(x) = 2 \sin \frac{2x}{3}$,

б) $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$,

в) $f(x) = 3 \sin \frac{1}{3} x$,

15. Определите функцию, где амплитуда равна 4, а период -2 .


а) $g(x) = 4 \cos 2x$

б) $g(x) = 2 \cos \frac{1}{2} x$

в) $g(x) = 4 \cos \pi x$

г) $g(x) = 2 \sin 4x$

16. Эльмир построил синусоиду, как показано на рисунке, с помощью графкалькулятора. Какое уравнение соответствует этому графику?



а) $y = -3 \sin 4x$

б) $y = 3 \cos 4x$

в) $y = 3 \sin \frac{1}{4} x$


г) $y = 3 \cos \frac{1}{4} x$

Графики функций $y = \sin(x-c)$ и $y = \cos(x-c)$

В функциях $y = \sin(x-c)$, $y = \cos(x-c)$ член c показывает смещение графика по горизонтали, которое называется **фазой**.


Пример 1. Запишите преобразование графика функции $g(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ относительно функции $f(x) = \sin x$ и постройте их графики в одной системе координат.

Решение. Если мы сдвинем график функции $f(x) = \sin x$ на $\frac{\pi}{2}$ единицы влево получится график функции $g(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2})$. В этом случае период f , начинающийся с точки $x = 0$, соответствует периоду g , начинающегося с $x = -\frac{\pi}{2}$.



Пример 2. Запишите преобразование графика функции $g(x) = \cos(x - \frac{2\pi}{3})$ относительно функции $f(x) = \cos x$ и постройте их графики в одной системе координат.

Решение. Если мы сдвинем график функции $f(x) = \cos x$ на $\frac{2\pi}{3}$ единицы вправо получится график функции $g(x) = \cos(x - \frac{2\pi}{3})$. В этом случае период f , начинающийся с точки $x = 0$, соответствует периоду g , начинающегося с точки $\frac{2\pi}{3}$.



При $c > 0$ график сдвигается вправо, при $c < 0$ — влево.

Обучающие задания

17. Опишите словесно этапы преобразования графика функции $y = \sin x$ для следующих функций. Изобразите графики функций в одной системе координат.

а) $y = \sin(x + \frac{2\pi}{3})$ б) $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ в) $y = \sin(x + 60^\circ)$

18. Опишите словесно этапы преобразования графика функции $y = \cos x$ для следующих функций. Изобразите графики функций в одной системе координат.

а) $y = \cos(x - \frac{\pi}{4})$ б) $y = \cos(x + \frac{\pi}{3})$ в) $y = \cos(x + 180^\circ)$

19. Постройте график функции а) $y = \cos(x - \frac{\pi}{2})$; б) $y = \sin(x + \frac{\pi}{2})$. Исследуйте взаимосвязь этих функций с функциями $y = \sin x$ и $y = \cos x$.

Графики функций $y = a \cdot \sin bx + d$, $y = a \cdot \cos bx + d$


Смещение по вертикали.

В функциях $y = a \cdot \sin bx + d$ и $y = a \cdot \cos bx + d$ член d показывает смещение по вертикали: если $d > 0$ график функции сдвигается вверх, $d < 0$ график сдвигается вниз.

Пример. Постройте график функции $y = 2 \sin x - 1$.

Решение: ниже показаны этапы преобразования графика функции $y = \sin x$ в график функции $y = 2 \sin x - 1$ по шагам.

1. Увеличиваем амплитуду в 2 раза получаем график $y = 2 \sin x$.
2. Сдвигаем график вниз на одну единицу и получаем график функции $y = 2 \sin x - 1$.



Для функции $y = 2 \sin x - 1$, имеем:

амплитуда: $a = 2$,

сдвиг по вертикали: $d = -1$


максимальное значение: $d + a = -1 + 2 = 1$

минимальное значение: $d + a = -1 - 2 = -3$

множество значений: $-3 \leq y \leq 1$.


Обучающие задания

- 20.** В одной системе координат постройте графики функций:
 $y = \sin x - 2$, $y = \sin x$, $y = \sin x + 2$
- 21.** Схематично изобразите график функции и запишите множество значений.
 а) $y = 3 \cos x + 5$ б) $y = 4 \sin x - 4$ в) $y = 2 \sin x + 1$ г) $y = -2 \cos x + 3$
- 22.** Представьте словесно в результате каких преобразований из графика функции $y = \sin x$ или $y = \cos x$ получается график функции:
 а) $y = 5 - \cos(x - \frac{\pi}{4})$ в) $y = 3 + \cos(x + \frac{\pi}{4})$
 б) $y = -2 - \sin(x - \pi)$ г) $y = 2 + \sin(x - \frac{\pi}{3})$




Пример. Постройте график функции $y = 3 \cos(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$.


1) График функции $y = \cos 2x$ получается сжатием в 2 раза графика функции $y = \cos x$ к оси ординат.




2) График функции $y = \cos 2(x - \frac{\pi}{3})$ можно получить смещением графика функции $y = \cos 2x$ вправо на $\frac{\pi}{3}$ единиц.



3) График функции $y = 3 \cos 2(x - \frac{\pi}{3})$ получается путем растягивания графика функции $y = \cos 2(x - \frac{\pi}{3})$ три раза вдоль оси ординат.



4) График функции $y = 3 \cos(2x - \frac{\pi}{3}) + 1$ получается параллельным переносом на 1 единицу вверх графика функции $y = 3 \cos(2x - \frac{\pi}{3})$.




Пример 2. Постройте график функции $y = 3 \cos 2 \left(x - \frac{\pi}{3} \right) + 1$ по пяти основным точкам.

Решение:

1. Для нахождения основного периода функции $y = 3 \cos 2 \left(x - \frac{\pi}{3} \right) + 1$ надо решить неравенство: $0 \leq 2 \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \leq 2\pi$

$$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{4\pi}{3}, \quad \text{т.к.} \quad \frac{4\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \pi \quad \text{то} \quad T = \pi$$


2. Отрезок $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right]$, соответствующий одному периоду по оси x разделим на четыре равные части.



3. Вычислим значения функции $y = 3 \cos 2 \left(x - \frac{\pi}{3} \right) + 1$ при указанных точках. Запишем координаты соответствующих точек.

$$\left(\frac{\pi}{3}; 4 \right), \left(\frac{7\pi}{12}; 1 \right), \left(\frac{5\pi}{6}; -2 \right), \left(\frac{13\pi}{12}; 1 \right), \left(\frac{4\pi}{3}; 4 \right)$$

4. По этим точкам построим график функции.



Для функции $y = 3 \cos 2 \left(x - \frac{\pi}{3} \right) + 1$, имеем:

амплитуда: $a = 3$, основной период: $T = \pi$,

сдвиг по фазе: $c = \frac{\pi}{3}$, сдвиг по вертикали: $d = 1$

максимальное значение: $d + a = 1 + 3 = 4$

минимальное значение: $d - a = 1 - 3 = -2$,

область определения: множество всех действительных чисел ($x \in R$),

множество значений: $-2 \leq y \leq 4$

Обучающие задания

- 23.** Опишите словесно этапы преобразования графика функции $y = \sin x$ для следующих функций.

а) $y = \sin(x + \frac{2\pi}{3})$ б) $y = 3 \sin \frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{4})$ в) $y = 2 \sin(x + 60^\circ) - 4$

- 24.** Опишите словесно этапы преобразования графика функции $y = \cos x$ для следующих функций.

а) $y = \cos(x - \frac{5\pi}{6})$ б) $y = 3 \cos(2x + \frac{\pi}{6})$ в) $y = 4 \cos(x - 15^\circ) + 3$

- 25.** Найдите: максимальное, минимальное значения; множество значений.




а) $y = 3 \cos(x - \frac{\pi}{2}) + 5$ б) $y = \frac{1}{2} \sin 3x - 3$ в) $y = \frac{1}{3} \cos(x + 50^\circ) + \frac{1}{6}$

- 26.** Установите соответствие между графиком и функцией.

1) $y = \cos(x + \frac{\pi}{2})$

2) $y = -\sin(x + \pi)$

3) $y = 1 + \sin \frac{1}{2}x$



- 27.** Запишите формулу для функции вида $y = a \sin b(x - c) + d$.

а) амплитуда 4, основной период π , сдвиг по фазе $\frac{\pi}{4}$ единиц вправо, сдвиг по вертикали 6 единиц вниз.

б) амплитуда 0,5, основной период 3π , сдвиг по фазе $\frac{\pi}{3}$ единиц влево, сдвиг по вертикали 2 единицы вверх.

- 28.** Постройте график функции на одном периоде по 5-ти основным точкам.

а) $y = \sin \frac{1}{4}x$ б) $y = 5 \sin 2\pi x$ в) $y = 3 \cos 4x$ г) $y = \frac{1}{2} \sin 2x$

- 29.** Схематично изобразите графики функций.

а) $y = 3 \sin(x - \frac{\pi}{4})$ б) $y = \cos(x + \frac{\pi}{3}) + 2$ в) $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6}) + 3$


Пример. Движение карусели. Допустим вы находитесь в кабинке карусели. Расстояние до земли периодически изменяется в зависимости от времени. Примем ось карусели за начало движения. Диаметр карусели равен 20 м и за 3 минуты карусель делает 4 оборота.

- а) Изобразите график движения карусели, приняв ось t за время, а ось h за расстояние.
 б) Найдите основной период и запишите формулу, соответствующую движению карусели.

Решение: Если карусель делает 4 оборота за 3 минуты, то один оборот занимает $3/4$ минуты, т.е. 45 секунд.

Карусель может отклоняться от начального положения на $20 : 2 = 10$ м вверх (10) и вниз (-10). Графиком движения является синусоида с периодом 45 секунд.

Запишем формулу функции в виде $y = a \sin bx$.




$$T = \frac{2\pi}{b}, \quad \frac{2\pi}{b} = 45, \quad b = \frac{2\pi}{45}. \quad \text{Амплитуда: } 10$$


Формула функции: $h = 10 \sin \frac{2\pi}{45} t$

- 1. Наргиз на карусели.** График показывает зависимость между высотой(м), на которой находится Наргиз при катании на карусели, и временем (сек.). Запишите:

- 1) период функции и что он выражает;
- 2) множество значений функции;
- 3) в какой момент времени между 24 - 30 секундами Наргиз окажется на высоте 4 м от земли?




2. **Физика.** На рисунке показано движение тела, подвешенного на пружине. Тело, в состоянии покоя, находится в равновесии. Состояние покоя примем за начало движения. a показывает изменение положения тела при перемещении. Количество циклов за единицу времени называется **частотой** (ν), время, за которое совершается полный цикл колебания называется **периодом** (T). Частота и период взаимно обратные величины: $\nu = \frac{1}{T}$




Движение тела, подвешенного на пружине можно смоделировать функцией $y = a \cos kt$. Здесь y показывает положение равновесия пружины по вертикали (см), a - начальное изменение положения, k - коэффициент упругости пружины, t - время (сек.). Если $a = 0,5$ см и $k = 5\pi$, то найдите амплитуду, период и частоту колебания.

3. Движение маятника может быть смоделировано по формуле $d = 4 \cos 8\pi t$. Здесь d показывает отклонение от начального положения (в см), t - время (в сек.). Найдите, на какое наибольшее расстояние может отклоняться маятник? Найдите период и частоту.



4. При каждом ударе человеческого сердца давление крови изменяется между наибольшим и наименьшим значением. Нормой артериального давления принято считать 120 мм ртутного столба на верхней границе (систола) и 80 мм ртутного столба на нижней границе (диастола).



На рисунке изображён график артериального давления человека.

- 1) По графику найдите период (время, за которое происходит один удар) и амплитуду.
- 2) Найдите количество ударов за минуту.

5. Движение велосипеда по прямой было зафиксировано ночью с помощью видеонаблюдения. В таблице представлена информация о лампочке на колесе велосипеда - высота в разные моменты времени.



Время (t сек.)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
Высота (H см)	27	45	54	45	27	18	27	45	54

- Постройте график функции для одного периода.
- Смоделируйте в виде тригонометрической функции зависимость H от t .
- Найдите диаметр колеса велосипеда.
- Найдите скорость велосипеда.

Пример 2. Биология. В биологии прогнозирование численности зверей и птиц моделируют с помощью периодических функций. Учёные исследуют численность сов и мышей в одном регионе. В результате моделируется функция численности особей (по месяцам).

Для сов эта функция записывается так: $V(t) = 1000 + 100 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$,
 для мышей так: $S(t) = 20000 + 4000 \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$.

По информации, представленной на графике, можно сделать выводы о численности сов и мышей, которые являются пищей для сов.

- Постройте графики каждой функции.
- Какой вывод можно сделать об изменении численности сов и мышей?
- Исследуйте отношение численности сов и мышей в зависимости от времени.

Решение: а) $V(t) = 1000 + 100 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$

Для сов имеем: максимум функции 1100, минимум 900.

Амплитуда: 100. Сдвиг по вертикали: $d = 1000$ (начальное значение).

Период: $\frac{2\pi}{|b|}$, $b = \frac{\pi}{12}$, тогда $2\pi : \frac{\pi}{12} = 24$

Т.е., основной период функции 24 месяца.

$S(t) = 20000 + 4000 \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$

Для мышей имеем: максимум функции 24 000, минимум 16 000.

Амплитуда: 4000. Сдвиг по вертикали: $d = 20000$ (начальное значение)


Период: $\frac{2\pi}{|b|}$, $b = \frac{\pi}{12}$, тогда $2\pi : \frac{\pi}{12} = 24$.

То есть основной период данной функции, также 24 месяца.

б) Если графики построены в одном масштабе, то их можно сравнить. Так как мыши являются пищей для сов, то при увеличении сов, численность мышей уменьшается и стремится к минимальному значению. При уменьшении сов, численность мышей увеличивается и достигает наибольшего значения в то время, когда количество сов достигает минимума.

в) В таблице показано отношение количества сов и мышей за каждые 6 месяцев.

Время	Совы	Мыши	Отношение
0	1000	24000	0,041
6	1100	20000	0,055
12	1000	16000	0,062
18	900	20000	0,045
24	1000	24000	0,041




Это отношение должно изменяться в определённой закономерности. Для того, чтобы увидеть эту закономерность, построим функцию соответствующую отношению при помощи граф калькулятора.

Функцию $V(t) = 1000 + 100 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ введём в граф калькулятор как y_1 , а

функцию $S(t) = 20000 + 4000 \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ как y_2 .

и построим график функции $y = \frac{y_1}{y_2}$.

Увидим, что в этом случае отношение двух периодических функций является периодической функцией.



6. **Биология.** $D(t)$ и $\zeta(t)$ математические модели, которые соответствуют количеству зайцев и шакалов:

$$D(t) = 30000 + 15000 \cos \frac{\pi t}{12}$$

$$\zeta(t) = 4000 + 2000 \sin \frac{\pi t}{12}$$

Постройте графики обеих функций в одной системе координат и представьте условия диаграммы на графике.



7. **Прогноз погоды.** Информация в таблице показывают среднемесячную температуру. Постройте график, отмечая на горизонтальной оси месяца (январь $t = 1$, февраль $t = 2$ и т.д.), а на вертикальной - температуру. Смоделируйте изменение температуры с помощью тригонометрической функции.

Месяца	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Средняя температура (°C)	-14,8	-12,7	-6,8	1,2	9,2	15,1	17,2	15,1	9,1	1,3	-6,7	-12,6

8. **Здоровье.** Функция $P = 100 - 20 \cos \frac{5\pi t}{2}$ показывает нормальное артериальное давление человека в состоянии покоя


t (сек.) время за которое можно определить давление.

а) Определите период функции.

б) Найдите количество ударов сердца человека за 1 минуту.

9. Карусель, ось которой расположена на расстоянии 10 м от земли

совершает полный оборот за 60 секунд. Пассажиры садятся на карусель в кабинку на высоте 2 м. График на рисунке показывает движение карусели за 150 секунд.



а) Запишите функцию, выражающую высоту любой кабинки в каждый момент времени.

б) Когда карусель начала двигаться, Гюнель находилась в самой нижней кабинке. Определите, на какой высоте будет находиться Гюнель через 2,5 минуты?.

Исследование. Изменение тангенса угла. 1) На листе в клетку изобразите координатную систему и единичную окружность, с центром в начале координат. К окружности проведите касательную в точке $(1;0)$.

2) Обозначим через K точку пересечения конечной стороны угла поворота θ с касательной.

Из $\triangle OAK$ $\tan \theta = \frac{AK}{OA} = \frac{AK}{1} = AK$. Значение $\tan \theta$, для острого угла поворота θ равно длине отрезка AK .

3) В какой точке пересекает конечная сторона угла 45° касательную?

4) При помощи транспортира изобразите ещё несколько разных углов и найдите ординаты точек пересечения с касательной.


5) Как изменяется ордината точки K при стремлении угла θ к 90° ?

Пересекается ли касательная с конечной стороной угла поворота при $\theta = 90^\circ$?

6) Известно, что для периодической функции с периодом T достаточно изучить функцию на одном интервале длиной T .

На каком интервале для $\tan \theta$ целесообразно изучение функции?

7) $\tan \theta$ не определён для $\theta = 90^\circ$ и $\theta = -90^\circ$. В интервале $(-90^\circ; 90^\circ)$ функция определена.



Заполните таблицу и постройте график функции тангенса.

Измерения угла	-70°	-60°	-45°	-30°	0°	30°	45°	60°	70°
Ордината точки на касательной									


8) Постройте график функции $y = \tan \theta$ при помощи графкалькулятора.

График функции $y = \tan x$



Как видно по рисунку, длина отрезка касательной AQ равна абсолютной величине ординаты точки Q . Координаты точки Q равны $(1; \tan \theta)$. Прямая AQ называется прямой тангенсов.

При $\tan 0 = 0$ график функции $y = \tan x$ проходит через начало координат. Если x , оставаясь меньше $\frac{\pi}{2}$, стремится к $\frac{\pi}{2}$, то значения $\tan x$ увеличиваются и приближаются к $+\infty$.


Прямые $x = \frac{\pi}{2}$, так же как и $x = \frac{\pi}{2} \cdot (2k + 1)$ ($k \in \mathbb{Z}$) являются вертикальными асимптотами графика $y = \tan x$.



Разобьём I четверть единичной окружности и отрезок $[0; \frac{\pi}{2})$ на 4 равные части. На линии тангенсов построим отрезки, равные значению тангенса соответствующих углов. Через отмеченные точки, параллельно оси Ox , проведём параллельные прямые. На оси Ox отметим точки, соответствующие данным углам, и восстановим к каждой из них перпендикуляр. Полученную последовательность точек пересечения соответствующих прямых соединим сплошной линией. Получим график функции $y = \tan x$ в промежутке $[0; \frac{\pi}{2})$. Учитывая, что $\tan(-x) = -\tan x$, преобразуем полученный график симметрично относительно начала координат, получим график функции $y = \tan x$ на интервале $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$



Зная, что период функции $y = \tan x$ равен π , построенный график продолжим на π вправо и влево. Получим график, который называется тангенсоида.



Основные свойства функции $y = \tan x$

- Область определения функции:
 $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, (n \in \mathbb{Z})$
- Область значений функции множество всех действительных чисел.
- Функция нечетная: $\tan(-x) = -\tan x$
- Основной период функции равен π .
- Функция не имеет ни максимума, ни минимума.
- График функции пересекает ось x в точках $x = \pi n, (n \in \mathbb{Z})$
- Функция не определена в точках $x = \frac{\pi}{2} + \pi n (n \in \mathbb{Z})$. Пунктирные линии, проходящие через эти точки, являются вертикальными асимптотами.
- Функция возрастает между двумя соседними асимптотами.

Обучающие задания

1. Вычислите, используя свойства функции тангенса.

а) $\tan(-\frac{\pi}{4})$

б) $\tan(\frac{5\pi}{4})$

в) $\tan(-\frac{11\pi}{3})$

2. Постройте график функции $y = \tan x$ на промежутке $[-2\pi; 2\pi]$.

График функции $y = \cot x$

Для построения графика функции $y = \cot x$ воспользуемся тождеством $\cot x = -\tan(x + \frac{\pi}{2})$.

- 1) Переместим график функции $y = \tan x$ влево вдоль оси абсцисс на $\frac{\pi}{2}$.
- 2) Отообразим полученную кривую симметрично относительно оси абсцисс.



При $x = \pi n$ значения тангенса равны нулю, функция котангенса при данных значениях x не определена:

$$\cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}$$

Как видно по графику, точки пересечения с осью x (нули) и асимптоты функций тангенса и котангенса меняются местами.

Основные свойства функции $y = \cot x$.





- Область определения: $x \neq \pi n, (n \in \mathbb{Z})$
- Область значений функции множество всех действительных чисел.
- Функция нечетная: $\cot(-x) = -\cot x$
- Основной период функции равен π .
- Функция не имеет ни максимума, ни минимума.
- График функции пересекает ось x в точках $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, (n \in \mathbb{Z})$
- Функция не определена в точках $x = \pi n (n \in \mathbb{Z})$. Пунктирные линии, проходящие через эти точки являются вертикальными асимптотами.
- Функция возрастает между двумя соседними асимптотами.

**Обучающие задания**


3. Ответьте на следующие вопросы:

- а) Функция тангенса не определена для $\alpha = 90^\circ$ и $\alpha = -90^\circ$. Как ведут себя графики этих функций?
- б) Сколько радиан и сколько градусов составляет период функции тангенса?

4. Найдите $\tan \theta$ и градусную меру угла θ .



5. По графику функции $\tan \theta$ найдите следующие значения.



- а) $\tan \frac{\pi}{4}$ б) $\tan \frac{3\pi}{4}$ в) $\tan(-\frac{7\pi}{4})$
 г) $\tan 0$ д) $\tan \pi$ е) $\tan \frac{5\pi}{4}$

6. Постройте графики функций на заданном промежутке.

- а) $y = \tan x \quad -90^\circ < x < 90^\circ$ в) $y = \tan x \quad -90^\circ < x < 270^\circ$
 б) $y = \tan x \quad \frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$ г) $y = \tan x \quad -\pi \leq x \leq \pi$

7. а) Зная, что если $\alpha = \frac{11\pi}{24}$, то $\tan \alpha \approx 7,6$ и, используя основной период функции тангенса, запишите ещё три значения для угла α .

б) Зная, что если $\alpha = 1,25$, то $\tan \alpha \approx 3$ и, используя основной период функции тангенса, запишите ещё три значения для угла α .

в) Запишите два значения x из промежутка $-\pi \leq x \leq \pi$, в которых функция $y = \tan x$ не определена.

8. При приближении значений x к 90° часть графика функции $y = \tan x$ словно принимает форму вертикальной прямой. Вычислите значения тангенсов углов в таблице при помощи калькулятора. Как изменяются значения тангенсов для угла θ при приближении к 90° и при удалении от угла 90° ?

θ	$\tan \theta$
$89,5^\circ$	
$89,9^\circ$	
$89,999^\circ$	
$89,999999^\circ$	

θ	$\tan \theta$
$90,5^\circ$	
$90,01^\circ$	
$90,0001^\circ$	
$90,000001^\circ$	

9. Для каждой функции на промежутке $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ найдите:

- а) нули; б) вертикальные асимптоты.
 1) $y = \tan x$ 2) $y = \cot x$

10. Найдите три таких значения x на промежутке $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, при которых не определена функция: а) котангенса; б) тангенса.

11. Постройте графики функций $y = \tan x$, $y = \cot x$ и по графику объясните чётными, или нечётными являются данные функции. Сделайте соответствующую математическую запись.

12. Постройте графики функций.


а) $y = \tan \left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

б) $y = \tan \left(x + \frac{\pi}{2}\right)$


в) $y = \tan \left(x - \frac{\pi}{3}\right)$

г) $y = \tan \left(x + \frac{\pi}{6}\right)$


13. Установите соответствие между графиком и функцией.



а) $y = \cot x$



б) $y = \cot \left(x + \frac{\pi}{2}\right)$



в) $y = -\cot x$


14. Лестница находится на расстоянии 3 м от стены и составляет угол α с плоскостью пола. Высота от края лестницы до пола h м.

а) Запишите зависимость h от угла α при помощи функции тангенса.

б) Постройте график функции на интервале $0^\circ \leq \alpha \leq 70^\circ$.

в) Как изменяется высота h при увеличении угла α ?

г) Что происходит при $\alpha = 90^\circ$?




15. Камера наблюдения за забором установлена на расстоянии 5 м от середины забора. Один полный оборот обзора она выполняет за 60 секунд.

а) Камера начинает наблюдение от середины забора по участку длиной d .

Выразите в виде функции тангенса зависимость расстояния d от времени t .

Примите за начало отсчета $t = 0$ момент времени, когда точка наблюдения находится на середине забора.



Указание: При целом повороте камера совершает поворот на 360° . Найдите, на сколько градусов поворачивается камера за 1 секунду.

б) Постройте график этой функции на интервале $-15 < t < 15$.

в) Какую часть забора можно наблюдать за время $t = 10$ секунд?


г) Что произойдёт в момент $t = 15$ секунд?

1. Покажите на графике точки пересечения с осью x , максимумы и минимумы функции.

а) Если график соответствует функции $y = 2\sin 3x$ и координаты точки $A(0; 0)$, то найдите координаты точек B, C, D, E, F .

б) Если график соответствует функции $y = 3\cos 2x$ и координаты точки $B(0; 3)$, то найдите координаты точек A, C, D, E, F .

в) Если график соответствует функции $y = \sin \frac{1}{2}x$ и координаты точки $A(-2\pi; 0)$, то найдите координаты точек B, C, D, E, F .



2. Запишите две различные функции синуса и косинуса, если область определения множество всех действительных чисел $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$, а множество значений отрезок $[-3; 3]$.

3. Найдите а) период; б) амплитуду функции; в) постройте график функции.


1) $y = 6 \sin \frac{2}{3}x$ 2) $y = 3 \cos \frac{1}{2}x$ 3) $y = \frac{1}{2} \cot 2x$ 4) $2y = \tan 2x$

4. Рекламная надпись освещается от источника, расположенного на расстоянии 10 м от здания.

а) Выразите зависимость расстояния a от угла θ в виде тригонометрической функции.

б) Заполните таблицу, округлив значения a до десятых.

в) Как видно из таблицы, значения θ увеличиваются на одинаковый шаг. Верно ли данное предположение для значений a ?



θ	$\frac{\pi}{18}$	$\frac{\pi}{9}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{9}$
a				


г) Если $0 \leq \theta \leq \frac{4\pi}{9}$, то какую наибольшую часть рекламного щита освещает источник?

5. а) Минимум синусоиды расположен в точке $(18; 44)$, а максимум в точке $(30; 68)$. Найдите амплитуду функции.

б) За один период синусоида достигает максимального значения в точке $(4; 12)$, минимального значения в точке $(12; -2)$. Найдите период функции.

в) На отрезке, длиной в один период, синусоида достигает максимума в точке $(\pi; 7)$, минимума в точке $(\frac{\pi}{2}; 3)$. Запишите формулу этой функции в виде $y = d + a \cdot \cos bx$.

6. Смоделируйте функцию синуса, которая позволит определить расстояние от земли до зелёной лампочки на карусели в любой момент времени. Примите самый нижний уровень зелёной лампочки при $t = 0$. Карусель совершает один полный оборот за 100 секунд.



7. **Глубина воды.** В таблице представлена информация об изменении уровня воды на пляже с полуночи до полудня.

- а) Смоделируйте изменение глубины воды при помощи функции вида $y = d + a \cdot \cos(bt + c)$.
б) На сколько изменилась глубина с 7 до 9 часов утра?

Время, t	Глубина, y
Полночь	3,2
02:00	9
04:00	11,9
06:00	9
08:00	3,2
10:00	0,3
Полдень	3,2

8. **Изменение температуры.** В Южно-Африканских странах преобладает тропический и субтропический климат. В этой части Земного шара с июня по август бывает зима. В таблице представлена ежемесячная максимальная температура за год в городе Кейптаун (ЮАР).

Месяца	Январь	Февраль	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь	Дек.
Темп. (°C)	28	27	25	22	18,5	16	15	16	18	21,5	24	26

По данным таблицы построен график. На горизонтальной оси последовательно отмечены месяца:


январь $t = 1$, февраль $t = 2$ и т.д..

На вертикальной оси отмечена температура.

Таблицу и график нарисуйте в тетрадь.

Зная, что среднемесячная температура

будет приблизительно повторяться в следующие 12 месяцев, продолжите график на следующие 12 месяцев.



9. Результат подъёма и опускания (в метрах) судна на волнах может быть смоделирован функцией $d = 0,6 \sin \pi t$. Здесь t показывает время (сек.). Начертите график функции на одном целом периоде.



10. **Задача открытого типа.** Запишите тригонометрическую функции с амплитудой $\frac{1}{2}$ и основным периодом π , постройте её график.

Многогранники**Призмы**

Многогранники. Виды многогранников с различных сторон

Площадь поверхности призмы

Сечения призмы плоскостью

Пирамиды

Площадь полной и боковой поверхности пирамиды


Усечённая пирамида




Многогранники

Многогранником называется тело, поверхность которого состоит из конечного числа плоских многоугольников, которые называются **гранями**. У многогранника не менее 4 граней. Отрезки, по которым пересекаются грани, называются **рёбрами**, а точки в которых пересекаются рёбра, называются **вершинами**.


Призма — многогранник, две грани которого являются конгруэнтными многоугольниками, лежащими в параллельных плоскостях, а остальные грани — параллелограммами.




Пирамида — это многогранник, одна грань которого многоугольник, а остальные грани — треугольники с общей вершиной.




В зависимости от формы многоугольника, лежащего в основании, призма может быть соответственно: треугольной, четырёхугольной, пятиугольной, шестиугольной и т. д.




треугольная
призма




прямоугольный
параллелепипед




пятиугольная
призма




шестиугольная
призма




треугольная
пирамида



четырёхугольная
пирамида







пятиугольная
пирамида







шестиугольная
пирамида

Многогранники бывают двух видов: выпуклые и вогнутые. Если многогранник целиком расположен по одну сторону от плоскости каждой его грани, то он является выпуклым. Многогранники А и В выпуклые, С и D - вогнутые.








Обучающие задания

1. Какая фигура является многогранником?






2. Для каждого многогранника определите количество граней, рёбер и вершин.



Многогранник	а)	б)	в)	г)	д)
Число граней					
Число рёбер					
Число вершин					

3. Напишите по прямоугольным параллелепипедам на рисунке:

- а) все конгруэнтные рёбра; б) все параллельные рёбра;
- в) все конгруэнтные грани; г) все параллельные грани;
- д) все перпендикулярные грани.




Формула Эйлера

У произвольного выпуклого многогранника между числом граней (F), рёбер (V) и вершин (E) существует связь, выражаемая формулой Эйлера: $F + V - E = 2$.

То есть сумма числа граней и числа вершин выпуклого многогранника на 2 больше, чем числа рёбер.

Пример. Многогранник имеет 14 граней. 8 граней треугольные и 6 восьмиугольные. Сколько вершин у этого многоугольника?




Решение. Общее число сторон 8 треугольников и 6 восьмиугольников: $8 \cdot 3 + 6 \cdot 8 = 72$. Но каждое ребро — это отрезок, по которому пересекаются две грани. Итак, количество ребер будет $72:2=36$. По формуле Эйлера можно найти количество вершин:

$$F + V = E + 2; 14 + V = 36 + 2; V = 24.$$

Ответ: У многогранника 24 вершины.

Например, квадраты, составляющие грани куба, имеют 24 стороны а у куба только 12 ребер.



4. Определите число вершин многогранников по формуле Эйлера.

а) Имеет 12 граней. Все грани - треугольники.



б) Имеет 26 граней. 8 из них - треугольники, а 18 - квадраты




в) Имеет 14 граней. 8 из них - треугольники, а 6 - квадраты



Правильные многогранники

Выпуклый многогранник, все грани которого являются конгруэнтными правильными многоугольниками, и в каждой его вершине сходится одинаковое число ребер, называется правильным. Эти фигуры так же называют платоновыми телами. Например, куб является правильным многогранником. Различают пять видов платоновых тел: тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр.

правильный тетраэдр




имеет 4 грани, каждая из которых правильный треугольник

куб




имеет 6 граней, каждая из которых квадрат

октаэдр




имеет 8 граней, каждая из которых правильный треугольник

додекаэдр



имеет 12 граней, каждая из которых правильный пятиугольник

икосаэдр



имеет 20 граней, каждая из которых правильный треугольник

5. Ляман сконструировала правильный многогранник, у которого грани - правильные пятиугольники со стороной 4 см. Ляман планирует сделать из этого многогранника LED лампу, протянув вдоль его всех ребер светодиодный провод. Сколько сантиметров такой проволоки понадобится Ляман?




Исследование.

Возможно ли построить с шестиугольниками платоновые тела?

Существует всего пять правильных многогранников. Подтвердить это можно с помощью развертки выпуклого многогранного угла. Сумма плоских углов в каждой вершине должна быть меньше 360° , иначе никакой многогранной поверхности не получится.

Проверьте эту мысль для каждой платоновой фигуры, используя градусную меру внутренних углов правильных многоугольников.



Угол правильного треугольника \triangle равен 60°

Сумма углов в каждой вершине:

С общей вершиной 3 треугольника : $(3 \times 60^\circ = 180^\circ)$

4 треугольника:

5 треугольников:

Угол квадрата \square равен ____ .

С общей вершиной - три квадратные грани:

Угол правильного пятиугольника \pentagon равен ____ .

С общей вершиной - три пятиугольные грани:

Угол правильного шестиугольника \hexagon равен ____ .

С общей вершиной - три шестиугольные грани:


Число многоугольников на одной вершине	Сумма углов на каждой вершине $< 360^\circ$	Название	Рисунок
3 треугольника	180°		
4 треугольника			
5 треугольников			
3 квадрата			
3 пятиугольника			

Призмы


Два конгруэнтных многоугольника, расположенных в параллельных плоскостях и совпадающих при параллельном переносе, и все отрезки, которые соединяют соответствующие точки многоугольников, образуют фигуру, которая называется призмой. Многоугольники называются **основаниями призмы**, а отрезки прямых, соединяющих соответствующие вершины, называются **боковыми рёбрами призмы**. Часть плоскости, проходящей через боковые рёбра призмы, называется **боковыми гранями призмы**. Боковые грани призмы параллелограммы. У каждого параллелограмма две стороны соответствуют сторонам основания, а две другие являются боковыми рёбрами.

Если боковые рёбра перпендикулярны плоскости основания, то призма называется **прямой призмой**, если не перпендикулярны, то призма называется **наклонной призмой**.

Правильная призма – это прямая призма, основанием которой является правильный многоугольник. Боковые грани правильной призмы прямоугольники.





Прямая призма




Наклонная призма

Расстояние между основаниями призмы называется **высотой**. Боковые рёбра прямой призмы являются её высотами.




Прямая, соединяющая две вершины призмы не принадлежащие одной грани, называется **диагональю** призмы.




Если в основании призмы лежит n - угольник, то она называется n -угольной призмой. n -угольная призма имеет: $2n$ вершин, $n + 2$ граней, $2n$ рёбер.

Например, на рисунке изображена призма с пятиугольным основанием. Значит у призмы - 10 вершин, 7 граней, 15 ребер.




Призма, в основании которой лежит параллелограмм, называется параллелепипедом. Противоположные грани параллелепипеда параллельны и конгруэнтны. Параллелепипед, в основании которого лежит прямоугольник, называется прямоугольным параллелепипедом. На рисунке показан прямоугольный параллелепипед $ABCA'B'C'D'$. Длины рёбер, выходящих из одной вершины прямоугольного параллелепипеда, называются измерениями параллелепипеда.



Обучающие задания

1. Какая из фигур на рисунке не является призмой? Обоснуйте свое мнение.




2. 1) По заданным измерениям начертите:

а) прямоугольный параллелепипед с размерами $3 \times 4 \times 3$.


б) куб, длина ребра которого равна 5.

2) Используя инструменты www.geogebra.org постройте призмы основания которых - разные многоугольники.




3. На рисунке изображена правильная шестиугольная призма. Ответьте на вопросы.

- а) Сколько граней, рёбер и вершин у этой призмы?
- б) Зарисуйте название граней призмы.
- в) Какая грань параллельна грани $A'ABB'$?
- г) Какие ребра перпендикулярны основаниям?




4. Грани куба на развёртке обозначены буквами, одна грань закрашена. Какая грань - напротив закрашенной грани?




5. Выполните задания для прямоугольного параллелепипеда на рисунке.

а) Вершины В и Н граней ABC и EHG соединены диагональю. Изобразите все возможные диагонали и запишите, вершины каких граней они соединяют.




б) Покажите две какие-либо перпендикулярные грани и обоснуйте их перпендикулярность, используя различные теоремы и определения.

6. а) Куб разделен на две равные призмы, как показано на рисунке. Изобразите полученные призмы когда они лежат на закрашенной поверхности.




б) Придумайте разные варианты деления куба на две равные части. Изобразите полученные части.


7. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны $3 \times 4 \times 12$. Найдите диагональ основания AC и диагональ параллелепипеда AC'.



8. Две боковые противоположные грани параллелепипеда на рисунке являются квадратами со стороной 4 см. Длина ребра AE 7 см. Найдите длину DF.



9. На рисунке изображен прямоугольный параллелепипед. Даны: $EN = NH$, $AM = MD$; $DC = 6$ см, $FC = 12$ см, $EG = 8$ см. Найдите длину MN.



10. Найдите диагональ параллелепипеда с измерениями.
а) 6; 8; 24 б) 12; 16; 21

11. Острый угол в основании прямого параллелепипеда равен 60° , а каждое ребро равно a . Найдите диагонали параллелепипеда.


12. Найдите диагонали прямого параллелепипеда, если боковое ребро равно 5 см, а в основании лежит параллелограмм со сторонами 6 см и 8 см и диагональю 12 см.

Куб конструкции

При помощи кубов можно получать различные конструкции. Виды конструкции с различных сторон (план) или наоборот, сборка конструкции по плану имеет большое практическое значение.

Практическая работа. Ниже представлены вид сверху, вид сбоку и вид спереди конструкции. Составьте конструкции из кубов и изобразите их на изометрической бумаге.

Вид сверху



Вид сверху помогает построить основание фигуры

Вид сбоку




Вид сбоку помогает достроить фигуру до конца

Вид спереди




Вид спереди помогает проверить, правильно ли выполнено построение




Основание прямоугольника с размерами 2x3 единицы (в кубах)

1-ый и 2-ой ряд высотой в 1 куб.




3-ий ряд высотой в 2 куба

Ширина конструкции 2 единицы




Высота конструкции 2 куба

Для изображения трёхмерных фигур удобно использовать изометрическую бумагу. Например, рёбра куба равные единице, равны единице расстояния между точками. Получить изображение куба можно, отметив вершины и соединив их. Аналогичным образом строятся все кубы, из которых состоит кубоид.




1. Постройте конструкцию из кубов по заданным различным видам и изобразите конструкцию на изометрической бумаге.


а)




б)



2. Какой из видов: сверху, сбоку или спереди на рисунке позволяет установить, одинакова ли высота конструкции? Изобразите и покажите.




3. Изобразите каждую конструкцию на изометрической бумаге, а также на-чертите вид сверху,спереди и сбоку.



4. Изобразите вид многогранников сверху, снизу и сбоку.

Образец.



спереди




Виды



сверху



сбоку




5. Определите какая развёртка какому правильному многограннику относится.


Правильный тетраэдр




A.



Куб



B.




Октаэдр




C.



Додекаэдр




D.



Икосаэдр





E.



Площадь боковой поверхности призмы

Исследование 1. Изобразим развёртку прямоугольного параллелепипеда с измерениями a, b, c .



Поверхность параллелепипеда состоит из 6 попарно конгруэнтных прямоугольников и, чтобы вычислить площадь полной поверхности, надо вычислить площади его граней.



Грани

Площади

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Правая и левая: | $bc + bc = 2bc$ |
| 2. Нижняя и верхняя: | $ab + ab = 2ab$ |
| 3. Передняя и задняя: | $ac + ac = 2ac$ |
| Сумма площадей всех граней: $S = 2ab + 2bc + 2ac$ | |

Площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда с длиной a , шириной b и высотой c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$.

Исследование 2. Вычислите площадь боковой и полной поверхности прямой треугольной призмы с высотой h сторонами основания a, b, c .



Начертим развёртку призмы.


Боковая поверхность призмы состоит из трёх прямоугольников. Сумма площадей этих прямоугольников составляет площадь боковой поверхности.

Площадь боковой поверхности:

$$ah + bh + ch = (a + b + c)h = Ph, \text{ где } P - \text{ периметр основания.}$$

Чтобы найти площадь полной поверхности, надо найти площади оснований. В нашем случае основание треугольное. Значит, для данной призмы площадь полной поверхности равна сумме площадей двух треугольников и площади боковой поверхности. Здесь площадь треугольника может быть вычислена по формуле Герона.

Исследование 3. Основаниями наклонной призмы являются два прямоугольника со сторонами 10×20 . Две боковые грани (левая и правая) являются конгруэнтными прямоугольниками с длинами 10 и 18, две оставшиеся грани (передняя и задняя) являются параллелограммами со сторонами 20 и 18 и острым углом 30° . Найдите площадь полной поверхности.



Для того, чтобы найти площади передней и задней поверхностей призмы, являющимися параллелограммами, найдём высоту.

$$\sin 30^\circ = \frac{h}{18} \quad h = 9$$

Сумма площадей передней и задней граней: $2 \cdot 20 \cdot 9 = 360$ (кв.ед.)

Сумма площадей правой и левой граней: $2 \cdot 10 \cdot 18 = 360$ (кв.ед.)

Сумма площадей основания: $2 \cdot 20 \cdot 10 = 400$ (кв.ед.)


Площадь полной поверхности: $360 + 360 + 400 = 1120$ (кв.ед.)

Площадь боковой поверхности прямой призмы

Площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению периметра основания многоугольника на высоту (боковое ребро).

$$S_{\text{бок}} = Ph$$

Здесь P показывает периметр основания, а h высоту призмы.



Площадь полной поверхности призмы

Площадь полной поверхности призмы равна сумме площадей основания и боковой поверхности.

$$S_{\text{п.п.}} = 2S_{\text{осн.}} + S_{\text{бок.}}$$

Площадь полной поверхности прямой призмы вычисляется по формуле: $S = 2S_{\text{осн.}} + Ph$

Пример. Вычислим площадь полной поверхности прямой призмы.


а) Найдём площадь полной поверхности прямой призмы, в основании которой лежит прямоугольный треугольник.

$$S_{\text{п.п.}} = 2S_{\text{осн.}} + S_{\text{бок.}} = 2S_{\text{осн.}} + Ph$$

$$2S_{\text{осн.}} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 48 \text{ (см}^2\text{)}$$

$$S_{\text{бок.}} = Ph = (10 + 8 + 6) \cdot 15 = 360 \text{ (см}^2\text{)}$$

$$S_{\text{п.п.}} = 48 + 360 = 408 \text{ (см}^2\text{)}$$




- б) Найдём площадь полной поверхности прямой призмы, в основании которой лежит трапеция.

$$S_{п.п.} = 2S_{осн.} + S_{бок.} = 2S_{осн.} + Ph$$

$$2S_{осн.} = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} (10 + 4) \cdot 4 \right) = 56 \text{ (см}^2\text{)}$$




$$S_{бок.} = Ph = (10 + 5 + 5 + 4) \cdot 15 = 360 \text{ (см}^2\text{)}$$

$$S_{п.п.} = 56 + 360 = 416 \text{ (см}^2\text{)}$$









Обучающие задания

1. Найдите площадь боковой и полной поверхности правильных призм.




2. Начертите правильные призмы и их развёртки в тетрадь. Запишите соответствующие измерения на развёртке. Вычислите площадь полной поверхности.




3. Найдите площадь полной поверхности призм на рисунке.


а) правильная пяти-
угольная






б) правильная ше-
стиугольная



в) правильная вось-
миугольная



4. Начертите прямые призмы и их развёртки и найдите площадь полной поверхности.



5. По следующим данным изобразите прямую призму и найдите площадь полной поверхности.

Основание призмы



Высота призмы

а) равносторонний треугольник со стороной 8 единиц	10 единиц.
б) треугольник со сторонами 13; 14; 15 единиц	12 единиц
в) равнобедренный треугольник со сторонами 12; 10; 10 единиц	7 единиц
г) равнобокая трапеция со сторонами 10; 5; 4; 5	20 единиц
д) ромб с диагоналями 8 и 6 единиц	10 единиц
е) правильный шестиугольник со стороной 8 единиц	11 единиц

6. Рёбра прямоугольного параллелепипеда относятся как 3 : 7 : 8, а полная поверхность равна 808 см^2 . Найдите длины рёбер.


7. Угол между сторонами основания прямого параллелепипеда, составляет 30° . Зная, что боковое ребро равно 5 см, а стороны основания 6 см и 8 см, найдите площадь полной поверхности параллелепипеда.

8. Найдите площадь полной поверхности правильной четырёхугольной призмы с диагональю 14 см, если диагональ боковой грани равна 10 см.




9. Для прямой призмы на рисунке найдите:

- а) площади оснований;
- б) площадь боковой поверхности;
- в) площадь полной поверхности.






10. От деревянного бруса в форме параллелепипеда отрезали кусок, как показано на рисунке.


- а) Найдите площадь полной поверхности отрезанной части?
- б) Найдите площадь полной поверхности оставшейся части?
- в) Сколько понадобится краски, чтобы покрасить поверхность части бруса, если для покраски 1 м^2 поверхности нужно 200 мл краски?



11. Найдите площадь полной поверхности фигуры, полученной из прямоугольного параллелепипеда.




12. а) Хикмат хочет сделать поилку для лошадей, в форме прямой призмы в основании которой лежит трапеция. Какое наименьшее количество материала потребуется для этого?




б) В основании прямой призмы высотой 6 м лежит равнобокая трапеция. Основания трапеции равны 2 м и 8 м, а боковая сторона 5 м. Найдите площадь полной поверхности призмы. Изобразите соответствующую призму и запишите соответствующие данные.


13. Какое наименьшее количество материала (в метрах) потребуется для палатки?




14. Стены и крыша зимнего сада должны быть покрыты прозрачными пластиковыми пластинами, как показано на рисунке. Площадь двери $1,8 \text{ м}^2$. Найдите сколько квадратных метров пластика понадобится для того, чтобы застеклить зимний сад.



15. Чтобы покрасить площадь 30 м^2 потребуется приблизительно $4,5 \text{ л}$ краски.
 а) Сколько литров краски потребуется для того, чтобы два раза покрасить стены гаража на рисунке.
 б) Сколько литров краски потребуется, чтобы дважды покрасить крышу гаража на рисунке? Обратите внимание, что крыша гаража открыта спереди.



16. Основание наклонной призмы – прямоугольник со сторонами 20 см и 18 см . Две боковые грани призмы – параллелограммы, а две – квадраты. Если высота призмы 16 см , найдите площадь полной поверхности.



17. Основание наклонной призмы - прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см . Две грани являются прямоугольниками со сторонами 6 см и 8 см , а две другие грани параллелограммами со сторонами 4 см и 8 см и острым углом 30° . Найдите площадь полной поверхности наклонной призмы, вычислив площадь каждой грани в отдельности.


18. Расстояния между боковыми ребрами наклонной треугольной призмы равны 4 см , 6 см и 8 см , а боковые ребра призмы - 5 см . Найдите площадь боковой поверхности призмы.

Сечение плоскостью призмы

Сечение призмы с плоскостью есть пересечение призмы с данной плоскостью. При сечении призм плоскостью в результате на ней остаётся след, определяющий форму сечения. Для построения сечения призмы достаточно построить отрезки пересечения секущей плоскости с гранями призмы. На рисунке изображены сечения плоскостью прямоугольного параллелепипеда.


Сечение плоскостью, параллельной основаниям.

Сечение - прямоугольник




Сечение плоскостью, перпендикулярной основаниям.

Сечение - прямоугольник




Сечение плоскостью под определённым углом к плоскости основания через противоположные грани.

Сечение - параллелограмм




Сечение плоскостью под определённым углом к плоскости основания через рёбра из одной вершины.

Сечение - треугольник



Будьте внимательны! Сечение плоскостью не означает отсечённую часть. Сечение - это след, который остаётся при сечении на плоскости.

Плоскость, перпендикулярная боковым рёбрам призмы, называется **перпендикулярным сечением**. Сечением призмы, параллельной основанию является многоугольник, конгруэнтный основанию.






Сечение, проходящее через боковые рёбра, не принадлежащие одной грани, называется **диагональным сечением призмы**.

Количество диагональных сечений n -угольной призмы равно: $\frac{n(n-3)}{2}$

Так как каждое диагональное сечение призмы является параллелограммом, то количество диагоналей n -угольной призмы равно: $n(n-3)$.


Обучающие задания

1. Установите, какой многоугольник получается при сечении куба плоскостью?




2. Для каждой призмы изобразите сечение плоскостью и определите вид полученного в сечении многоугольника.


- а) Параллельно плоскости основания.




- б) Перпендикулярно плоскости основания.




- в) Под углом к плоскости основания, через рёбра, выходящие из одной вершины.




- г) Под углом к плоскости основания, через заднюю и переднюю грани.



3. 1) Найдите периметр сечения плоскости куба на рисунке, если ребро куба равно 6 см.



- 2) На рисунке показано сечение куба плоскостью, проходящей через концы трёх рёбер, выходящих из одной вершины. Какая фигура получилась в сечении?




- а) Найдите длину отрезка d , если ребро куба равно 1 см.


- б) Если ребро куба равно $3\sqrt{2}$ см, то найдите периметр фигуры, полученной в сечении.

4. Измерения прямоугольного параллелепипеда $9\text{ см} \times 12\text{ см} \times 16\text{ см}$. Найдите периметр и площадь фигуры, являющейся сечением.


а)




б)



в)



г)



5. Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 7 см и 24 см, а высота 8 см. Найдите площадь диагонального сечения.

6. Площадь большего диагонального сечения правильной шестиугольной призмы равна 2 см^2 .

- а) Найдите площадь боковой поверхности.

- б) Сколько диагоналей у этой призмы?


7. Найдите площадь боковой поверхности прямой призмы, в основании которой лежит ромб, если площади диагональных сечений равны 42 см^2 и 56 см^2 .

8. Найдите площадь боковой поверхности прямой призмы с диагоналями 8 см и 5 см и высотой 2 см, в основании которой лежит ромб.

Пирамиды


Пирамидой называется многогранник, который состоит из плоского многоугольника-основания пирамиды, точки, не лежащей в плоскости основания, - вершины пирамиды и всех отрезков, соединяющих вершину пирамиды с точками основания.

Отрезки, соединяющие вершину пирамиды с вершинами основания, называются боковыми ребрами. Поверхность пирамиды состоит из основания и боковых граней. Каждая боковая грань - треугольник.




Перпендикуляр, опущенный из вершины пирамиды на её основание, называется высотой пирамиды.

Правильной называется пирамида, в основании которой лежит правильный многоугольник и основание высоты пирамиды совпадает с центром этого многоугольника.




Высота, проведённая из вершины правильной пирамиды на основание боковой грани (треугольника), называется апофемой.


Пирамида называется по форме многоугольника, лежащего в основании. Например, треугольная пирамида, четырёхугольная пирамида и т.д.



Четырёхугольная пирамида



Пятиугольная пирамида




Треугольная пирамида

Боковые рёбра правильной пирамиды конгруэнтны. Боковые грани правильной пирамиды конгруэнтные равнобедренные треугольники.


Треугольная пирамида ещё называется тетраэдром. *Tetra* в переводе с греческого четыре, т.е. 4 грани (каждая в форме треугольника).

В частном случае четырёхугольную пирамиду можно изобразить следующим образом:

1. Начертите параллелограмм и его диагонали.
2. Из точки пересечения диагоналей восставьте перпендикуляр.
3. Вершину перпендикуляра соедините с вершинами параллелограмма.



Формула площади боковой поверхности пирамиды представляет собой сумму площадей ее боковых граней. Например, на рисунке площадь боковой поверхности правильной шестиугольной пирамиды равна сумме площадей 6 конгруэнтных треугольников, из которых состоит боковая поверхность.



$$S = \frac{1}{2} ah_{ап.} + \frac{1}{2} ah_{ап.} + \frac{1}{2} ah_{ап.} + \frac{1}{2} ah_{ап.} + \frac{1}{2} ah_{ап.} + \frac{1}{2} ah_{ап.} =$$

$$= \frac{1}{2} h_{ап.} (a + a + a + a + a + a) = \frac{1}{2} Ph_{ап.}; \quad S = \frac{1}{2} Ph_{ап.}$$

Площадь боковой поверхности правильной пирамиды


Площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна полупроизведению периметра многоугольника, лежащего в основании, и апофемы.

$$S_{бок} = \frac{1}{2} Ph_{ап.}$$

Здесь P периметр основания,
 $h_{ап.}$ - апофема пирамиды.

Площадь полной поверхности пирамиды равна сумме площадей основания и боковой поверхности.

$$S_{п.п.} = S_{бок.} + S_{осн.}$$



Пример 1. Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 6 см. Найдём площадь полной поверхности, если апофема равна 9 см.

Решение:

Дано: $a = 6$ см, $h_{ап.} = 9$ см

Найдите: $S_{п.п.} = ?$

$$S_{бок.} = \frac{1}{2} Ph_{ап.} = \frac{1}{2} \cdot 6a h_{ап.} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot 9 = 162 \text{ (см}^2\text{)}$$

Чтобы найти площадь основания, сначала надо найти апофему основания (r). $S_{осн.} = \frac{1}{2} Pr$



Центральный угол правильного шестиугольника:

$$360^\circ : 6 = 60^\circ$$


Тогда $\angle AOK = 30^\circ$.

$$r = 3 \tan 60^\circ = 3\sqrt{3}; \quad S_{от} = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 3\sqrt{3} \approx 93,5 \text{ (см}^2\text{)}$$

$$S_{п.п.} = S_{бок.} + S_{осн.} \approx 162 + 93,5 \approx 255,5 \text{ (см}^2\text{)}$$



Пример 2. Боковые рёбра правильной треугольной пирамиды равны 10 см, а высота 6 см. Найдём площадь полной поверхности.



Решение:

Дано: AD = 10 см, DO = 6 см

Найдите: S_{п.п.} = ?

Чтобы найти боковую поверхность пирамиды, надо найти периметр основания и апофему. Для этого достаточно найти одну сторону правильного треугольника.

$$\text{Из } \triangle ADO \text{ } AO = \sqrt{AD^2 - DO^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{64} = 8 \text{ (см)}$$

Известно, что $AO = \frac{2}{3} AE$ (объясните); т.к. $\frac{2}{3} AE$ составляет 8 (см),

то AE = 12 см. Так как углы $\triangle AEB$ равны $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ (объясните).

$$BE = \frac{AE}{\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}; \quad BC = 2 \cdot BE = 8\sqrt{3}; \quad P = 3 \cdot BC = 24\sqrt{3}$$


Найдём апофему из $\triangle DOE$. OE = 12 – 8 = 4 (см)

$$DE = \sqrt{OD^2 + OE^2} = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

$$S_{\text{бок.}} = \frac{1}{2} Ph_{\text{ап.}} = \frac{1}{2} \cdot 24\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{13} = 24\sqrt{39} \text{ (см}^2\text{)}$$




$$S_{\text{осн.}} = \frac{1}{2} BC \cdot AE = \frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{3} \cdot 12 = 48\sqrt{3} \text{ (см}^2\text{)}$$

$$S_{\text{п.п.}} = S_{\text{бок.}} + S_{\text{осн.}} = 24\sqrt{39} + 48\sqrt{3} \approx 150 + 83 = 233 \text{ (см}^2\text{)}$$






Обучающие задания

1. Основание пирамиды - прямоугольник со сторонами 6 см и 8 см. Боковые рёбра пирамиды равны 13 см. Найдите высоту пирамиды.
2. Высота правильной четырёхугольной пирамиды 7 см, сторона основания 8 см. Найдите боковое ребро пирамиды.
3. Найдите площадь боковой поверхности правильных пирамид на рисунке.




4. Найдите площадь боковой поверхности правильных пирамид на рисунке.









5. Найдите неизвестные размеры правильной четырёхугольной пирамиды по данным таблицы.

Высота	6	12	24	?	?	6
Апофема	10	15	?	13	5	?
Стороны основания	?	?	14	?	8	?
Боковая поверхность	?	?	?	624	?	320




6. Изобразите правильную пирамиду и найдите площадь боковой поверхности.
- Правильная четырёхугольная пирамида, со стороной основания 6 ед. и боковым ребром 5 ед.
 - Правильная треугольная пирамида, со стороной основания 4 ед. и апофемой 6 ед.
 - Правильная шестиугольная пирамида, со стороной основания 10 ед. и боковым ребром 13 ед.

7. Найдите площадь боковой поверхности правильных пирамид на рисунке.




8. Найдите следующие данные для правильной четырёхугольной пирамиды:

- а) OM б) $h_{ап.}$ в) NC
 г) $S_{\Delta NBC}$ д) $S_{бок.}$ е) $S_{п.п.}$




9. Найдите следующие данные для правильного тетраэдра:

- а) OM б) $h_{ап.}$ в) NC
 г) $S_{\Delta NBC}$ д) $S_{бок.}$ е) $S_{п.п.}$



10. Основания пирамиды - прямоугольник со сторонами 10 ед. и 18 ед. Точка O является центром прямоугольника. Высота пирамиды FO = 12 ед. а) Найдите FH и FE; б) Найдите площадь боковой поверхности и пирамиды. Можно ли применить формулу

$$S_{бок.} = \frac{1}{2} Ph_{ап.}?$$



11. Основания пирамиды - прямоугольник со сторонами 9 см и 5 см. Одно из боковых ребер пирамиды перпендикулярно плоскости основания и равно 12 см. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.
12. Крыша дома имеет форму четырёхугольной пирамиды. Основанием является прямоугольник со сторонами 12 м и 10 м. Каждое боковое ребро равно 10 м. Сколько квадратных метров материала было потрачено на покрытие крыши?
13. В архитектуре городов мира важное место занимают постройки, имеющие форму пирамид. Среди них есть как античные памятники (Египетские пирамиды), так и новые, придающие городам современный вид (Музей Лувра в Париже, вход на станцию метро Ичери Шехер в Баку). а) Пирамида Хеопса и пирамида в Лувре являются правильными четырёхугольными пирамидами. Найдите площадь боковой поверхности каждой пирамиды.

Пирамида Хеопса. Египет
Сторона основания 230 м,
апофема 186 м




Пирамида в Лувре. Париж
Сторона основания 35 м,
апофема 28 м



- б) На рисунке представлен план пирамиды на входе в станцию метро Ичери Шехер. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды по данным на плане.




**Пирамида на станции метро
Ичери Шехер**



14. Найдите площадь боковой поверхности треугольной пирамиды, боковые рёбра которой попарно перпендикулярны и равны 4 см, 6 см и 8 см.
15. а) Обоснуйте утверждение: "Апофема пирамиды не меньше её высоты."
 б) Найдите высоту и апофему правильной четырёхугольной пирамиды со стороной основания 10 см и боковым ребром 13 см.
 в) Основанием пирамиды является ромб с диагоналями 12 см и 16 см. Найдите площадь полной поверхности пирамиды, если боковые грани образуют с плоскостью основания угол 60° .
16. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, в основании которой лежит равнобедренный треугольник со сторонами 6 см, 6 см и 8 см, а длина каждого бокового ребра равна 5 см.


17. Площадь одной боковой грани правильной шестиугольной пирамиды $8\sqrt{3}$ ед., а площадь основания $24\sqrt{3}$ кв.ед. Найдите:

- а) длину стороны основания;
 б) апофему
 в) длину бокового ребра;
 г) высоту.



18. Исследование при помощи правильной четырёхугольной пирамиды.

- а) На изометрической бумаге изобразите правильную четырёхугольную пирамиду со стороной основания 3 ед., как показано на рисунке.
 б) Составьте таблицу для значений боковой поверхности пирамиды, если апофема равна 1) 3; 2) 9.
 в) Запишите, как изменится боковая поверхность, если не изменяя длин сторон основания, длину апофемы увеличить в 3 раза.



- г) Как изменится площадь боковой поверхности пирамиды, если и сторону основания и апофему увеличить в 3 раза?


19. Боковые рёбра правильной четырёхугольной пирамиды наклонены к плоскости основания под углом 45° . Вычислите площадь боковой и полной поверхности пирамиды, если сторона основания равна 6 см.
20. В основании пирамиды - равнобедренный треугольник со сторонами 10 см, 10 см и 12 см. Все двугранные углы при основании равны 60° . Найдите высоту и апофему пирамиды.

Сечения пирамиды

При сечении правильной четырёхугольной пирамиды плоскостью получаются различные многоугольники.


Сечение плоскостью, параллельное основанию.

Сечение - квадрат




Сечение плоскостью из вершины пирамиды, перпендикулярно основанию.

Сечение - равнобедренный треугольник




Сечение плоскостью через смежные грани, с общей вершиной, под углом к плоскости основания.

Сечение - треугольник





Сечение плоскостью через противоположные грани, под углом к плоскости основания.

Сечение - трапеция




1. Опишите сечение пирамиды плоскостью.



2. а) Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды равна 14 см. Длина каждого бокового ребра равна 10 см. Найдите площадь диагонального сечения (проходящего через вершину пирамиды и диагональ основания).


б) Высота правильной четырёхугольной пирамиды равна 12 ед., а сторона основания равна 8 ед. Найдите площадь сечения плоскостью проходящее через апофем противоположных граней.



3. Докажите справедливость следующих высказываний. Если плоскость сечения параллельна основанию, то:

- 1) плоскость делит боковые рёбра и высоту на пропорциональные части;
- 2) многоугольник - сечение подобно основанию;
- 3) площади сечения и основания относятся как квадраты расстояний, начиная от вершины.

План для доказательства. Используйте подобие треугольников ABT и $A'B'T'$.




4. Высота пирамиды разделена на 4 равные части, через которые параллельно плоскости основания проведены плоскости. Зная, что площадь основания равна 400 м^2 , найдите площади полученных сечений.
5. Площадь основания пирамиды 512 см^2 , а высота 16 см. Найдите расстояние от плоскости сечения, параллельного основанию до плоскости основания, если площадь сечения равна 50 см^2 .

Усечённая пирамида

Плоскость, параллельная плоскости основания пирамиды и пересекающая её боковые ребра, отсекает от нее подобную пирамиду. Другая часть представляет собой многогранник, который называется **усечённой пирамидой**.



Параллельные грани усечённой пирамиды называются её основаниями, остальные грани - боковой поверхностью. Отрезок перпендикуляра между плоскостями основания называется высотой усечённой пирамиды. Если пирамида правильная, то сечение плоскостью также является правильным многоугольником, и усечённая пирамида также является правильной. Боковые грани правильной усечённой пирамиды конгруэнтные равнобокие трапеции. Высота этой трапеции является апофемой правильной усечённой пирамиды.



Площадь боковой поверхности правильной усечённой пирамиды вычисляется по формуле: $S_{бок.} = \frac{1}{2} (P_1 + P_2) \cdot h_{ап.}$, здесь P_1 и P_2 периметры оснований правильной усечённой пирамиды, $h_{ап.}$ - апофема. Площадь полной поверхности усечённой пирамиды находится как, сумма площадей верхнего и нижнего оснований и боковой поверхности:

$$S_{п.п.} = S_{бок.} + S_{вер.осн.} + S_{ниж.осн.}$$


Плоскость, проходящая через два боковых ребра, не принадлежащих одной грани усечённой пирамиды, называется диагональным сечением.




Этапы построения усечённой пирамиды.




1) Постройте многоугольник основания.



2) Из центра многоугольника постройте перпендикуляр определённой длины и соедините вершины многоугольника с вершиной перпендикуляра.



3) На любом ребре пирамиды выберите точку, постройте отрезки, параллельные сторонам основания, и начертите другое основание. Сотрите боковые рёбра от вершины до меньшего основания.





6. а) Изобразите правильную четырёхугольную усечённую пирамиду с высотой 6 см и сторонами основания соответственно 4 см и 6 см.


б) Изобразите правильную шестиугольную усечённую пирамиду с высотой 8 см и сторонами основания соответственно 2 см и 3 см.

в) Найдите площадь диагонального сечения правильной четырёхугольной усечённой пирамиды, площади оснований которой 36 см^2 и 64 см^2 и боковые рёбра составляют с плоскостью нижнего основания угол 45° .

7. По рисунку докажите справедливость формулы, для площади боковой поверхности правильной усечённой пирамиды $S_{\text{бок.}} = \frac{1}{2} (P_1 + P_2) \cdot h_a$.




8. Найдите площадь боковой и полной поверхностей правильной усечённой четырёхугольной пирамиды.



9. Плоскость, параллельная основанию правильной четырёхугольной пирамиды, проведена через середину высоты. Высота пирамиды 8 см, сторона основания 12 см. Определите размеры полученной усечённой пирамиды, изобразите её и найдите площадь полной поверхности.

10. Сторона основания правильной четырёхугольной пирамиды АВ равна 12 см, высота SO равна 8 см. На расстоянии 2 см параллельно основанию проведена плоскость. Найдите площадь полной поверхности полученной усечённой пирамиды.



11. Высота правильной четырёхугольной усечённой пирамиды равна 28 см, а апофема 35 см. Стороны оснований относятся как 5:2. Найдите площадь полной поверхности усечённой пирамиды.


12. Для хранения драгоценностей используется конструкция в виде пирамиды из стеклянных поверхностей, закреплённых металлическими профилями. Правильная четырёхугольная пирамида, сторона основания которой равна 30 см, а высота 36 см, разделена на части параллельными плоскостями (начиная от вершины через каждые 12 см).



а) Какое наименьшее количество стекла (в кв. см) потребуется для изготовления конструкции.

б) Какое наименьшее количество металлических профилей (в см) потребуется для изготовления конструкции?

1. Изобразите пирамиду или призму, соответственно данным на развёртках. Назовите остальные вершины и найдите площадь полной поверхности фигур.



2. Измерениями правильной четырёхугольной пирамиды являются: длины стороны основания, апофемы и высоты, а также площади боковой и полной поверхностей. По следующим данным, найдите остальные измерения пирамиды:

а) $a = 3$ см, $S_{\text{бок.}} = 15$ см²

б) $h = 12$ м, $a = 10$ м


в) $h_{\text{ап.}} = 5$ м, $S_{\text{бок.}} = 60$ м²

г) $S_{\text{бок.}} = 80$ см², $S_{\text{п.п.}} = 144$ см²


3. Футбольный мяч представляет собой многогранник с 32 гранями, 20 из которых – белые правильные шестиугольники, а 12 – черные правильные пятиугольники. Сколько вершин у такого многогранника?




4. Найдите площади поверхностей фигур, составленных из правильных призм и пирамид.



5. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, образованной плоскостью, проходящей через вершины A' , B , C' куба с ребром 6 см.



6. Изобразите развёртки прямых призм и правильных пирамид. Найдите площадь полной поверхности.



7. Определите число вершин многогранников по формуле Эйлера.


а) Имеет 14 граней. 6 из них квадраты, а 8 - шестиугольники.

б) Имеет 8 граней. 4 из них - треугольники, а 4 - шестиугольники.

в) Имеет 32 граней. 12 из них - восьмиугольники, а 20 - треугольники




8. Дан куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ с ребром равным a . Найдите площадь сечения куба плоскостью, проходящей через диагональ основания BD и середины ребер $B_1 C_1$ и $C_1 D_1$ (точки M и N).



9. 1) Укажите что, площадь боковой поверхности наклонной призмы равна произведению периметра перпендикулярного сечения на длину бокового ребра:


$$S_{\text{бок.}} = P_{\perp \text{сеч.}} \cdot l.$$

Указание: Обратите внимание, что боковые грани наклонной призмы являются параллелограммами, а стороны фигуры, полученной в перпендикулярном сечении, являются высотой соответствующего параллелограмма.




2) Перпендикулярным сечением наклонной призмы является треугольник со сторонами 2 см, 3 см, 4 см. Если площадь боковой поверхности призмы 45 см^2 , найдите длину бокового ребра.

10. Площадь основания правильной четырехугольной пирамиды - 150 см^2 , площадь параллельного сечения - 54 см^2 . Расстояние между сечением и основанием равно 14 см. Найдите высоту пирамиды.





11. Изобразите виды конструкции.



7


Тригонометрические уравнения

Обратные тригонометрические функции
Простейшие тригонометрические уравнения
Методы решения тригонометрических уравнений
Применение тригонометрических уравнений для
решения задач




Обратные тригонометрические функции

Прямая $y = a$ ($|a| < 1$), параллельная оси абсцисс, пересекает синусоиду $y = \sin x$ в бесконечном числе точек. Это означает, что функция $y = \sin x$ не имеет обратной на всей числовой оси.



Однако на отрезке $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ функция $y = \sin x$ возрастает и от -1 до 1 принимает все значения, а также каждому значению аргумента соответствует единственное значение. Значит, на отрезке $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ функция $\sin x$ обратима и при $|a| \leq 1$ уравнение $\sin x = a$ на отрезке $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ имеет единственный корень.

Угол, из промежутка $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ синус которого равен a , называется арксинусом числа a и записывается как $\arcsin a$.



Равенство $x = \arcsin a$ эквивалентно двум условиям: 1) $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 2) $\sin x = a$


Примеры: $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, так как $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ и $\frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$
 $\arcsin(-\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{6}$, так как $\sin(-\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$ и $-\frac{\pi}{6} \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

Из определения имеем: $\sin(\arcsin a) = a$.

Можно показать, что $\arcsin(-a) = -\arcsin a$

Аналогично получаем, что на всей числовой оси не существует функции, обратной для $y = \cos x$. Однако на отрезке $[0; \pi]$ функция $y = \cos x$ убывает и принимает все значения из отрезка $[-1; 1]$. То есть, на отрезке $[0; \pi]$ функция $y = \cos x$ обратима и при $|a| \leq 1$ уравнение $\cos x = a$ имеет единственный корень на $[0; \pi]$.

Угол, из промежутка $[0; \pi]$ косинус которого равен a , называется арккосинусом числа a и записывается как $\arccos a$.



Равенство $x = \arccos a$ эквивалентно двум условиям: 1) $0 \leq x \leq \pi$ 2) $\cos x = a$


Примеры: $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, так как $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ и $\frac{\pi}{3} \in [0; \pi]$
 $\arccos(-\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$, так как $\cos \frac{2\pi}{3} = \cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ и $\frac{2\pi}{3} \in [0; \pi]$.

Из определения имеем: $\cos(\arccos a) = a$

Можно показать, что $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$.

Функция $y = \tan x$ возрастает на промежутке $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ и на промежутке $(-\infty; +\infty)$ принимает все значения. Поэтому для любого числа a уравнение $\tan x = a$ на промежутке $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ имеет один корень.

Угол из промежутка $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, тангенс которого равен a , называется арктангенсом числа a и записывается как $\arctan a$.



Равенство $\arctan a = x$ эквивалентно двум условиям:

$$1) -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad 2) \tan x = a$$

Примеры. $\arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$, так как $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ и $-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$.

$\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$, так как $\tan(-\frac{\pi}{4}) = -1$ и $-\frac{\pi}{2} < -\frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$.


По определению: $\tan(\arctan a) = a$

Можно показать, что $\arctan(-a) = -\arctan a$.

Угол из промежутка $(0; \pi)$, котангенс которого равен a , называется арккотангенсом числа a и записывается как $\operatorname{arccot} a$.

Равенство $\operatorname{arccot} a = x$ эквивалентно двум условиям:

$$1) 0 < x < \pi \quad 2) \cot x = a$$



Nümunələr. $\operatorname{arccot} 1 = \frac{\pi}{4}$, так как $\cot \frac{\pi}{4} = 1$ и $\frac{\pi}{4} \in (0; \pi)$

$\operatorname{arccot}(-1) = \frac{3\pi}{4}$, так как $\cot \frac{3\pi}{4} = \cot(\pi - \frac{\pi}{4}) = -\cot \frac{\pi}{4} = -1$ и $\frac{3\pi}{4} \in (0; \pi)$.

По определению: $\cot(\operatorname{arccot} a) = a$

Можно показать, что $\operatorname{arccot}(-a) = \pi - \operatorname{arccot} a$.

На калькуляторе не предусмотрены кнопки $\cot^{-1}x$, $\sec^{-1}x$, $\csc^{-1}x$, так как эти функции можно выразить через функции $\tan^{-1}x$, $\cos^{-1}x$, $\sin^{-1}x$. Например,

$y = \sec^{-1}x$ означает, $\sec y = x$ и эту функцию можно выразить через косинус

$$\frac{1}{\cos y} = x \quad \cos y = \frac{1}{x} \quad \text{Отсюда:} \quad y = \cos^{-1} \frac{1}{x}$$

Значит, для вычисления $y = \sec^{-1}x$ надо вычислить $y = \cos^{-1} \frac{1}{x}$.

Внимание! $\sin^{-1}x$ ~~не означает~~ $\frac{1}{\sin x}$

Обучающие задания

1. Найдите угол, который удовлетворяет равенству и принадлежит промежутку.

а) $\sin t = \frac{\sqrt{2}}{2}, [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

б) $\sin t = -\frac{\sqrt{3}}{2}, [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

в) $\cos t = \frac{\sqrt{3}}{2}, [0; \pi]$

г) $\cos t = -\frac{\sqrt{2}}{2}, [0; \pi]$

д) $\tan t = \frac{\sqrt{3}}{3}, (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$

е) $\cot t = -1, (0; \pi)$

2. Значение выражения выразите в радианах и градусах.

$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\arctan \sqrt{3}$

$\operatorname{arccot} \frac{\sqrt{3}}{3}$

$\arcsin(-\frac{1}{2})$

$\arccos(-\frac{\sqrt{3}}{2})$

$\arctan(-1)$

$\operatorname{arccot}(-\sqrt{3})$

3. Вычислите значение выражения при помощи калькулятора. Результат округлите до сотых.

а) $\tan^{-1} 3,9$

б) $\cos^{-1} 0,24$

в) $\sin^{-1} 0,24$

г) $\sin^{-1} 0,75$





д) $\sin^{-1} (-0,4)$

е) $\cos^{-1} (-0,6)$

ж) $\tan^{-1} (-0,2)$

з) $\tan^{-1} 2,25$

4. Найдите угол θ .



5. Найдите значение выражения.

а) $\arcsin 0 + \arcsin 1$

б) $\arccos(-1) - \arccos 0$

в) $\arcsin(-\frac{\sqrt{3}}{2}) + \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$

г) $\arctan(-1) + \operatorname{arccot}(-1)$

6. Проверьте равенство.

а) $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} + \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{2}$

б) $\arctan \sqrt{3} + \operatorname{arccot} \sqrt{3} = \frac{\pi}{2}$

7. Вычислите.

а) $\cos(\arcsin \frac{1}{2})$

б) $\sin(\arccos(-\frac{\sqrt{2}}{2}))$

в) $\tan(2 \cdot \arctan \sqrt{3})$

г) $\cot(2 \cdot \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2})$

д) $\sin(2 \cdot \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2})$

е) $\cos(3 \cdot \arccos \frac{1}{2})$

8. Найдите угол α . При необходимости используйте калькулятор.

а) $\sin \alpha = \frac{1}{2}; 90^\circ < \alpha < 180^\circ$

б) $\tan \alpha = 1; 180^\circ < \alpha < 270^\circ$

в) $\tan \alpha = -\sqrt{3}; 270^\circ < \alpha < 360^\circ$

г) $\cos \alpha = -\frac{1}{2}; 180^\circ < \alpha < 270^\circ$

д) $\cos \alpha = 0,43; 270^\circ < \alpha < 360^\circ$

е) $\sin \alpha = 0,8; 90^\circ < \alpha < 180^\circ$

9. Вычислите значения выражений.

а) $\sin(\arccos \frac{3}{5})$

б) $\cos(\arcsin \frac{5}{13})$

в) $\sin(2 \cdot \arccos \frac{4}{5})$

г) $\cos(2 \cdot \arccos \frac{3}{5})$

д) $\cos(\arcsin \frac{3}{5} - \arccos \frac{12}{13})$

е) $\sin(\arccos \frac{3}{5} + \arcsin \frac{5}{13})$


Пример. Найдите значение выражения $\sin(2 \cdot \arcsin \frac{3}{5})$.

Пусть $\arcsin \frac{3}{5} = \alpha$. Тогда, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ и $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

В прямоугольном треугольнике найдём катет, прилежащий к углу α , если синус острого угла равен $\frac{3}{5}$. $b = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$.

Отсюда, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$. Учитывая обозначение, имеем:


$$\sin(2 \cdot \arcsin \frac{3}{5}) = \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25}$$




10. Игрушечный моторный самолёт может лететь на высоте 4 м.

а) Запишите функцию, выражающую зависимость расстояния между наблюдателем и самолётом от угла подъёма θ .

б) Сколько градусов составит угол θ , если расстояние от самолёта до наблюдателя равно 25 м?



11. Для обеспечения прохода больших судов под мостами их делают разводными. Длина каждого крыла разводного моста через реку 40 м. На какой наименьший угол (в градусах) должны подниматься крылья моста, чтобы судно любой высоты и ширины 20 м могло безопасно пройти под мостом?



12. Вычислите.

а) $\arcsin(\sin \frac{\pi}{6})$

б) $\arccos(\cos \frac{\pi}{6})$

в) $\arctan(\tan \frac{\pi}{3})$

13. Энвер и Лала вычислили значение выражения $\arcsin(\sin \frac{2\pi}{3})$ так:

Энвер: $\arcsin(\sin \frac{2\pi}{3}) = \frac{2\pi}{3}$

Лала: $\arcsin(\sin \frac{2\pi}{3}) = \arcsin(\sin(\pi - \frac{\pi}{3})) = \arcsin(\sin \frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{3}$

Кто из них верно вычислил значение выражения? Ответ обоснуйте.

14. Найдите значение выражений.

а) $\arcsin(\sin \frac{7\pi}{6})$

б) $\arccos(\cos \frac{4\pi}{3})$


в) $\arctan(\tan \frac{2\pi}{3})$

Уравнения вида $\sin x = a$, $\cos x = a$, $\tan x = a$, $\cot x = a$ являются простейшими тригонометрическими уравнениями.

Уравнение $\sin x = a$


Область изменения синуса отрезок $[-1; 1]$. Поэтому при $|a| > 1$ уравнение $\sin x = a$ не имеет решений. Рассмотрим случай $|a| \leq 1$.

В одной системе координат построим графики функций $y = \sin x$ и $y = a$.



Как видно, существует бесконечно много общих точек прямой и синусоиды. Это говорит о том, что при $|a| \leq 1$ уравнение $\sin x = a$ имеет бесконечно много корней. Так как синус является периодической функцией, то достаточно найти корни на промежутке длиной в один период, т.е. на 2π .

По графику видно, что при $|a| < 1$ уравнение $\sin x = a$ на отрезке $[0; 2\pi]$ имеет два корня. К тому же выводу можно прийти и при движении точки по окружности. На целом периоде, для одного и того же значения синуса, можно найти два угла.




Если один из углов поворота равен α , тогда другой будет $\pi - \alpha$. Остальные решения уравнения $\sin x = a$ ($|a| < 1$) можно получить, добавив к ним целое число оборотов. Значит, если α решение уравнения $\sin x = a$, тогда все решения данного уравнения записываются в виде $x = \alpha + 2\pi n$, $x = \pi - \alpha + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$). Эти два семейства решений иногда задаются одной формулой вида $x = (-1)^k \alpha + \pi k$, ($k \in \mathbb{Z}$) и при $k = 2n$ (чётном) получаем решения I семейства, при $k = 2n + 1$ (нечётном) получаем решения II семейства.

При $|a| \leq 1$ уравнение $\sin x = a$ на отрезке $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ имеет корень

$x = \arcsin a$, тогда все корни данного уравнения можно найти по формулам: $x = \arcsin a + 2\pi n$ и $x = \pi - \arcsin a + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$). Эти формулы можно объединить и записать в виде $x = (-1)^k \arcsin a + \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Пример 1. Представьте графическое решение уравнения $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ и запишите общее решение.



Решение. Построим в одной координатной системе

графики функций $y = \sin x$ и $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$

т.к. $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, графическое решение наглядно показывает, что данное уравнение на отрезке $[0; 2\pi]$ имеет два корня: $\frac{\pi}{4}$ и $\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.
Все корни уравнения: $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$).

Общее решение: $x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{4} + \pi k$, ($k \in \mathbb{Z}$).


Пример 2. Сколько корней имеет уравнение $\sin x = \frac{1}{2}$ на отрезке $[0; 3\pi]$?

Решение. Запишем решение уравнения $x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k$, ($k \in \mathbb{Z}$) и найдём корни, при $k = 0; 1; 2; 3$: $x_0 = \frac{\pi}{6}$, $x_1 = \frac{5\pi}{6}$, $x_2 = \frac{13\pi}{6}$, $x_3 = \frac{17\pi}{6}$. При других значениях параметра k корни не принадлежат заданному отрезку.


Пример 3. Решим уравнение $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Решение. т.к. $\arcsin(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -\frac{\pi}{4}$, то $x = (-1)^k \cdot (-\frac{\pi}{4}) + \pi k = (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{4} + \pi k$, ($k \in \mathbb{Z}$)

Ещё проще можно найти решения уравнения $\sin x = a$ при $a = 0$, $a = 1$, $a = -1$.




Это можно увидеть и на единичной окружности.



Точки с ординатой 0 A(0) и C(pi)

$$\sin t = 0$$


$$t = \pi k \quad (k \in \mathbb{Z})$$



Точка с ординатой 1 B(pi/2)

$$\sin t = 1$$

$$t = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z})$$



Точка с ординатой -1 D(-pi/2)

$$\sin t = -1$$

$$t = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Пример 4. Решим уравнение $\sin(x + \frac{\pi}{3}) = 1$

Решение. Выполним следующую замену: $x + \frac{\pi}{3} = t$

Получаем уравнение $\sin t = 1$. Решением будет $t = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Принимая во внимание замену, имеем:

$$x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Отсюда: } x = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Пример 5. Решим уравнение $\sin(x - 30^\circ) = 0$.

Решение. Здесь x угол выражен в градусах. Тогда решения уравнения можно записать так: $x - 30^\circ = 180^\circ \cdot k$, $x = 30^\circ + 180^\circ \cdot k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Обучающие задания

1. Какое значение x является корнем заданного уравнения? Используя периодичность функции запишите ещё два корня: положительный и отрицательный. Выполните проверку.

а) $2 \sin x = 1, x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{5\pi}{6}$ б) $\sqrt{8} \sin x = \sqrt{6}, x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{\pi}{6}$

2. 1) Представьте графическое решение уравнений. 2) Найдите корни в промежутке $[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ 3) Напишите общее решение

а) $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ б) $\sin x = -\frac{1}{2}$ в) $2 \sin x = -\sqrt{3}$ г) $2 \sin x + \sqrt{2} = 0$
 д) $\sin x = 1$ е) $1 + \sin x = 0$ ж) $2 \sin x - 1 = 0$ з) $\sin x = 0$

3. Решите уравнения.

а) $2 \sin(x + \frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$ б) $\sin(2x - \frac{\pi}{4}) = 0$ в) $2 \sin(2x - \frac{\pi}{6}) = 1$

4. Изучите пример, найдите корни уравнений, принадлежащих данному промежутку.

а) $\sin 2x = \frac{1}{2}, 0 \leq x \leq 3\pi$ б) $\sin 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \leq x \leq 3\pi$


Пример. 1) Запишите решения уравнений, принадлежащих промежутку $[0; 3\pi]$.

1) $\sin x = -\frac{1}{2}$ 2) $\sin 2x = -\frac{1}{2}$

Рассмотрим общее решение уравнения вида $\sin \theta = -\frac{1}{2}$.

На единичной окружности существуют две точки с ординатами $-\frac{1}{2}$. Этим точкам соответствуют углы $\frac{7\pi}{6}$ и $\frac{11\pi}{6}$.

Решение уравнения: $\frac{7\pi}{6} + 2\pi k$ и $\frac{11\pi}{6} + 2\pi k (k \in \mathbb{Z})$



а) В случае, если $\theta = x$ и $0 \leq x \leq 3\pi$, данному интервалу удовлетворяют только значения x равные $\frac{7\pi}{6}$ и $\frac{11\pi}{6}$. Ответ: $x = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$

б) В случае, если $\theta = 2x$, если x удовлетворяет условию $0 \leq x \leq 3\pi$, то $0 \leq 2x \leq 6\pi$ и на данном интервале существуют следующие корни:


$$\sin 2x = -\frac{1}{2} \quad 2x = \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}, \frac{23\pi}{6}, \frac{31\pi}{6}, \frac{35\pi}{6}$$

$$x = \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}, \frac{31\pi}{12}, \frac{35\pi}{12}$$

(Note: The diagram shows blue arrows indicating a period of +2π between consecutive 2x values, and red arrows indicating a period of +π between consecutive x values.)

Уравнение $\cos x = a$

Аналогичным образом, при $|a| > 1$ уравнение $\cos x = a$ не имеет корней. При $|a| \leq 1$ уравнение имеет бесконечное множество корней. Как по графику, так и по единичной окружности видно, что на отрезке, длиной в один период (т.е. 2π) уравнение $\cos x = a$ ($|a| < 1$) имеет два корня.




Если α является корнем уравнения $\cos x = a$, тогда $-\alpha$ также является корнем, так как $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$. Таким образом, если известно, что α является одним из корней уравнения $\cos x = a$, то корни этого уравнения можно найти по формулам $x = \alpha + 2\pi n$ и $x = -\alpha + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$). Иногда эти две формулы объединяют и записывают в виде $x = \pm \alpha + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$).

При $|a| \leq 1$ корень уравнения $\cos x = a$ на отрезке $[0; \pi]$ равен $x = \arccos a$.

Тогда все корни можно найти по формуле: $x = \pm \arccos a + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$)

Пример 6. Представьте графическое решение уравнения $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ и запишите общее решение.

Решение: Построим в одной координатной системе графики функций $y = \sin x$ и $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$



т.к. $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, графическое решение наглядно показывает что, данное уравнение на промежутке $[-\pi; \pi]$ имеет два корня: $\frac{\pi}{4}$ и $-\frac{\pi}{4}$

Все корни уравнения: $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$ в $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$).

Общее решение: $x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$)


Пример 7. Решите уравнение $\cos x = -\frac{1}{2}$

Решение: $x = \pm \arccos(-\frac{1}{2}) + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$)




Поскольку $\arccos(-\frac{1}{2}) = \pi - \arccos \frac{1}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$

то $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$)

Ещё проще можно найти решения уравнения $\cos x = a$ при $a = 0, a = 1, a = -1$.



Это можно увидеть по изображению на единичной окружности.



Точки с абсциссами 0 $C(\frac{\pi}{2}), D(\frac{3\pi}{2})$ Точка с абсциссой 1 $A(0)$ Точка с абсциссой -1 $C(\pi)$

$$\cos t = 0$$

$$t = \frac{\pi}{2} + \pi n, (n \in \mathbb{Z})$$

$$\cos t = 1$$

$$t = 2\pi n, (n \in \mathbb{Z})$$

$$\cos t = -1$$

$$t = \pi + 2\pi n, (n \in \mathbb{Z})$$

Пример 8. Решим уравнение $\cos(x + \frac{\pi}{4}) = -1$.

Выполним замену $x + \frac{\pi}{4} = t$: $\cos t = -1$ $t = \pi + 2\pi k (k \in \mathbb{Z})$

Принимая во внимание замену, имеем: $x + \frac{\pi}{4} = \pi + 2\pi k (k \in \mathbb{Z})$

$$x = -\frac{\pi}{4} + \pi + 2\pi k, \quad x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k (k \in \mathbb{Z})$$

Обучающие задания

5. Какое значение x является корнем заданного уравнения? Используя периодичность функции запишите ещё два корня: положительный и отрицательный. Выполните проверку.

а) $\cos x + 1 = 0, x = \frac{\pi}{2}, x = \pi$ б) $\sqrt{8} \cos x = 2, x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{\pi}{6}$

6. 1) Представьте графическое решение уравнений.

2) Найдите корни в промежутке $[-\pi; \pi]$.

3) Напишите общее решение.

а) $\cos x = \frac{1}{2}$ б) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ в) $2 \cos x = \sqrt{2}$ г) $2 \cos x = \sqrt{3}$

д) $2 \cos x - \sqrt{3} = 0$ е) $2 \cos x + 1 = 0$ ж) $\cos x - 1 = 0$ з) $\cos 2x = 0$

7. Запишите корни уравнений, принадлежащих промежутку $[0; 3\pi]$.

а) $\cos x = \frac{1}{2}$ б) $\cos 2x = \frac{1}{2}$ в) $\cos(x - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$

Уравнения $\tan x = a$ и $\cot x = a$

На промежутке $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ решением уравнения $\tan x = a$ является $x = \arctan a$.


Так как основной период функции $\tan x$ равен π то, все решения уравнения

$\tan x = a$ можно задать формулой:

$$x = \arctan a + \pi n, (n \in \mathbb{Z}).$$

То, что решение верно показано на

рисунке при помощи точек пересечения графиков функций $y = \tan x$ и $y = a$.



Аналогично можно показать, что все решения уравнения $\cot x = a$ имеют вид $x = \operatorname{arccot} a + \pi n (n \in \mathbb{Z})$.

Пример 9. Решим уравнение $\tan(x - \frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}$.

Решение: Выполним замену $x - \frac{\pi}{6} = t$

Получим уравнение $\tan t = \sqrt{3}$.

Решение этого уравнения будет $t = \frac{\pi}{3} + \pi n (n \in \mathbb{Z})$.

Принимая во внимание замену получим:

$$x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} + \pi n (n \in \mathbb{Z})$$

$$x = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} + \pi n \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi n (n \in \mathbb{Z})$$

Пример 10. Решим уравнение $\cot 3x = -1$.

Решение: Выполним замену $3x = t$, получим: $\cot t = -1$

Так как $\operatorname{arccot}(-1) = \frac{3\pi}{4}$, то $t = \frac{3\pi}{4} + \pi n$.

Из замены следует, что $3x = \frac{3\pi}{4} + \pi n$. Разделив обе части на 3 получим все решения уравнения $\cot 3x = -1$ в виде $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{3}, (n \in \mathbb{Z})$.

Пример 11. Решим уравнение $\tan x = 0,75$.

Для решения уравнения такого типа используйте калькулятор.

Если после нажатия кнопки \tan^{-1} ввести число 0,75, то при нажатой кнопке

Degree получим значение $36,87^\circ$. Так как тангенс является периодической функцией, то значения $36,87^\circ + 180^\circ, 36,87^\circ - 180^\circ, 36,87^\circ + 360^\circ,$

$36,87^\circ - 360^\circ, 36,87^\circ + 540^\circ, 36,87^\circ - 540^\circ$ также соответствуют значениям тангенса равным 0,75. Таким образом, решение уравнения в общем виде записывается так: $x \approx 36,87^\circ + 180^\circ k, (k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$.

Решение уравнения при помощи кнопки **Radian** будет иметь вид:

$$x \approx 0,6435 + \pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Решения уравнений вида $\cot x = a$, $\sec x = a$, $\csc x = a$ можно получить при помощи равенств:

$$\cot x = \frac{1}{\tan x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Пример 12. Найдите корни уравнения $\csc x + 1 = 0$, принадлежащие промежутку $[0; 2\pi]$.

Решение. $\csc x = -1$

$$\frac{1}{\sin x} = -1 \quad \text{Общее решение уравнения } \sin x = -1 \text{ есть } x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

$$x = \frac{3\pi}{2} \text{ - корень данного уравнения на промежутке } [0; 2\pi].$$

8. Какое значение x является корнем заданного уравнения? Используя периодичность функции запишите ещё два корня: положительный и отрицательный. Выполните проверку.

а) $\tan x - \sqrt{3} = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$, $x = \frac{\pi}{3}$ б) $\sqrt{6} \cot x = \sqrt{2}$, $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \frac{\pi}{6}$

9. 1) Найдите корни уравнения, принадлежащие промежутку $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$
2) Запишите общее решение.

а) $\tan x = \sqrt{3}$ б) $\tan x = -1$ в) $\tan x = 1$ г) $\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

10. 1) Найдите корни уравнения, принадлежащие промежутку $(0; \pi)$;
2) Запишите общее решение.

а) $\cot x = \sqrt{3}$ б) $\cot x = -1$ в) $\cot x = -\sqrt{3}$ г) $\cot x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

11. Решите уравнение $\tan x = \sqrt{3}$. Используя полученные результаты, запишите общие решения следующих уравнений.

а) $\tan(x - \frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}$ б) $\tan 4x = \sqrt{3}$ в) $\cot 2x = \frac{\sqrt{3}}{3}$

12. Решите уравнения.

- 1) Найдите корни, расположенные на промежутке $[0; 2\pi]$.
- 2) Запишите общее решение.
- 3) Изобразите графическое решение уравнения.

а) $2\sin x - \sqrt{3} = 0$	б) $2\cos x = 1$	в) $\tan x + 1 = 0$
г) $2\cos x - \sqrt{3} = 0$	д) $\sin x = 0$	е) $\tan x + \sqrt{3} = 0$

13. При помощи калькулятора решите уравнения и найдите три его корня.

а) $\tan \theta = 3$ б) $\sin \theta = 0,85$ в) $\cos \theta = 0,47$

14. Найдите корни уравнения, принадлежащие промежутку $0 \leq x \leq 4\pi$, по образцу.


а) $2 \tan x = -2$

б) $2 \sin x = -1$

в) $2 \cos x = -\sqrt{3}$

Пример. $\tan x = -\sqrt{3}$

Решение: На единичной окружности уравнению соответствуют два угла поворота: $\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$. Так как период равен π , то значения $-\sqrt{3}$ тангенс принимает в точках равноудаленных друг от друга на расстояние π , то есть $\tan(\pi + \theta) = \tan \theta$.




Значит решения уравнения $\tan x = -\sqrt{3}$ на интервале $0 \leq x \leq 4\pi$, можно найти по правилу.

$$\frac{2\pi}{3} \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\pi} \frac{2\pi}{3} + \pi = \frac{5\pi}{3} \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\pi} \frac{5\pi}{3} + \pi = \frac{8\pi}{3} \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\pi} \frac{8\pi}{3} + \pi = \frac{11\pi}{3}$$

0 | \leftarrow $0 \leq x \leq 4\pi$ \rightarrow | 4π

15. Найдите приближённые корни следующих уравнений на заданном промежутке при помощи графика функции $y = \cos x$.



а) $\cos x = 0,4$ $0 \leq x \leq 450^\circ$

б) $\cos x = -0,5$ $0 \leq x \leq 630^\circ$

в) $\cos x + 1 = 1$ $0 \leq x \leq 910^\circ$

г) $2 \cos x = -2$ $0 \leq x \leq 630^\circ$

16. Решите уравнения.

а) $2 \sin(x + \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

б) $\sin(2x + \frac{\pi}{4}) = 0$

в) $\cos(2x + \frac{\pi}{3}) = 0$

г) $2 \cos(x - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$

д) $\tan(2x - \frac{\pi}{3}) = 1$

е) $\cot(2x - \frac{\pi}{6}) = 0$

17. Решите уравнения.

а) $\sin 2x \cdot \sin x - \cos 2x \cdot \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

б) $\cos^2 x - \sin^2 x = \frac{1}{2}$

в) $\sin 3x \cdot \cos x = 1 + \sin x \cdot \cos 3x$

г) $\sin x \cdot \cos x = 0$

18. Найдите корни уравнения, принадлежащие промежутку, по образцу.

а) $\cos^2 x - \sin^2 x = 1, (0; 3\pi]$

б) $\cos^2(x + 30^\circ) - \sin^2(x + 30^\circ) = -1, (180^\circ; 270^\circ)$

в) $\sin x \cos x = \frac{1}{2}, [-\pi; 2\pi]$

Пример: а) $\cos^2 x - \sin^2 x = 1, (0; 3\pi]$

Решение: Запишем уравнение в виде $\cos 2x = 1$.

Общее решение уравнения $\cos \theta = 1$ имеет вид: $\theta = 2\pi k, (k \in \mathbb{Z})$.

Отсюда получаем: $2x = 2\pi k, x = \pi k, (k \in \mathbb{Z})$

Если $0 < x \leq 3\pi$ по условию, тогда $0 < \pi k \leq 3\pi$.

Разделим каждую сторону на π : $0 < k \leq 3, (k \in \mathbb{Z})$.

Подставим полученные значения $k = 1; 2; 3$ в формулу $x = \pi k (k \in \mathbb{Z})$

получим корни заданного уравнения: $\pi; 2\pi; 3\pi$.

19. Найдите нули функции на заданном промежутке.

а) $y = \sin 2x, 0^\circ \leq x \leq 180^\circ$

б) $y = \sin(x - \frac{\pi}{4}), 0 \leq x \leq 3\pi$

20. Найдите абсциссы точек пересечения графиков функций.

$y = 3 \cos(x + \frac{\pi}{3})$ и $y = 1,5$.

21. Решите уравнения.

а) $\sin(\pi + x) = -1$

б) $\cos(\pi - x) = 1$

в) $\sin \pi x = 0$

г) $\cos(\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}) = 0$

д) $\tan(\frac{3\pi}{2} + x) = 1$

е) $\cot(\frac{\pi}{2} + \frac{x}{2}) = \sqrt{3}$

22. Найдите корни уравнений в заданном интервале.

а) $4 \tan 3x + 5 = 1, 0 \leq x \leq \pi$


б) $2 \cos 2x + 3 = 2, 0 \leq x \leq 360^\circ$

в) $2 \sin 2x + \sqrt{3} = 0, 0 \leq x \leq 2\pi$

г) $\sqrt{2} \sin 2x + 3 = 2, 0 \leq x \leq 360^\circ$

23. Сколько корней имеет уравнение $\frac{\sin \pi x}{x-1} = 0$ на отрезке $[0; 2\pi]$?

24. Найдите периметр треугольника, зная, что $\cos 2\theta = \frac{7}{25}$.



Решение любого тригонометрического уравнения сводится к решению простейших тригонометрических уравнений. Рассмотрим основные методы решения тригонометрических уравнений на следующих примерах.

1) Метод разложения на множители

Пример. Решим уравнение $\sin 2x - \sin x = 0$.

Решение:

$$2 \sin x \cos x - \sin x = 0 \quad \text{по формуле двойного угла } \sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\sin x(2 \cos x - 1) = 0 \quad \text{вынесение общего множителя за скобку}$$

$$\sin x = 0 \text{ или } 2 \cos x - 1 = 0 \quad \text{по условию равенства "0" произведения}$$

$$x = \pi n, n \in \mathbb{Z} \text{ или } \cos x = \frac{1}{2} \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Ответ: $\pi n, \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}$

Обратите внимание, что в различных семействах решений параметры (n, k) отмечаются разными буквами.

Пример. Решим уравнение $\sin x \cos^2 x = 4 \sin x$ и найдём корни, расположенные на промежутке $[0; 2\pi]$.

Решение: $\sin x \cos^2 x = 4 \sin x$ *заданное уравнение*

$$\sin x \cos^2 x - 4 \sin x = 0 \quad \text{отнимем от каждой части } 4 \sin x$$

$$\sin x (\cos^2 x - 4) = 0 \quad \text{вынесем } \sin x \text{ за скобку}$$

$$\sin x (\cos x - 2)(\cos x + 2) = 0 \quad \text{разложим по формуле разности квадратов}$$

Каждый множитель приравняем к нулю и находим x (если это возможно).

$$\sin x = 0 \quad \cos x - 2 = 0 \quad \cos x + 2 = 0$$

$$x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \quad \cos x = 2 \quad \cos x = -2$$

решений нет решений нет

Решение уравнения в общем виде: $x = \pi k, (k \in \mathbb{Z})$.

Корни уравнения, расположенные на отрезке $[0; 2\pi]$: $x_1 = 0; x_2 = \pi; x_3 = 2\pi$.

2) Метод введения новой переменной

Пример. $2\sin^2 x - \cos x + 1 = 0$

Решение: $2(1 - \cos^2 x) - \cos x + 1 = 0$ *из основного тригонометрического тождества $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$*

$$-2 \cos^2 x - \cos x + 3 = 0$$

$$2 \cos^2 x + \cos x - 3 = 0 \quad \text{упрощаем}$$

$$2a^2 + a - 3 = 0 \quad \text{введём новую переменную } \cos x = a$$

$$(2a + 3)(a - 1) = 0$$

$$a = -1,5 \quad \left| \quad a = 1 \quad \text{решения квадратного уравнения}$$

$$\cos x = -1,5 \quad \left| \quad \cos x = 1 \quad \text{выполняем обратную замену } \cos x = a$$

$$\text{корней нет} \quad \left| \quad x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Ответ: $x = 2\pi k, (k \in \mathbb{Z})$.

3) Решение однородных уравнений

Если $\sin x = a$, $\cos x = b$ и все члены входящие в уравнению являются одночленами одинаковой степени относительно a и b , то такие уравнения называются однородными.

Примеры. $2 \sin x - \cos x = 0$

$$\sin^2 x - 3 \sin x \cdot \cos x + 2 \cos^2 x = 0$$

Если нет общего множителя, то обе части однородного уравнения можно разделить на большую степень $\cos x$ (или $\sin x$).

Пример. $\sin x + \cos x = 0$

Решение. Здесь $\cos x \neq 0$, так как если $\cos x = 0$, то $\sin x = 0$, а это противоречит тождеству $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. Значит $\cos x \neq 0$.

Обе стороны уравнения можно разделить на $\cos x$:

$$\tan x + 1 = 0, \quad \tan x = -1, \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in Z.$$

4) Применение формулы понижения степени

Пример. Решим уравнение $\cos^2 x = \frac{1}{4}$.

Решение. Здесь удобно применить формулу $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$

$$\frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{4} \quad \text{умножим обе части уравнения на 2}$$

$$1 + \cos 2x = \frac{1}{2} \quad \text{отнимем от обеих частей 1}$$

$$\cos 2x = -\frac{1}{2} \quad \text{сделаем замену } 2x = t$$

$$\cos t = -\frac{1}{2}$$

$$t = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in Z \quad \text{так как } \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

$$2x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad \text{разделим обе части уравнения на 2}$$

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n, \quad n \in Z$$

5) Метод введения вспомогательного угла

Уравнения вида $a \sin x \pm b \cos x = d$ (при $ab \neq 0$) удобно решить, введя вспомогательный угол, разделив обе части уравнения на число $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Пример. $\sqrt{3} \cos x + \sin x = \sqrt{3}$

Решение. Здесь $a = \sqrt{3}$, $b = 1$ и $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$.

Разделим обе части уравнения на 2:

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos x + \frac{1}{2} \cdot \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \frac{\pi}{6} \quad \sin \frac{\pi}{6} \quad \text{введём вспомогательный угол } \frac{\pi}{6}$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{по формуле сложения}$$

$$\cos t = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{выполним замену } t = x - \frac{\pi}{6}$$

$$t = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \text{или} \quad t = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n$$

$$x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \left| \quad x - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n \right.$$

$$x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \left| \quad x = 2\pi n, n \in Z \right.$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z$$

Ответ: $\frac{\pi}{3} + 2\pi n, 2\pi n, n \in Z$.

Пример. Сколько корней имеет уравнение $\cos x = \sin \frac{x}{2}$ на отрезке $[0; 2\pi]$?

Решение: $\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \sin \frac{x}{2}$ *по формуле двойного угла*
 $1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} = 0$ *выполним замену $\sin \frac{x}{2} = a$*

$$2a^2 + a - 1 = 0$$

$$a = -1 \quad \left| \quad a = \frac{1}{2} \quad \text{решение квадратного уравнения} \right.$$

$$\sin \frac{x}{2} = -1 \quad \left| \quad \sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \right.$$

$$\frac{x}{2} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{и} \quad \frac{x}{2} = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k$$

$$x = -\pi + 4\pi n, n \in Z$$


$$x = \frac{\pi}{3} + 4\pi k \quad \text{и} \quad x = \frac{5\pi}{3} + 4\pi k, k \in Z.$$

Для параметра n ни одно из значений найденных корней не содержится в заданном отрезке.

$\frac{\pi}{3}$ и $\frac{5\pi}{3}$ корни уравнения на отрезке $[0; 2\pi]$ при $k = 0$.

Для заданного параметра k на заданном отрезке не существует других корней. **Ответ:** два корня.

Убедится в правильности решения можно построив графики функций $y = \cos x$ и $y = \sin \frac{x}{2}$ при помощи графкалькулятора. Точки пересечения графиков будут являться решением. Для этого выполним построение с помощью ресурса, по адресу в интернете <https://www.desmos.com/calculator>.



Обучающие задания

1. Какое из следующих значений x является решением уравнения?

1) $2 \cos x - 1 = 0$

а) $x = \frac{\pi}{3}$ б) $x = \frac{5\pi}{3}$

2) $\csc x - 2 = 0$

а) $x = \frac{\pi}{6}$ б) $x = \frac{5\pi}{6}$

3) $3 \tan^2 2x - 1 = 0$

а) $x = \frac{\pi}{12}$ б) $x = \frac{5\pi}{12}$

4) $2 \cos^2 4x - 1 = 0$

а) $x = \frac{\pi}{16}$ б) $x = \frac{3\pi}{16}$

5) $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$

а) $x = \frac{\pi}{2}$ б) $x = \frac{7\pi}{6}$

6) $\sec^4 x - 4 \sec^2 x = 0$

а) $x = \frac{2\pi}{3}$ б) $x = \frac{5\pi}{3}$

2. Решите уравнения методом разложения на множители.

а) $2 \sin^2 x - \sin x = 0$

б) $\sin^2 x + 2 \sin x = 0$

в) $\cos^2 x - 3 \cos x = 0$

г) $2 \cos^2 x - \sqrt{3} \cos x = 0$

3. Решите уравнения методом введения новой переменной.

а) $\sin^2 x - 2 \sin x - 3 = 0$

б) $2 \sin^2 x - 5 \sin x + 2 = 0$

в) $\cos^2 x - 4 \cos x - 5 = 0$

г) $4 \cos^2 x - 4 \cos x + 1 = 0$

д) $2 \sin^2 x - \cos x + 1 = 0$

е) $2 \cos^2 x + \sin x - 1 = 0$

ж) $\tan^2 x - \tan x - 2 = 0$

з) $\cot x + 3 \tan x = 2\sqrt{3}$

4. Решите однородные уравнения.

а) $\sin x + \cos x = 0$ б) $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 0$ в) $\sin^2 x - 2 \sin 2x + 3 \cos^2 x = 0$

5. Решите уравнение при помощи формулы понижения степени.

а) $4 \sin^2 \frac{x}{2} - 3 = 0$

б) $4 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = 0$

6. Найдите решение следующих уравнений на заданных промежутках.

а) $3 \tan^2 x - 1 = 0, 0 \leq x \leq 360^\circ$

б) $6 \sin^2 x + 5 = 8, 0 \leq x \leq 2\pi$

в) $4 \cos^2 x - 1 = 2, 0 \leq x \leq 2\pi$

г) $2 \cos 2x + 3 = 2, 0 \leq x \leq 360^\circ$

7. Решите уравнения различными методами.

а) $\cos 3x - \cos x = 0$

б) $\sin 3x + \sin x = 0$

в) $\sin x - \sqrt{3} \cos x = 2$

г) $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$

д) $\sin 2x - 2\sqrt{3} \sin^2 x = 0$

е) $\sin 2x = 2 \cos^2 x$

ж) $(1 + \tan x) \cdot \cos x = 0$

з) $(1 - \tan x) \cdot \sin 2x = 0$

и) $\sin x + 1,5 \sin 2x = \sin^3 x$

к) $\cos x + \sin 2x = \cos^3 x$

л) $\cos^4 x - \sin^4 x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

м) $\sin 3x = 3 \sin x$

н) $\sin 3x - 2 \cos 2x = 3$

о) $\cos 4x + \sin x = 2$

8. При помощи калькулятора найдите приближённые решения уравнений, расположенных на интервале $0 \leq x < 2\pi$.

а) $3 \tan x + 1 = 13$

б) $8 \cos x + 3 = 4$

в) $4 \sin x = -2 \sin x - 5$

г) $3 \sin x + 4 \cos x = 5$

9. Запишите решение следующих уравнений в общем виде.

1) $(\cot x - \sqrt{3})(2 \sin x + \sqrt{3}) = 0$

8) $(\tan x - 1)(\cos x - 1) = 0$

2) $2 \sin x - 1 = \csc x$

9) $\tan x + 1 = \sqrt{3} + \sqrt{3} \cot x$

3) $\tan x - \cot x = 0$

10) $\cos^2 x = \sin^2 x + 1$

4) $\csc^2 x - 2 \cot x = 0$

11) $\sin^2 x \cdot \cos x = \cos x$

5) $2 \tan^2 x \cdot \sin x - \tan^2 x = 0$

12) $\sin^2 x \cdot \cos^2 x = 0$

6) $\sec^2 x \cdot \tan x = 2 \tan x$

13) $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$

7) $9 \sin^2 x - 6 \sin x + 1 = 0$

14) $4 \cos^2 x - 4 \cos x + 1 = 0$

10. 1) Для уравнения $\sin(2x - \frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$ найдите:

а) наименьший положительный корень;

б) наибольший отрицательный корень;

в) корни, расположенные на промежутке $[-\frac{\pi}{2}; \pi]$.

2) Найдите корни уравнения $\sin 3x \cdot \cos x = 1 + \sin x \cdot \cos 3x$, расположенные на промежутке $(-\pi; \frac{\pi}{2})$.


11. Постройте графики следующих функций. Запишите точки пересечения графиков с осью x на интервале $0 \leq x < 2\pi$.

а) $y = 2 \sin x + 1$


б) $y = 2 \cos x - 1$

12. По графику на рисунке запишите (приближённые) решения уравнения


$$4 \cos(2(x - 60^\circ)) + 6 = 4$$



13. Движение тела, подвешенного на пружине можно смоделировать функцией, заданной формулой $d = 4 \sin \pi t$. На какой секунде тело изменит положение на 2 см?



1. Расстояние d , которое преодолевает бейсбольный мяч при ударе, зависит от начальной скорости v_0 и угла наклона θ и находится по формуле $d = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$, здесь g ускорение свободного падения. Если противник находится на расстоянии 70 м, а начальная скорость бейсбольного мяча $v_0 = 30$ м/сек, то найдите угол наклона θ .




2. Махир хочет проверить балансировку колёс велосипеда. Для этого он ставит метку на ободе колеса и начинает его крутить. Движение метки задаётся формулой $h(t) = 42 + 18 \cos 3\pi t$. Здесь h - высота(см), t - время (сек.).

- а) На какой высоте окажется метка через время $t = 15$ сек?
 б) За сколько секунд метка окажется на высоте 60 см?




3. **Космос.** Орбита предназначенного для коммуникационных целей искусственного спутника Земли находится на расстоянии t миль от земли. Радиус Земли равен 3960 миль. Со спутника можно увидеть только некоторую часть поверхности Земли. На рисунке горизонтальная окружность ограничивает эту часть и окрашена чёрным цветом. Чтобы определить некоторые размеры горизонтальной окружности, воспользуемся рисунком.



- а) Запишите формулу зависимости t от α .
 б) Найдите t , если $\alpha = 10^\circ$.
 в) Если $t = 30000$ миль, найдите значение α .

Найдите длину минорной дуги АВ. Какое наименьшее количество таких спутников необходимо, чтобы увидеть целиком линию вдоль экватора?

- 4. Литература.** Главный герой романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса Дон Кихот считал себя очень сильным и однажды решил остановить ветряную мельницу. Но он не смог сделать это, так как зацепился за крыло мельницы и стал крутиться в воздухе.




Положение, в которое попал Дон Кихот, можно смоделировать при помощи тригонометрической функции. График на рисунке показывает зависимость высоты, на которой находится Дон Кихот при вращении крыла, от времени.




- 1) По графику найдите следующие показатели и объясните их в реальной ситуации: а) амплитуду; б) период.
- 2) Запишите формулу функции.
- 3) Запишите область определения и множество значений для шести полных периодов функции, показывающей положение Дон Кихота в воздухе.
- 4) В какие минуты Дон Кихот будет находиться на высоте 10 м от земли?
- 5) Как изменится график при уменьшении скорости вращения крыла?


- 5. Гармонические колебания.** Зависимость отклонения пружины от состояния покоя под действием веса тела задана формулой $y = \frac{1}{12} (\sin \pi t - 3 \cos \pi t)$. Здесь t - время в сек., y - изменение положения в м. Найдите время, из интервала $0 \leq t \leq 1$, за которое тело возвращается в состояние равновесия.




- 6.** Водяное колесо используется для преобразования энергии движения воды в полезную энергию. Для проверки баланса колеса в него вбивают гвоздь и начинают крутить. Когда гвоздь находится на самой высокой точке колеса (в начале движения), то расстояние от него до поверхности воды составляет 3,5 м. Через 12 секунд гвоздь уже опускается к самой низкой точке, на расстоянии 0,5 м под водой.



- а) Запишите формулу функции зависимости высоты h , на которой находится гвоздь, от времени.
- б) На какой высоте окажется гвоздь через 15 секунд после начала движения?
- в) Через какое время, после начала движения колесо окажется на высоте 1,5 м от поверхности воды?




7. На одной координатной плоскости постройте графики функций $f(x) = \sin x$ и $g(x) = \frac{1}{2}$.
- Найдите абсциссы точек пересечения графиков.
 - При каких значениях x , взятых из интервала $[0; 4\pi]$, значения функции $f(x)$ больше соответствующих значений функции $g(x)$?
 - Укажите какой-либо интервал, на котором значения функции $f(x)$ меньше соответствующих значений функции $g(x)$.
8. Карусель, радиусом 20 м за каждые 40 секунд совершает один оборот. Самое низкое сиденье находится на высоте 1 м. На рисунке показано схематическое изображение задачи.



- Запишите функцию зависимости движения человека, находящегося на сиденье карусели в виде $h(t) = a \cdot \sin b(t - c) + d$.
- В какие секунды за один полный оборот человек на карусели, окажется на высоте 21 м?

9. Определите согласно графикам функций $f(x) = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4}) + 3$ и $g(x) = 2$, при каких значениях x взятых из интервала $[-3\pi; 3\pi]$:

а) $f(x) = g(x)$; б) $f(x) > g(x)$; в) $f(x) < g(x)$



10. Постройте график функций $f(x) = 2\cos(x + \frac{\pi}{6}) + 1$ и $g(x) = 2$ с помощью графкалькулятора.

Определите, при каких значениях x взятых из интервала $[-3\pi; 3\pi]$:

а) $f(x) = g(x)$; б) $f(x) > g(x)$; в) $f(x) < g(x)$

1. Вычислите при помощи калькулятора.

а) $\cos^{-1}(-0,8)$

б) $\sin^{-1} 0,99$

в) $\tan^{-1} 12$

г) $\cos^{-1} 0,55$

2. Найдите корни следующих уравнений на промежутке $[0; 2\pi)$ (или $[0; 360^\circ)$)

а) $\sin(x + 60^\circ) = \frac{1}{2}$

б) $\cos(x - 30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

в) $\tan(x + 45^\circ) = -1$

г) $\sin(x - 20^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

д) $\cos(2x - \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}$

е) $\tan(\frac{\pi}{4} - x) = 1$

3. Решите уравнения.

а) $2 \cot x + 1 = -1$

д) $\sin x + 2 = 3$

б) $5 \sec^2 x = 6 \sec x$

е) $2 \cos^2 x - \cos x = 1$

в) $4 \sin^2 x - 4 \sin x + 1 = 0$


ж) $\tan^2 x - 4 \tan x + 4 = 0$

г) $\tan x - \cot x = 0$

з) $\cos^2 x = \sin^2 x + 1$

4. Турал и Гусейн бегают по кругу, радиусом 100 м, как показано на рисунке.

Они начали двигаться из точек, указанных на рисунке, в направлении против часовой стрелки. Угловая скорость Турала 0,03 рад/сек., а Гусейна 0,025 рад/сек.



а) Какой путь они пробегут за 8 секунд ?

б) Выразите угол поворота, который опишет Турал за время t секунд.

в) Определите координаты точек в которых они окажутся через 30 секунд.

г) На какой секунде в первый раз Турал пересечет точку с абсциссой 0?

д) На какой секунде в первый раз Гусейн пересечет точку с абсциссой 0?

е) На какой секунде в первый раз Турал обгонит Гусейна?

5. Найдите решения следующих уравнений на промежутке $[0; 2\pi)$.

а) $2 \cos^2 x = \sin x$

б) $\sin^3 x - 5 \sin x = 0$

в) $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 1$

г) $\cos x \cdot \cos 2x = \cos 3x$

д) $\tan(2x - \frac{\pi}{8}) = \sqrt{3}$

е) $\sin 3x - \cos 2x = 2$

6. **Астрономия.** Планета Меркурий движется вокруг Солнца по орбите в виде эллипса. Движение планеты можно задать формулой:

$$r = \frac{3,44 \times 10^7}{1 - 0,206 \cos \theta}$$

При каком наименьшем положительном значении угла θ планета Меркурий будет находится от Солнца на расстоянии 4×10^7 км?



7. На некоторой территории зависимость между увеличением количества кроликов (с увеличением количества хищников) от времени, можно смоделировать так: $D(t) = 400 \cos \frac{\pi t}{12} + 800$.

Здесь D - количество кроликов, t - время по месяцам

- Каково максимальное и минимальное количество кроликов?
 - Каково количество кроликов в текущем месяце?
 - В каком месяце число кроликов было приблизительно равно 1000?
 - Изобразите график функции за 2 года.
8. В течении года собиралась информация о продолжительности светового дня в городе(в час). Зависимость была смоделирована функцией


$$D(x) = \frac{38}{3} - \frac{11}{3} \cos \frac{2\pi}{365} x$$

Здесь x показывает номер дня от начала года.

- Какова продолжительность дня 1 января, 22 марта и 5 ноября?
- В какие дни продолжительность светового дня составит 11 часов?

9. На рисунке изображён график функции $y = a \cdot \sin bx$.

- По графику найдите значения a и b .
- Найдите абсциссы точек P и Q пересечения графика функции с прямой $y = 1,5$.



8

Объём пространственных фигур

Объём призмы


Объём пирамиды

Подобие пространственных фигур

Площади и объёмы подобных фигур

Объём усечённой пирамиды


Симметрия в пространстве



Исследование. Соберите не менее 4 призм различных размеров из кубиков и изобразите полученные призмы.

1. Предположим, что ребро каждого кубика, из которых состоит призма, равна 1 единице, площадь грани равна 1 квадратной единице, а объём равен 1 кубической единице.
2. Данные для каждой призмы запишите в таблицу.
3. Какая связь существует между площадью основания призмы и высотой?
4. Вытащите один кубик из угла конструкции и изобразите вид спереди, сверху и сбоку каждого кубоида.

Призма	Площадь основания	Высота	Объём
1.			
2.			
3.			
4.			




Если тело можно разделить на конечное число треугольных пирамид, то оно называется простым телом. Для простых тел объём - положительная величина, численное значение которой удовлетворяет следующим свойствам.

- 1) Объёмы конгруэнтных тел равны.
- 2) Объём куба, ребро которого равно единице, равен кубической единице.
- 3) Если тело разбито на части, являющиеся простыми телами, то объём этого тела равен сумме объёмов его частей.

Тела, имеющие одинаковые объёмы называются равновеликими.


Объём куба с ребром a равен: $V = a^3$

Объём прямоугольного параллелепипеда, размеры которого являются натуральными числами, равен количеству кубических единиц, из которых он состоит.





Можно также показать, что объём прямоугольного параллелепипеда, размеры которого заданы любыми действительными числами, равен произведению трёх измерений: $V = a \cdot b \cdot c$.

Формулу объёма можно записать как произведение площади основания $a \cdot b$ и высоты c .



Объём прямоугольного параллелепипеда равен произведению площади основания и высоты: $V = S_{\text{осн.}} \cdot h$

Объём любой прямой призмы равен произведению площади основания и высоты. Справедливость данного утверждения проверим на прямой призме, в основании которой лежит прямоугольный треугольник.




Достроим основание призмы до прямоугольника, получим призму, построенную до прямоугольного параллелепипеда. Объём полученной призмы равен $V = AB \cdot AC \cdot AA'$.

Плоскость $BB'CC'$, проходящая через диагональ параллелепипеда, делит призму на две конгруэнтные треугольные призмы. Значит, объём прямой

призмы, в основании которой лежит прямоугольный треугольник будет:


$$V = \frac{AB \cdot AC}{2} \cdot AA' = S_{\text{осн.}} \cdot h$$

В треугольнике ABC , являющемся основанием прямой призмы, проведём высоту так, чтобы она пересекала противоположную сторону во внутренней точке: $AM \perp BC$.




Плоскость, проходящая через ребро AA' перпендикулярно ребру BC , делит призму на две призмы одинаковой высоты, в основании которых лежат прямоугольные треугольники. Объём заданной призмы равен сумме объёмов полученных призм. Значит, объём прямой призмы с произвольным треугольником в основании равен произведению площади основания и высоты.

Если основанием прямой призмы является произвольный многоугольник, то её также можно разделить на треугольные призмы и найти её объём как сумму объёмов данных призм.



Принцип Кавальери для нахождения объёмов. Если любая плоскость, параллельная данной, пересекает два тела по фигурам равной площади, то объёмы этих тел равны.

Этот принцип открыл итальянский математик Бонавентура Кавальери (1598-1647).




Объём призмы


Объём призмы равен произведению площади основания и высоты.

$$V = S_{\text{осн.}} \cdot h$$

**Прямая
призма**



**Наклонная
призма**




Пример. Найдём объём правильной пятиугольной призмы, стороны основания которой равны 4 см, а длина бокового ребра 9 см.

Центральный угол правильного пятиугольника равен $360 : 5 = 72^\circ$, а значит апофема равна:

$$r = \frac{2}{\tan 36^\circ}$$




Площадь правильного многоугольника равна полу-произведению периметра и апофемы.



$$S_{\text{осн.}} = \frac{1}{2} P \cdot r = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 \cdot \frac{2}{\tan 36^\circ} = \frac{20}{\tan 36^\circ} \quad V = S_0 \cdot h = \frac{180}{\tan 36^\circ} \approx 248 \text{ (см}^3\text{)}$$

Обучающие задания

1. По данным рисунка найдите объём прямой призмы.



2. По данным таблицы найдите размеры, помеченные вопросительным знаком.

Размеры прямоугольного параллелепипеда	Значения					
длина a	6	20	2	3	?	8
ширина b	4	30	5	?	8	2
высота c	3	15	?	4	2	?
$S_{бок.}$?	?	?	40	40	60
$S_{п.п.}$?	?	?	?	?	?
V	?	?	60	?	?	?

3. Металлический блок в форме прямоугольного параллелепипеда с размерами 8 см × 15 см × 40 см в целом состоит из металлических пластин. Размеры каждой из них равны 1 см × 1,5 см × 2 см. Сколько таких пластин израсходовали для данной конструкции?



4. Как изменится объём параллелепипеда, если:
- одно из измерений увеличить в 2 раза;
 - каждое из двух измерений увеличить в 2 раза;
 - все три измерения увеличить в 2 раза?

5. Фирма по производству молочных изделий в рамках новой кампании планирует на 25 % увеличить размер упаковки молока, при этом не изменяя её цены. Как это можно сделать, изменив только высоту упаковки?



6. а) Площади трёх граней прямоугольного параллелепипеда равны 2 см^2 , 3 см^2 и 6 см^2 . Найдите его объём.
 б) Размеры прямоугольного параллелепипеда 3 см, 4 см и 5 см. При увеличении длины каждого ребра на x см площадь поверхности увеличивается на 54 см^2 . Найдите, на сколько при этом изменится объём.
7. Основание прямой призмы квадрат. Длина бокового ребра в 3 раза больше стороны основания. Площадь полной поверхности 350 м^2 . Найдите объём призмы.


8. Найдите объём сложных фигур.



9. Найдите объём прямого параллелепипеда, основанием которого является ромб с площадью 2 дм^2 , если площади диагональных сечений равны 9 дм^2 и 16 дм^2 .

10. Найдите объём правильной четырёхугольной призмы, если диагональ боковой грани равна 5 м, а диагональ призмы равна 7 м.

11. Найдите объём прямой призмы на рисунке, если в основании лежит квадрат, $S_{ABCD} = 24 \text{ см}^2$, а $\angle BEG = 60^\circ$.




12. Площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы равна 48 см^2 , а высота 8 см. Найдите:
а) длину стороны основания; б) объём призмы.

13. Найдите объём прямой треугольной призмы, стороны основания которой равны 4 см, 5 см и 7 см, а боковое ребро равно большей высоте основания.


14. Все рёбра правильной треугольной призмы равны x . Докажите, что её объём равен $V = \frac{\sqrt{3}}{4} x^3$.

15. Найдите объём правильной шестиугольной призмы.




16. Сторона основания правильной шестиугольной призмы равна $6\sqrt{3} \text{ см}$, высота 4 см. Найдите площадь боковой поверхности и объём призмы.


17. На рисунке изображён склон прямоугольной формы, который превратили в прямую поверхность CDEF, также прямоугольной формы, выкопав землю. $AB = 10$ м, $ED = 24$. При этом площадь уменьшилась на 10 м^2 . Сколько кубических метров земли было выкопано?




18. Объёмы и высоты фигур равны. Найдите размер x .




19. В основании наклонной призмы лежит квадрат со стороной 4 см. Найдите объём призмы.



20. Боковые рёбра наклонной призмы составляют с плоскостью основания угол 60° . Основанием призмы является равносторонний треугольник со стороной 4 см. Боковое ребро равно 10 см. Найдите объём призмы.



21. В основании наклонной призмы лежит квадрат со стороной 2 единицы. Боковое ребро равно 15 единицам и составляет угол 60° с плоскостью основания. Найдите объём призмы.




22. а) Докажите, что объём наклонной призмы равен произведению площади перпендикулярного сечения и ребра призмы: $V = S_{\perp} \cdot l_{\text{бок}}$

Примечание: Обратите внимание, что угол между плоскостью перпендикулярного сечения призмы и плоскостью основания равен углу между боковым ребром и высотой наклонной призмы.

б) Найдите объём наклонной треугольной призмы, если боковые ребра равны 20 см, а стороны перпендикулярного сечения 13 см, 14 см и 15 см.

23. Все рёбра правильной треугольной призмы равны. Найдите длину одного ребра, если объём призмы равен $16\sqrt{3}$ см³.


24. Найдите объём каждой части, полученной при делении бруска длиной 4 м, шириной 18 см и толщиной 24 см на рисунке, на 6 частей.




25. Высота правильной шестиугольной призмы равна h , а стороны основания равны a . Докажите, что её объём равен $V = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 h$.

26. Длину и ширину прямоугольного параллелепипеда уменьшили на 20%. На сколько процентов надо увеличить его высоту, чтобы объём остался прежним?

27. Длина бассейна 10 м. По данным поперечного сечения на рисунке, найдите:
 а) сколько тонн составляет вместимость бассейна ($1\text{ м}^3 = 1$ тон)?
 б) сколько кубических метров в минуту выкачивает каждая из двух одинаковых труб, если работая вместе они опустошают бассейн за 4 часа?




28. На рисунке изображена коробка, крышка которой упала внутрь. Площадь крышки 15 см².
 а) Найдите третье измерение коробки.
 б) Найдите объём меньшей замкнутой части, которую отделяет крышка.
 в) Найдите объём большей открытой части коробки.




29. а) Докажите, что квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов его измерений: $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$
 б) Найдите объём прямоугольного параллелепипеда, если $a = 3$, $b = 4$, $d = 13$


30. Плотность металла равна 7860 кг/м^3 .
Найдите общую массу металлической балки на рисунке.






31. Форму какой пространственной фигуры имеет зернохранилище на рисунке? Сколько граней и рёбер имеет фигура? По заданным на рисунке размерам найдите объёма зернохранилища.




32. Найдите объём камня, брошенного в посуду с водой, если при этом уровень воды повысился на $0,5 \text{ см}$.




33. По данным рисунка для прямой треугольной призмы сравните объёмы фигур, полученных сечением.



34. Коробка для подарка разделена на 4 части картоном, как показано на рисунке. Найдите объёмы каждой из этих частей. По заданным размерам, найдите сколько картона потребуется для изготовления коробки?





35. Ёмкость для воды имеет форму прямоугольного параллелепипеда с размерами $15\text{см} \times 20\text{см} \times 25\text{см}$. Уровень воды в ёмкости на рисунке равен h_1 . Если ёмкость перевернуть на грань ВСЕМ, то уровень воды будет на высоте h_2 , а если перевернуть на грань АВМN, то уровень воды будет на высоте h_3 . Определите объём воды в ёмкости, если $h_1 + h_2 + h_3 = 24 \text{ см}$.



32. Проектная работа

Информатика: От куска картона с размерами 9 см × 12 см по углам, отрезали квадраты. Если сложить картон по пунктирным линиям, он приобретёт форму коробки. Какие размеры должна иметь коробка наибольшего объёма? Выразим объём коробки через переменную x :

$$V = (12 - 2x)(9 - 2x)x$$



Значения x для этой коробки могут меняться от 0 до $\frac{9}{2}$ ($0 < x < 4,5$). Следующая компьютерная программа рассчитала значения объёма для 10 значений переменной x .


		X	ОБЪЁМ
10	PRINT	0	0
15	PRINT	0,5	44
20	FOR X = 0 TO 4,5 STEP 0,5	1	70
30	LET V = (12 - 2*X) (9 - 2*X) *X	1,5	81
40	PRINT X, V	2	80
50	NEXT X	2,5	70
60	END	3	54
		3,5	35
		4	16
		4,5	0

Результаты программы, напечатанные справа показывают, что максимальное значение объёма 81 достигается при x равным 1,5.

Выполните следующие действия.

- Для более точных вычислений выберите такую команду, которая вычислит значения x между 1 и 2 с шагом 0,1.
- Измените 20-ю команду так, чтобы объём вычислялся с точностью до 0,1 см³.
- Запишите размеры коробки (длину, ширину и высоту) при максимальном объёме.
- Составьте программу для картона с размерами 8 см × 20 см и выполните её на компьютере.
- Выполните необходимые шаги для выполнения данной программы на компьютере (можете изменить язык программирования).


Исследование. 1. Диагонали куба делят его на 6 конгруэнтных пирамид. Основание каждой пирамиды - грань куба, а высота каждой пирамиды равна $\frac{1}{2} a$.



- а) Докажите, что объём каждой пирамиды равен $V = \frac{1}{6} a^3$
 б) Докажите, что объём каждой пирамиды равен $V = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot h$.

Объём пирамиды


Объём пирамиды равен одной третьей произведения площади основания на высоту.



Пусть $TABC$ -треугольная пирамида с вершиной T и основанием ABC . Достроим эту пирамиду до треугольной призмы. Полученная призма состоит из трёх пирамид:

- 1) заданной пирамиды $TABC$,
- 2) пирамиды $TCNM$;
- 3) пирамиды $TMBC$.

Основания 2-ой и 3-ей пирамид конгруэнтны: $\triangle CNM \cong \triangle MBC$ и высота, проведённая из вершины T общая. Поэтому их объёмы равны. Основания 1-ой и 3-ей пирамид конгруэнтны: $\triangle TAB \cong \triangle BMT$ и высота, проведённая из вершины C общая. Поэтому и их объёмы равны. Тогда объём заданной пирамиды равен $\frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot h$.






Основание любой пирамиды всегда можно разделить на треугольники и найти объём пирамиды, суммировав объёмы всех полученных пирамид.



Таким образом, объём любой пирамиды равен одной третьей произведения площади основания на высоту: $V = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot h$

Обучающие задания




1. а) По данным на рисунке найдите объём правильной пирамиды.





- б) По данным на рисунке найдите объём пирамиды.



2. По данным на рисунке найдите объём правильной пирамиды.



3. Основания призмы и пирамиды являются конгруэнтными фигурами. Высота призмы 5 ед., а высота пирамиды 7 ед. Найдите отношение объёмов данных фигур.




4. Найдите объём прямоугольной пирамиды, стороны основания которой равны 18 мм и 24 мм, а каждое боковое ребро равно 25 мм.




5. Каждое боковое ребро треугольной пирамиды, в основании которой лежит треугольник со сторонами 6 см, 8 см и 10 см, равно 13 см. Найдите объём пирамиды.

6. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 10 см, а сторона основания $12\sqrt{3}$ см. Найдите объём пирамиды.

7. Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды на рисунке. Результат округлите до десятых.



8. Найдите объёмы правильных пирамид. Результат округлите до десятых.





9. Основанием пирамиды является ромб со стороной 3 см. Все боковые грани составляют с плоскостью основания угол 45° . Найдите объём пирамиды, если $S_{бок.} = 12 \text{ см}^2$.

10. Найдите объём треугольной пирамиды, если одно из рёбер пирамиды равно 6 см, а остальные 5 см.

11. Даны два конгруэнтных куба. Внутри каждого из них проведены две разные пирамиды F-ABCD и M-ABCD. Вершина M пирамиды M-ABCD находится в центре квадрата EFGH.



а) Объём какой из пирамид больше?

б) Площадь полной поверхности какой из пирамид больше?




12. Боковые грани треугольной пирамиды попарно перпендикулярны и их площади равны 24 дм^2 , 16 дм^2 и 12 дм^2 . Найдите объём пирамиды.


13. Даны два конгруэнтных куба. Основание каждой пирамиды лежит на грани куба. Найдите отношение объёма пирамиды на рисунке В к объёму пирамиды на рисунке А.



14. Сумма длин рёбер правильного октаэдра равна 18 ед. Найдите объём октаэдра.




15. Точка G является центром тяжести основания правильного тетраэдра (точка пересечения медиан). Найдите объём пирамиды, если $GH = 3$ см.




16. Выполните задания по рисунку, если $TABC$ правильная треугольная пирамида.




- а) Если $AM = 9$ и $TM = 5$, то найдите h и l .
 б) Если $BC = 6$, то найдите AO и AM .
 в) Если $h = 4$, $l = 5$, то найдите BC , OM и AM , а также площадь боковой поверхности и объём.
 г) Если $AB = 12$, $TA = 10$, то найдите апофему, площадь боковой поверхности и объём.




17. Найдите объём кристалла на рисунке.



18. По данным на рисунке найдите объёмы фигур.




19. Для выверки вертикального положения в строительстве, обычно, используется инструмент, который называется отвесом. Отвес на рисунке состоит из правильной шестиугольной призмы и пирамиды. Найдите объём инструмента.




Подобные фигуры имеют одинаковую форму и пропорциональные размеры.

Например, прямоугольные треугольники на рисунке подобны, так как отношения соответствующих сторон равны.




Прямоугольные параллелепипеды на рисунке подобны, так как отношения соответствующих линейных размеров равны и соответствующие грани являются подобными прямоугольниками.



$$\frac{3}{6} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$$

Подобные фигуры

Если при преобразовании расстояние между любыми двумя точками меняется в одинаковое число раз, то такое преобразование называется подобием. Одна и другая, полученная при преобразовании подобием фигура, называются подобными фигурами. Коэффициент подобия равен отношению расстояний между парой любых двух соответствующих точек.




$$\frac{AB}{EF} = \frac{BC}{FG} = \frac{CA}{GE} = \frac{AD}{EJ} = \frac{BD}{FJ} = \frac{CD}{GJ} = \frac{h_1}{h_2} = \frac{l_1}{l_2} = k$$

Отношение соответствующих линейных размеров называется **коэффициентом подобия**.


$$\begin{aligned} \triangle ABC &\sim \triangle EFG, \triangle ABD \sim \triangle EFJ, \\ \triangle BCD &\sim \triangle FGI, \triangle ACD \sim \triangle EGI \end{aligned}$$

Пример. Определим, подобны или нет фигуры на рисунке.



$$\frac{10}{15} = \frac{10}{15} \neq \frac{12}{14}$$

Фигуры не являются подобными




$$\frac{4}{6} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Фигуры являются подобными

Исследование. Покажите, подобны или нет следующие фигуры.

Призмы А и В (прямоугольные параллелепипеды) подобные призмы с коэффициентом подобия равным $\frac{2}{3}$.



Для данных призм найдите:

- а) отношение площадей полных поверхностей;
- б) отношение объёмов.

а) Площадь полной поверхности призмы А:

$$S_{п.п.} = Ph + 2S_{осн.} = 12 \cdot 2 + 2 \cdot 8 = 40 \text{ (см}^2\text{)}$$

Площадь полной поверхности призмы В :

$$S_{п.п.} = Ph + 2S_{осн.} = 18 \cdot 3 + 2 \cdot 18 = 90 \text{ (см}^2\text{)}$$

Отношение полной поверхности призмы А к полной поверхности призмы В

$$\frac{40}{90} = \frac{4}{9} = \frac{2^2}{3^2} = \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

б) Объём призмы А

$$V = S_{осн.} \cdot h = 8 \cdot 2 = 16 \text{ (см}^3\text{)}$$

Объём призмы В


$$V = S_{осн.} \cdot h = 18 \cdot 3 = 54 \text{ (см}^3\text{)}$$

Отношение объёма призмы А к объёму призмы В


$$\frac{16}{54} = \frac{8}{27} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

Площади поверхностей и объёмы подобных фигур

Если коэффициент подобия двух пространственных фигур равен k , то отношение площадей (боковых, полных, оснований) равно k^2 , а отношение объёмов равно k^3 .



фигура А







фигура В

Коэффициент подобия: $\frac{a}{b} = k$



$$\frac{S_{п.п.А}}{S_{п.п.В}} = \frac{a^2}{b^2} = k^2, \quad \frac{V_A}{V_B} = \frac{a^3}{b^3} = k^3$$

Обучающие задания

1. Покажите, подобны или нет фигуры на рисунке.



2. По данным на рисунке определите коэффициент подобия двух подобных фигур.



3. Высоты двух подобных призм относятся как 5 : 3. Найдите:

- отношение боковых поверхностей;
- отношение объёмов.

4. Правильные четырёхугольные пирамиды А и В подобны. Сторона основания пирамиды А равна 6 см, объём 48 см^3 . Сторона основания пирамиды В равна 12 см. Найдите:





- объём пирамиды В ;
- отношение боковых поверхностей;
- площадь полной поверхности каждой пирамиды.

5. Найдите разность объёмов двух кубов, если диагональ одного из них равна $\sqrt{3} \text{ см}$, а другого $4\sqrt{3} \text{ см}$.

6. Объёмы двух подобных пирамид равны 2 и 54 куб.ед. Найдите следующие отношения:

- высот
- площадей оснований
- апофем
- площадей полных поверхностей

7. Зная, что фигуры на рисунке подобны, найдите неизвестные данные.



8. Даны площади поверхностей двух подобных фигур и объём большей фигуры. Найдите объём меньшей фигуры.

а) $S_1 = 18 \text{ см}^2$	б) $S_1 = 192 \text{ м}^2$	в) $S_1 = 52 \text{ дм}^2$
$S_2 = 72 \text{ см}^2$	$S_2 = 1728 \text{ м}^2$	$S_2 = 208 \text{ дм}^2$
$V_2 = 344 \text{ см}^3$	$V_2 = 4860 \text{ м}^3$	$V_2 = 192 \text{ дм}^3$

9. Даны объёмы двух подобных фигур и площадь поверхности меньшей фигуры. Найдите площадь поверхности большей фигуры.

а) $V_1 = 27 \text{ см}^3$	б) $V_1 = 5 \text{ м}^3$	в) $V_1 = 54 \text{ см}^3$
$V_2 = 125 \text{ см}^3$	$V_2 = 40 \text{ м}^3$	$V_2 = 128 \text{ см}^3$
$S_1 = 63 \text{ см}^2$	$S_1 = 4 \text{ м}^2$	$S_1 = 18 \text{ см}^2$


10. Высоты двух подобных пирамид относятся как 1:3. Найдите площадь боковой поверхности, меньшей пирамиды если разность площадей боковых поверхностей равна 96 м^2 .

11. Фирма по производству стирального порошка, для нового вида порошка, увеличивает упаковки в определённом масштабе и получает новые коробки. Размеры коробки, вместимостью 450 грамм увеличивается в масштабе 1 : 2. Найдите вместимость новой коробки.

12. Модель самолёта выполнена в масштабе 1:200. Сравните количество краски, необходимой для покраски реального самолёта и его модели.




- 13.** Две медные детали в форме правильной шестиугольной призмы подобны. Плотность меди $8,6 \text{ г/см}^3$, цена 1 кг меди 2,55 манат. Фирма по производству деталей определяет себестоимость детали (не зависимо от размера) из стоимости материала и 125% от затрат на производство. Розничная цена продажи формируется фирмой добавлением к себестоимости 22% прибыли. Найдите розничную цену продажи каждой детали.



- 14.** Для создания дизайна нового автомобиля сначала изготавливают модель из глины в соответствующем масштабе. Длина глиняной модели равна 10 см, а длина реального автомобиля 5 м. Найдите отношение площади поверхности модели из глины к площади поверхности реального автомобиля




Пирамида, полученная сечением плоскостью параллельной основанию, подобна данной. Коэффициент подобия можно найти из отношения соответствующих линейных размеров. Например, на рисунке даны высоты. Тогда, отношения их боковых поверхностей, оснований и полных поверхностей равно квадрату отношения высот.



$$\frac{S_{\text{мал.}}}{S_{\text{бол.}}} = \frac{h^2}{H^2}$$

- 15.** Сторона основания правильной треугольной пирамиды на рисунке равна 8 см, а высота 12 см. Пирамида пересекается плоскостями, параллельными основанию на расстоянии 4 см и 6 см начиная от вершины Т. Найдите периметры многоугольников, образованных сечениями.



- 16.** Найдите расстояние от вершины пирамиды высотой H до плоскости параллельной основанию, если она делит объём пирамиды пополам.
- 17.** Плоскости, параллельные основанию пирамиды, делят её высоту на три равные части. В каком отношении плоскости делят объём пирамиды.

Исследование. В древнем Египте объём правильной усечённой четырёхугольной пирамиды вычисляли по формуле $V = \frac{1}{3} h(x^2 + xy + y^2)$. Однако доподлинно не известно каким образом эта формула была получена. Выведите формулу, выполнив следующие шаги:


а) Запишите объём правильной четырёхугольной пирамиды, со стороной основания y ед.

б) Запишите объём правильной четырёхугольной пирамиды, со стороной основания x ед.

в) Покажите зависимость между высотами H и h , как $H = \frac{yh}{y-x}$

г) Покажите, что объём усечённой пирамиды находится по формуле

$$V = \frac{1}{3} h(x^2 + xy + y^2).$$




Объём усечённой призмы

Объём усечённой пирамиды можно также найти как разность объёмов пирамид, при сечении плоскостью параллельной основанию.

$$V = \frac{1}{3} S_2(h_1 + h) - \frac{1}{3} S_1 h_1 = \frac{1}{3} [(S_2 - S_1)h_1 + S_2 h]$$

Здесь V - объём усечённой пирамиды, S_2 и S_1 площади нижнего и верхнего оснований. h - высота усечённой пирамиды, h_1 - высота меньшей пирамиды. Так как эти пирамиды подобны, то отношение площадей равно квадрату отношений высот. Запишем это равенство и найдём высоту меньшей пирамиды.




$$\frac{S_1}{S_2} = \left[\frac{h_1}{h_1 + h} \right]^2, \quad \frac{h_1}{h_1 + h} = \frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S_2}}, \quad h_1 \sqrt{S_2} = (h_1 + h) \sqrt{S_1}, \quad h_1 = \frac{h \sqrt{S_1}}{\sqrt{S_2} - \sqrt{S_1}}$$

Учитывая выражение $h_1 = \frac{h \sqrt{S_1}}{\sqrt{S_2} - \sqrt{S_1}}$ в равенстве $V = \frac{1}{3} [(S_2 - S_1)h_1 + S_2 h]$.

$$\begin{aligned} \text{получим: } V &= \frac{1}{3} [(S_2 - S_1) \frac{h \sqrt{S_1}}{\sqrt{S_2} - \sqrt{S_1}} + S_2 h] = \frac{1}{3} [(\sqrt{S_2} + \sqrt{S_1}) h \sqrt{S_1} + S_2 h] = \\ &= \frac{1}{3} (h \cdot \sqrt{S_1 S_2} + h S_1 + h S_2) = \frac{1}{3} h (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2) \end{aligned}$$


$$V = \frac{1}{3} h (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

Объём усечённой пирамиды с площадями оснований S_1 и S_2 , и высотой h вычисляется по формуле $V = \frac{1}{3} h (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$




Обучающие задания


1. Правильная прямоугольная пирамида высотой 9 см пересекается плоскостью, параллельной основанию на расстоянии 3 см от вершины. Длина стороны основания пирамиды 6 см.
- Найдите объем данной пирамиды.
 - Найдите объем малой пирамиды.
 - Найдите объем усеченной пирамиды.




2. По данным на рисунке найдите площадь боковой поверхности, полной поверхности и объем правильной четырёхугольной усечённой пирамиды.




3. Плоскость, проходящая параллельно основанию пирамиды делит её высоту в отношении 1 : 2, начиная от вершины. Найдите объем пирамиды, если объем полученной усечённой пирамиды равен 208 куб. ед.



4. На рисунке даны размеры пирамиды, полученной при сечении плоскостью параллельной основанию пирамиды высотой H . Найдите:
- высоту H
 - объем усечённой пирамиды
 - сколько машин вместимостью 6 м^3 потребуется для транспортировки земли, если вырыть бассейн для воды данной формы
 - сколько литров воды вмещает бассейн
 - какова глубина воды, если бассейн заполнить на половину объёма?




5. Длина ребра правильного тетраэдра обозначена через x .
- Выразите объем тетраэдра через переменную x .
 - Выразите объем усеченной пирамиды, разделенной плоскостью, проходящей через середины боковых ребер тетраэдра, через переменную x .



Симметрия на плоскости


Отображение (осевая симметрия)

*ось симметрии
перпендикуляр
до
оси симметрии*




Вращательная симметрия


*ц е н т р
вращения*



3-го порядка




4-го порядка





5-го порядка



Симметрия в пространстве. В пространственных фигурах также можно наблюдать различную симметрию. Известно, что в параллелепипеде диагональные сечения являются параллелограммами и диагонали BD_1 и DB_1 пересекаясь в точке O делятся пополам. Можно показать, что другие диагонали также пересекаются в точке O и делятся пополам. Значит, точка пересечения диагоналей параллелепипеда является центром его симметрии.




В пространстве, помимо симметрии относительно точки и прямой, рассматривается симметрия относительно плоскости. Если отрезок AA' пересекает плоскость α посередине, и перпендикулярен плоскости, то говорят, что точки A и A' симметричны относительно плоскости α . Если точки фигуры, симметричные некоторой плоскости, также принадлежат этой фигуре, то эту плоскость называют плоскостью симметрии, а фигуру называют симметричной относительно плоскости.




Прямоугольный параллелепипед, у которого все линейные размеры разные, кроме центра симметрии имеет ещё три оси и три плоскости симметрии. Прямая, проходящая через точку пересечения диагоналей противоположных граней, называется осью симметрии, а плоскость, проходящая перпендикулярно через середину рёбер называется плоскостью симметрии.



Прямоугольный параллелепипед, у которого два линейных размера равны, имеет 5 плоскостей симметрии. Данные изображения нарисуйте в тетрадь.




Точка пересечения диагоналей куба является его центром симметрии. Прямые, проходящие через середину параллельных рёбер, не принадлежащих одной грани (их всего 6) и прямые, проходящие через центры противоположных граней (их всего три), являются осями симметрии куба. У куба 9 плоскостей симметрии. Они изображены на следующих рисунках.



Вращательная симметрия. Вращательная симметрия пространственных фигур похожа на вращательную симметрию плоских фигур. Однако, для объёмных фигур она определяется при помощи оси вращения.




Нафталин: $C_{10}H_8$




Вращательная и осевая симметрия широко применяется при изучении строения молекул веществ.

Обучающие задания


1. На рисунке показаны оси вращения куба. Геометрически заданные оси описаны словами. Покажите возможные варианты изображений для куба на рисунке. Один из возможных вариантов показан на рисунке в качестве примера.




а) Ось симметрии (ось вращения) объединяет центры противоположных граней. Для каждого случая существует 4 совмещения самим с собой.




б) Ось вращения - прямая, содержащая диагональ куба. Для каждого случая существует 3 совмещения самим с собой.




в) Ось вращения - прямая, проходящая через середину двух рёбер противоположных граней. Для каждого случая существует 2 совмещения самим с собой.





2. Сколько раз куб совмещается сам с собой при полном повороте относительно оси, проходящей через центр противоположной грани.




3. При повороте на сколько градусов пятиугольная правильная призма совпадает сама с собой при вращении вокруг оси, проходящей через центр оснований?



4. Какая буква будет видна на (верхней, боковой, передней) грани куба при повороте в направлении против часовой стрелки на угол 270° вокруг оси, проходящей через центры двух противоположных граней?




1. Коробка на рисунке имеет форму правильной пятиугольной призмы. Сторона внешнего основания равна 10 см, а высота 14 см. Сторона внутреннего основания равна соответственно 6 см, а высота 11 см. Найдите:




- а) площадь полной поверхности внешней поверхности;
 б) площадь полной поверхности внутренней поверхности;
 в) емкость коробки.

2. В пирамиде, основание которой является квадрат имеется 60 см³ воды. По рисунку найдите:
 а) высоту уровня воды h ;
 б) сколько литров воды надо долить, чтобы наполнить пирамиду?




3. Площади поверхностей двух подобных пирамид относятся как 1:25. Найдите отношение объёмов.

4. Объёмы прямой треугольной и правильной четырёхугольной призмы равны. Высота каждой из них равна 15 см. В основании треугольной призмы лежит равнобедренный прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см. Найдите площадь полной поверхности четырёхугольной призмы.



5. **Задание открытого типа.** Изобразите по две подобные пирамиды и подобные призмы с коэффициентом подобия $\frac{2}{5}$ и запишите полученные размеры.


6. В коробку высотой 40 см собраны правильные шестиугольные призмы. На рисунке показан вид сверху. Сторона основания правильной шестиугольной призмы равна 4 см. Найдите объём не заполненной части коробки.




7. В прямоугольной треугольной призме площадь основания 4 см², площади боковых граней 9 см², 10 см² и 17 см². Найдите объём призмы.

8. Площадь сечения, параллельного основанию пирамиды, равна 0,36 части площади основания. В каком отношении это сечение делит объём пирамиды?

9. Найдите объём пирамиды, развертка которой показана на рисунке.




10. Пирамида разделена плоскостью, параллельной основанию, на две равные по объёму части. Найдите высоту маленькой пирамиды, если высота пирамиды равна 12 см.




11. Коробка имеет форму прямоугольного параллелепипеда объёмом 64 см^3 . Какими целыми числами должны выражаться размеры коробки, чтобы для её изготовления понадобилось наименьшее количество картона?

12. По рисунку найдите объём и площадь полной поверхности пирамиды, в основании которой лежит прямоугольник.




13. а) Найдите объём правильной шестиугольной пирамиды, сторона основания которой равна 6 см, а боковое ребро 10 см.


- б) Сравните объёмы прямоугольного параллелепипеда и пирамиды, полученной при сечении его плоскостью, как показано на рисунке.



14. По данным рисунка для прямой треугольной призмы: а) найдите площадь сечения; б) сравните объёмы фигур, полученных сечением.



15. Поместится ли 5000 кубиков, ребром 2 см в коробку данными измерениями?



16. Оцените объём вашего класса. Вы можете определить длину и ширину комнаты приблизительно считая шаги. Приблизительную высоту комнаты определите относительно своему росту. Проверьте свои оценки, сделав точные измерения.



9

Показательная и логарифмическая функция

Степень с действительным показателем
Показательная функция. Число e
Логарифм числа
Логарифмическая функция
Свойства логарифмов
Логарифмическая шкала. Решение задач
Показательные уравнения
Логарифмические уравнения
Показательные неравенства
Логарифмические неравенства

При археологических раскопках для установления возраста останков рассчитывают количество Углерода 14. При этом приходится решать показательные уравнения.



Древний город, обнаруженный при раскопках в городе Шамкире.

Практическое занятие

- 1) Запишите значение $\sqrt{2}$, полученное при помощи калькулятора.
 $\sqrt{2} = 1,414213562\dots$
- 2) Задайте последовательность, члены которой являются десятичными приближениями, $\sqrt{2}$ с недостатком:
 1; 1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; 1,41421; 1,414213; ...
- 3) Запишите в виде степени с основанием 3, для которых показателями являются данные члены:
 3^1 ; $3^{1,4}$; $3^{1,41}$; $3^{1,414}$; $3^{1,4142}$; $3^{1,41421}$; $3^{1,414213}$; ...
- 4) При помощи калькулятора вычислите данные члены, заданные в виде степени с рациональным показателем.
 $3^1 = 3$
 $3^{1,4} \approx 4,6555367217$
 $3^{1,41} \approx 4,7069650017$
 $3^{1,414} \approx 4,7276950353$
 $3^{1,4142} \approx 4,7287339302$
 $3^{1,41421} \approx 4,7287858809$
 $3^{1,414213} \approx 4,728801462$
- 5) Обратите внимание, что чем ближе показатель степени приближается к $\sqrt{2}$, соответствующая разность между двумя соседними значениями становится меньше и значение степени приближается к определённому числу. Это число называется $\sqrt{2}$ (иррациональной) степенью числа 3. Вычисление при помощи калькулятора: $3^{\sqrt{2}} \approx 4,7288043878 \dots$
- 6) Выполните задание для $2^{\sqrt{3}}$.

Подобным образом рассматривается и степень с иррациональным показателем a^α . Если для иррационального числа α , задать последовательность десятичных приближений $\alpha_1; \alpha_2; \alpha_3; \dots$, которой соответствует последовательность следующих членов $a^{\alpha_1}; a^{\alpha_2}; a^{\alpha_3}; \dots$, то число, к которому стремится данная последовательность, обозначается a^α .

Степень с рациональным и иррациональным показателем определена только для положительных оснований. Таким образом, для произвольного действительного числа x вводится понятие степень с действительным показателем a^x (здесь $a > 0$).

Считается, что $1^x = 1$ для произвольного x и $0^x = 0$, при $x > 0$.

Для степени с действительным показателем выполняются известные свойства степени с рациональным показателем.

Свойства степеней. Для любых действительных чисел x и y при $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$ справедливо следующее:

$$1) a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad 2) a^x : a^y = a^{x-y} \quad 3) (a^x)^y = a^{xy} \quad 4) (ab)^x = a^x b^x \quad 5) \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

$$6) a^x > a^y, \text{ при } a > 1, x > y, \quad a^x < a^y, \text{ при } 0 < a < 1, x > y$$

$$7) a^x > b^x, \text{ при } a > b, x > 0, \quad a^x < b^x, \text{ при } a > b, x < 0$$

$$8) \text{ если } a^x = a^y, \text{ то } x = y$$

Обучающие задания

- 1.** Значения выражений с иррациональной степенью, можно приблизительно вычислить при помощи калькулятора. На калькуляторе также можно вычислить степень с иррациональным показателем, нажав клавишу \wedge

Вычислите:

$$а) 8^{\sqrt{3}}; \quad б) 5^{-\sqrt{11}}; \quad в) (\sqrt{10})^{\sqrt{2}}; \quad г) 9^{\pi}; \quad д) 15^{\sqrt{5}}; \quad е) (\sqrt{7})^{\sqrt{3}}$$

- 2.** Напишите по одному примеру, соответствующему следующим правилам.

$$а) a^x \cdot a^y = a^{x+y} \quad б) \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \quad в) (a^x)^y = a^{xy}$$

$$г) (ab)^x = a^x b^x \quad д) \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x \quad е) a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

- 3.** а) Выразите в виде степени 3: $\frac{3^{2n} \cdot 3^{1+n}}{81^{n-1}}$

б) Выразите в виде степени 2: $\frac{32 \cdot 8^x}{16^x}$

в) Выразите в виде степени 5: $\frac{25^x \cdot 5^{3x}}{125^{2+x}}$

- 4.** При помощи калькулятора найдите приближённые значения данных выражений с пятью значащими цифрами после запятой.

$$2^{1,4}, 2^{1,41}, 2^{1,414}, 2^{1,4142}, 2^{1,41421}, 2^{1,414213}$$

Данные выражения имеют рациональный показатель. Как при помощи данных выражений можно вычислить значение иррациональной степени $2^{\sqrt{2}}$?

- 5.** Упростите и найдите значение.

$$а) (5^{\sqrt{2}})^{\sqrt{8}} \quad б) ((\sqrt{2})^{\sqrt{6}})^{\sqrt{6}} \quad в) (2^{\sqrt{3}})^{\sqrt{3}} \cdot 4^{\sqrt{3}} + 2 \cdot 2^{2\sqrt{3}}$$

$$г) 3^{\sqrt{2}} \cdot 9^{\sqrt{2}+1} \cdot 27^{\sqrt{2}}; \quad д) \sqrt[4]{2^{(\sqrt{3}+1)^2} \cdot 4^{-\sqrt{3}}} \quad е) \sqrt[3]{5^{(\sqrt{2}+1)^2} \cdot 25^{-\sqrt{2}}}$$

$$ж) \sqrt[4]{3^{(\sqrt{7}+1)^2} \cdot 9^{\sqrt{7}}} \quad з) \sqrt[5]{0,2^{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2} \cdot 25^{\sqrt{6}}} \quad к) (2^{(2+\sqrt{2})^2} : 4^3)^{\sqrt{2}}$$

6. Сравните.

а) $10^{\sqrt{5}}$ и $10^{\sqrt{3}}$

б) $0,1^{\sqrt{3}}$ и $0,1^{\sqrt{2}}$

в) $(\frac{2}{3})^{-5}$ и $(\frac{2}{3})^{-3}$

г) $(\sqrt{3})^{-4}$ и $(\sqrt{3})^{-2}$.

7. Какое соотношение верно?

а) $3 < 3^{\sqrt{2}} < 9$

б) $2 < 2^{\sqrt{3}} < 4$

в) $1 < 5^{\sqrt{2}} < 5$

г) $4^{\sqrt{2}} < 4^{\sqrt{3}} < 4^{\sqrt{5}}$.

8. Сравните следующие числа с 1.

а) $(\frac{3}{4})^{\frac{10}{3}}$

б) $(\frac{5}{7})^{-\frac{4}{3}}$

в) $(\frac{2}{5})^0$

г) $2^{-\sqrt{3}}$

9. Расположите числа в порядке возрастания.

а) 8^{200} ; 9^{150} ; 125^{100}

б) $(0,008)^{50}$; $(0,09)^{75}$; $(0,5)^{150}$

в) $(\frac{9}{4})^{-0,1}$; $(\frac{9}{4})^{0,2}$; $(\frac{3}{2})^{\frac{1}{6}}$;

г) $(\frac{4}{7})^{\frac{2}{3}}$; $(\frac{49}{16})^{\frac{1}{4}}$; $(\frac{16}{49})^{\frac{4}{3}}$

10. Вычислите значение выражения.

а) $100^{-\frac{1}{2}} \cdot (\frac{1}{5})^{-1}$

б) $(\frac{4}{25})^{\frac{1}{2}} : (\frac{9}{4})^{-\frac{1}{2}}$

в) $(27^{\frac{2}{3}} + 125^{\frac{1}{3}} + 8^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{4}}$

г) $(8^{\frac{2}{3}} + (\frac{1}{9})^{-\frac{3}{2}} + \sqrt{125^{\frac{2}{3}}})^{\frac{1}{2}}$

11. Для положительных значений переменных, запишите в виде степени с рациональным показателем и упростите.

а) $\sqrt{m^6 n^4}$

б) $\sqrt[3]{8x^3 y^6}$

в) $\sqrt[5]{a^{10} b^2} \cdot \sqrt[5]{b^3}$

г) $\sqrt{a^3 \sqrt{a \sqrt{a}}}$

12. Зная, что $b_2 = \sqrt[5]{3}$ и $b_3 = \sqrt[5]{81}$ члены геометрической прогрессии, найдите знаменатель прогрессии.

13. Расположите $a^{\frac{1}{2}}$; $a^{\frac{1}{3}}$; $a^{-\sqrt{3}}$; $a^{-\sqrt{2}}$; a^0 ; a^π в порядке возрастания, зная что:

а) $a > 1$

б) $0 < a < 1$

14. Решите уравнения.

а) $x^{-\frac{3}{2}} = 8$

б) $6x^{\frac{2}{3}} + 12 = 36$

в) $\frac{1}{5} \sqrt{x^3} = 5,4$

г) $x^{\frac{2}{3}} 2x^{\frac{1}{3}} - 3 = 0$

д) $\sqrt[3]{x^2 + 2} + 1 = 4$

е) $x^2 + 2 = 2\sqrt{x^2 + 5}$

ж) $\sqrt[4]{x} + \sqrt{x} = 2$

з) $\sqrt{x+1} - \sqrt{x-7} = 2$



Практическое занятие.

1) Составьте таблицу значений для функций $y = 2^x$ и $y = (\frac{1}{2})^x$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = 2^x$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y = (\frac{1}{2})^x$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

2) На координатной плоскости постройте точки, абсциссы которых соответствуют аргументам, а ординаты значениям функции и соедините сплошной кривой линией.



3) Сравните с "0" значения выражений 2^x и $(\frac{1}{2})^x$ для произвольных значений x .

4) Увеличиваются или уменьшаются значения функции $y = 2^x$ при увеличении значений x ? Увеличиваются или уменьшаются значения функции

$y = (\frac{1}{2})^x$ при увеличении значений x ?

5) В какой точке графики пересекают ось y ?

6) Сравните графики и запишите их сходные и отличительные черты.

7) Выполните задание для функций $y = 3^x$ и $y = (\frac{1}{3})^x$.

Показательная функция

При $a > 0$, $a \neq 1$ функция $y = a^x$ называется показательной функцией.

1) Область определения показательной функции все действительные числа.

$$D(a^x) = (-\infty; +\infty)$$

2) Множество значений показательной функции все положительные числа.

$$E(a^x) = (0; +\infty)$$



3) Так как $a^0 = 1$ (при $x = 0$), то график показательной функции пересекает ось y в точке $(0; 1)$.

4) При $a > 1$ функция a^x возрастающая, при $0 < a < 1$ функция a^x убывающая.

5) Показательная функция не пересекает ось абсцисс и её график расположен выше оси x , т.е. в верхней полуплоскости.

б) При $0 < a < 1$, если x бесконечно возрастают, соответствующие значения y бесконечно убывают и точки графика функции $y = a^x$ неограниченно стремятся к оси абсцисс.

При $a > 1$ и $x \rightarrow -\infty$ точки на графике неограниченно стремятся к оси абсцисс. Ось абсцисс является горизонтальной асимптотой показательной функции.



Показательная функция при изменении аргумента возрастает или убывает с большой скоростью.


Пример 1. По графику функции зададим её уравнение.

Решение: Составим таблицу значений.

x	-2	-1	0	1
y	9	3	1	$\frac{1}{3}$

Из таблицы значений видно, что при увеличении значений x на 1 единицу, значения y уменьшаются в $\frac{1}{3}$.

Значит, $a = \frac{1}{3}$. Тогда формула функции будет: $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$



Пример 2. При каких значениях переменных справедливо следующие:

а) равенство $4^x = 64$; б) неравенство $3^x > 9$; в) неравенство $0,4^x > 0,16$?

Решение: а) запишем равенство $4^x = 64$ в виде $4^x = 4^3$. Здесь по свойству степени с действительным показателем $x = 3$.

б) запишем неравенство $3^x > 9$ в виде $3^x > 3^2$. Здесь ясно, что $x > 2$.

в) запишем неравенство $0,4^x > 0,16$ в виде $0,4^x > 0,4^2$ (в виде степени с одинаковым основанием), степени с основанием меньше 1. Получим, что $x < 2$.

Обучающие задания

1. Постройте графики следующих функций, задав как минимум 3 точки.

$$1) f(x) = 4^x \quad 2) g(x) = 6^x \quad 3) m(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x \quad 4) h(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^x$$

- а) Покажите, является ли функция возрастающей или убывающей.
 б) Покажите область определения и множество значений функции.
 в) Определите точку пересечения графика с осью y .

2. Возрастающими, или убывающими являются следующие функции:

$$а) y = 5^x; \quad б) y = 0,3^x; \quad в) y = 5^{-x}; \quad г) y = (\sqrt{2} - 1)^x; \quad д) y = (\sqrt{5} - 1)^{-x}.$$

3. Найдите следующие значения функций.

$$а) f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x \quad f(1), f(2), f(-1), f(-2) \quad б) h(x) = (\sqrt{5})^x \quad h(1), h(2), h(-1), h(-2)$$




$$в) g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x \quad g(0), g(2), g(\sqrt{2}), g(-1) \quad г) m(x) = 2^{3x-1} \quad m(0), m(2), m(\sqrt{2}), m(-1)$$

4. Установите соответствие между функцией и графиком.

$$1) y = 5^x$$



$$2) y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$$

$$3) y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$$



5. Можно ли назвать функции $y = 0^x$ и $y = 1^x$ показательными функциями? Можно ли назвать показательной функцию $y = (-1)^x$?

6. По графику функций $y = a^x$, $y = b^x$, $y = c^x$ сравните числа a , b , c .



7. Запишите формулу показательной функции $y = c \cdot a^x$, график которой проходит через точку.

а) $(0; -2)$ и $(-2; -32)$

в) $(0; 7)$ и $(2; 63)$





д) $(0; 0,2)$ и $(4; 51,2)$

б) $(0; 3)$ и $(1; 15)$

г) $(0; -5)$ и $(-3; -135)$

е) $(0; -0,3)$ и $(5; -9,6)$

8. 1) По следующим данным напишите формулу функции в виде $y = a^x$.
2) Составьте таблицу значений и заново постройте график в тетради.



9. Даны функции $f(x) = 5^x$, $g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x$, $h(x) = 3^x$.

- а) Значение какой функции больше при $x = 5$?
б) Значение какой функции меньше при $x = -5$?
в) При каких значениях x значения функций равны?

10. Зная, что $f(x) = 3 \cdot 2^x$, $g(x) = 0,3^x$ сравните:

- а) $f(5)$ и $f(6)$; б) $f(0,1)$ и $f(0,5)$; в) $f(-\sqrt{2})$ и $f(\sqrt{2})$;
г) $g(5)$ и $g(6)$; д) $g(0,1)$ и $g(0,5)$; е) $g(-\sqrt{2})$ и $g(\sqrt{2})$.

11. Сравните:

- а) $(\sqrt{2})^3$ и $(\sqrt{2})^6$; б) $0,1^3$ и $0,1^{\sqrt{8}}$; в) $4^{-\sqrt{2}}$ и $4^{-\sqrt{3}}$.

12. При каких значениях переменных справедливы равенства?

- а) $3^{x+1} = 27$; б) $4^{x-2} = 64$; в) $(\sqrt{2})^x = 2\sqrt{2}$.

13. При каких значениях переменных справедливы неравенства?

- а) $2^x > 32$; б) $3^x < 27$; в) $0,2^x > 0,04$; г) $\frac{1}{2} < \left(\frac{1}{8}\right)^x$

14. Решите следующие уравнения графически:

- а) $2^x = 3 - x$; б) $\left(\frac{1}{2}\right)^x = x + 6$

15. При помощи графика определите знак корня уравнения.

- а) $5^x = 6$; б) $0,2^x = 3$; в) $4^x = \frac{1}{3}$; г) $0,3^x = 0,1$.


16. Устно найдите два значения, удовлетворяющие уравнению: $2^x = x^2$

При помощи графика найдите количество корней уравнения.

17. В одной системе координат постройте графики функций $y = 2^x$ и $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ и покажите относительно какой оси они симметричны. Обобщите полученный результат.

Прикладные задания

Мария Кюри. При радиоактивном распаде вещество делится на несколько частиц (например: электроны, нейтрино, альфа-частицы, фотоны). Радиоактивное вещество, при делении атомов за определённый промежуток времени, теряет половину своей массы. Этот промежуток остаётся неизменным и называется периодом (промежутком) полураспада. В 1898 году Мария Кюри открыла вещества, обладающие высокой радиоактивностью - радий и полоний. За это открытие она была удостоена Нобелевской премии. Изотоп радия называется Radium 226 имеет период полураспада 1620 лет. Продуктом полураспада радия 226 является радон 222.



Закон радиоактивного распада: $m = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$

m_0 - первоначальное количество вещества,

T - период полураспада вещества,

m - количество вещества в момент t , здесь t - время не может принимать отрицательных значений.

Пример. Промежуток полураспада радия (Ra-225) 15 дней. Зависимость массы (грамм) вещества от времени (за каждые 15 дней), можно смоделировать показательной функцией. График этой функции представлен на рисунке:

а) сколько грамм Ra-225 составляет первоначальное количество вещества? Опишите, письменно, ситуации соответствующие указанным точкам.


б) Запишите область определения и множество значений функции.

в) Запишите зависимость массы вещества от времени в виде функции.

г) Определите приблизительно за сколько времени первоначальное количество вещества Ra-225 уменьшится на $\frac{1}{30}$.

Решение: а) По рисунку видно, что при $t = 0$ график пересекает ось y в точке $(0; 1)$. Т.е. масса первоначального количества вещества равна $m = 1$ г.

б) По графику видно, что область определения функции, то есть значения, которые может принимать t , множество действительных чисел $t \geq 0$. Множество значений функции, то есть значения которые может принимать m , есть множество действительных чисел из промежутка $0 < m \leq 1$. в) Радиоактивное вещество за каждые 15 дней распадается наполовину. Значит основание показательной функции равно $\frac{1}{2}$, показатель же выражен переменной t и показывает сколько раз прошло по 15 дней $m(t) = \left(\frac{1}{2}\right)^t$.



г) Эту информацию можно приблизительно определить по графику или построив таблицу значений. Если первоначальное количество вещества 1 г, то $\frac{1}{30}$ часть приблизительно равна 0,033 г. Отметим эту точку на оси y и проведём горизонтальную прямую, пересекающую график в данной точке. Эта линия пересекает абсциссу графика приблизительно в точке 5. А это значит, что через $5 \cdot 15 = 75$ дней первоначальное количество вещества уменьшится приблизительно на $\frac{1}{30}$ часть.

Обучающие задания

- 18.** Начальная масса радиоактивного вещества Радий - 226 равна 1г. Закон радиоактивного распада задан формулой $m(t) = \left(\frac{1}{2}\right)^{t/1620}$. Здесь m - масса радия (г), t - время (год). Найдите массу данного вещества через:
- а) 1620 лет; б) 3240 лет; в) 4860 лет.
- 19.** Каждая из следующих ситуаций может быть смоделирована, при помощи показательной функции. Какая из ситуаций является экспоненциально возрастающей ($a > 1$), а какая экспоненциально убывающей ($0 < a < 1$)?
- а) Количество бактерий в чашке Петри возрастает в 2 раза за каждый час.
б) Полураспад изотопа Актиния - 225 равен 10 дням.
в) С увеличением глубины на 1 метр, сила света, падающего на поверхность озера уменьшается на 25%.
г) Количество насекомых увеличивается за день в 3 раза.
- 20.** Банковский счёт даёт ежегодную прибыль в размере 2,5%. Сумма денег на счету через n лет вычисляется по формуле $A = P(1+r)^n$. Здесь P - начальная сумма, r - ежегодный прирост (десятичная дробь). Если сумма денег на счету изменяется как $A = P(1,025)^n$, то:
- а) Постройте график соответствующей показательной функции, приняв начальную сумму за 1 манат.
б) По графику сделайте прогноз, через сколько лет начальная сумма вырастет в 3 раза. Зависит ли от начальной суммы трёхкратное увеличение суммы на счету?
в) Финансисты вычисляют время, за которое начальная сумма увеличивается в 2 раза при сложном процентном росте по "правилу 72". Например, чтобы узнать за сколько лет сумма в 100 манат вырастет до 200 манат, надо чтобы произведение количества месяцев и процентной ставки было равно $n \cdot r = 72$.
- В соответствии с данным правилом и по графику определите, через сколько, приблизительно, лет сумма с 1 маната вырастет до 2 манат при ставке 2,5%, и сравните полученные результаты.
- 21.** Постройте графики функций $y = 3x$, $y = x^3$ и $y = 3^x$. Для каждой функции запишите область определения и множество значений и нули функции (если они есть). Сравните значения этих функций при $x = 1; 2; 3; 4$. Значения какой функции растут быстрее?

22. Постройте графики функций.

а) $y = 2 \cdot 3^x$

б) $y = 5 \cdot 2^x$

в) $y = 0,5 \cdot 4^x$

г) $y = -\left(\frac{1}{5}\right)^x$

23. Какими преобразованиями график функции $g(x)$ получается из графика функции $f(x)$?

а) $f(x) = 4^x$ в) $g(x) = 4^{x+1}$

б) $f(x) = -2^x$ в) $g(x) = 5 - 2^x$

24. Постройте графики функций $y = 4^x$, $y = 4^{x+2}$, $y = 4^{x-3}$. Выскажите своё мнение об области определения, множестве значений и асимптотах данных функций.

25. Функцию $y = 10^x$ можно записать в виде $y = (2 \cdot 5)^x$. Постройте и сравните графики данной функции и функции $y = 2 \cdot 5^x$.

26. Запишите следующие функции в виде $y = l \cdot a^x$.

а) $y = 4^{x+1}$

б) $y = 5 \cdot \sqrt{9^{x-1}}$

27. График функции $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ параллельно переносится по вертикали и при этом он проходит через точку $(1; -2)$.

а) Запишите формулу, соответствующую полученному графику.

б) Постройте графики.

28. а) Добавьте в таблице столбец для значений функции $y = -2 \cdot 3^{x-4} - 3$ и постройте её график.

б) Какими преобразованиями график функции $y = -2 \cdot 3^{x-4} - 3$ получается из графика функции $y = 3^x$?

$y = 3^x$	$y = 2 \cdot 3^x$	$y = 2 \cdot 3^{x-4}$
$(-1; \frac{1}{3})$	$(-1; \frac{2}{3})$	$(3; \frac{2}{3})$
$(0; 1)$	$(0; 2)$	$(4; 2)$
$(1; 3)$	$(1; 6)$	$(5; 6)$
$(2; 9)$	$(2; 18)$	$(6; 18)$
$(3; 27)$	$(3; 54)$	$(7; 54)$

в) Покажите область определения и множество значений функций $y = 3^x$ и $y = -2 \cdot 3^{x-4} - 3$.

29. Графики следующих функций постройте при помощи параллельного переноса графика показательной функции $f(x) = l \cdot a^x$. Для каждого случая запишите вектор, на который произведён параллельный перенос.

а) $y = 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$

б) $y = \frac{1}{3} \cdot 3^{x+2}$

в) $y = 2 \cdot 2^{x-2}$







г) $y = -3 \cdot 3^{x+2} - 2$

д) $y = 4 \cdot 2^{x-3} + 1$

е) $y = 4 \cdot 2^{x-3} - 4$

30. Установите соответствие между графиком и функцией.

- 1) $y = 2 \cdot 5^x$
- 2) $y = 3 \cdot 4^x$
- 3) $y = -2 \cdot 5^x$
- 4) $y = \frac{1}{3} \cdot 4^x$
- 5) $y = 3^{x-2}$
- 6) $y = 3^x - 2$



31. Определите, является ли функция экспоненциально возрастающей или убывающей.

а) $y = 10 \cdot 3,5^x$

б) $y = 2 \cdot 4^x$

в) $y = 0,4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^x$

г) $y = 3 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^x$

д) $y = 30^{-x}$

е) $y = 0,2 \cdot 5^{-x}$

32. Найдите область определения и множество значений следующих функций.

а) $y = 3^x + 2$

б) $y = 2^x - 3$

в) $y = 2^{x^2+1}$

г) $y = \frac{1}{3} \cdot 2^x - 2$

д) $y = 3 \cdot 3^{x-1} + 3$

е) $y = 2^{|x|-1}$

33. В реальной жизни, при ежегодном увеличении величины на постоянный процент, её состояние через t лет можно оценить формулой $y = a(1+r)^t$, при уменьшении - формулой $y = a(1-r)^t$. Здесь a - начальное количество, r - процент увеличения (уменьшения) (десятичная дробь), t - количество лет. При помощи данных формул решите следующие задания.

Пример. Цена автомобиля купленного за 24 000 манат ежегодно снижается на 12%. Запишем зависимость между количеством лет (t) эксплуатации автомобиля и его ценой.

Решение. В формуле $y = a(1-r)^t$ примем $a = 24000$, $r = 12\% = 0,12$, $1-r = 0,88$. Тогда данную ситуацию можно смоделировать показательной функцией $y = 24000 \cdot (0,88)^t$.

а) В 1993 количество пользователей Интернетом составляло 1 313 000. В течение 10 лет их количество увеличилось на 100%. Запишите показательную функцию, показывающую количество пользователей через t лет. Найдите сколько пользователей Интернетом будет через 5 лет? Сколько людей пользовалось Интернетом в 2000 году?

б) Сумма в 1000 манат внесена в банк под сложную процентную ставку в размере 8%. Какая сумма будет на банковском счёте через 6 лет?

в) Организм человека освобождается от кофеина за час на 12%. Задайте формулой показательную функцию выражающую количество кофеина оставшегося в организме человека, если он выпил кофе, содержащий 120 мг кофеина.

Исследование. Число e .

Представьте, что вы вложили в банк 1 манат, под сложные проценты с процентной ставкой равной 100%. В течение года вы произвели вычислений n раз, подставив в формулу сложного процентного роста следующие данные $S_0 = 1$, $r = 100\% = 1$, $t = 1$.


$$S = S_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot 1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Вычислите значения функции и установите, к какому числу приближается значение функции $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ при различных значениях n .

Условие вычисления	n	$S(n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	Сумма (n)
Годовой	1	$S(n) = \left(1 + \frac{1}{1}\right)^1$	2
Полугодовой	2	$S(n) = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2$	2,25
Квартальный	4	$S(n) = \left(1 + \frac{1}{4}\right)^4$	2,4414
Ежемесячно	12	$S(n) = \left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12}$	2,4883
Ежедневно	365	$S(n) = \left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365}$	2,7048
Почасовой	8760	$S(n) = \left(1 + \frac{1}{8760}\right)^{8760}$	2,7146

Как видно, если банк будет чаще вычислять процент для вложенной суммы, то прибыль увеличится. Однако, отношение ежедневных вычислений к ежемесячным даёт прибыль 10 гяпик. Если даже банк будет находить процент для денег на счету ежесекундно, то и в данном случае разница между начислением процентов ежечасно или ежедневно будет незначительна.

Из графика функции $S(n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, построенного при помощи графкалькулятора видно, что при $n \rightarrow \infty$ функция $S(n)$ имеет горизонтальную асимптоту.

**Число e**


Исследование показывает, что при увеличении значений n значение выражения $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ приближается к определенному числу. Это число записывается буквой e и имеет значение $e = 2,718\ 281\ 828\ 459\dots$. Число e , так же как и число π является иррациональным числом. Эти числа называются **трансцендентными числами**. Трансцендентным называется число, которое не является корнем многочлена степени n с целыми коэффициентами.

Экспоненциальное возрастание или убывание по основанию e задаётся формулой $N = N_0 e^{kt}$. Здесь N_0 - начальное значение, t - время. k - постоянное число.

График функции $y = e^x$

Для построения графика функции $y = e^x$ можно использовать различные граф калькуляторы (www.geogebra.org).

Функция $y = e^x$ называется экспонентой.



Обучающие задания

34. Найдите значения выражений. Используйте кнопку e^x калькулятора.

а) e^{-2}

б) $e^{-0,23}$

в) e^0

35. При помощи графкалькулятора постройте график функции $y = e^x$. Изобразите, схематично, графики следующих функций при помощи преобразования графика функции $y = e^x$.

а) $y = 2 \cdot e^{2x}$

б) $y = e^{-x}$

в) $y = 3e^{-x}$

36. Вещество DDT ($C_{14}H_9Cl_5$) было впервые изобретено шведским учёным Паулем Мюллером, за что ему была присвоена Нобелевская премия. При помощи DDT, обрабатывая окрестности лекарственными пестицидами в послевоенный период, были уничтожены такие болезни как тиф и малярия. Однако, исследования показывают, что данное вещество оказывает негативное действие на организм человека.

Если в 1973 году было использовано 1×10^9 кг DDT для дезинфекции определённых площадей, при $k = -0,023$:

а) запишите формулу, показывающую остаток данного вещества в заданный год в виде $N = N_0 e^{kt}$;

б) какой остаток вещества сохранится в 2020? Используйте калькулятор.

37. При проведении опыта было установлено, что количество бактерий N в банке через время t часов, можно посчитать по формуле $N = 100 e^{0,69t}$. Найдите:

а) сколько бактерий было в банке изначально;

б) сколько бактерий будет в банке через 5 часов?

38. Сумма в размере 5000 манат была положена на счёт в банк под сложный процент с процентной ставкой равной 12% в год на 25 лет. Вычислите прибыль, при непрерывном подсчёте по формуле $S = S_0 e^{rt}$ и прибыль при подсчёте по формуле $S = S_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$ 2 раза в год ($n = 2$). При каком подсчёте прибыль получается больше и насколько?

Исследование


1) Запишите вместо x такие числа, чтобы равенства были верными.

а) $2^x = 16$

б) $3^x = 9$

в) $4^x = 64$

2) При каких значениях аргумента функция $y = 2^x$ получает значение равное 6? Является ли это значение x единственным?



3) Между какими двумя целыми числами находятся значения x удовлетворяющие равенствам?

а) $2^x = 24$

б) $3^x = 18$


в) $4^x = 56$

Логарифм

Логарифмом по основанию $a > 0$ числа $b > 0$, называется такое число, что при возведении числа a в эту степень получится число b . Это записывается так $y = \log_a b$. Здесь, при $a \neq 1$ числа a и b положительные действительные числа.

Запись $y = \log_a x$ является логарифмической записью равенства $a^y = x$ и наоборот запись $a^y = x$ является показательной формой записи для равенства $y = \log_a x$.

То есть записи $a^y = x$ и $y = \log_a x$ эквивалентны.



- $\log_a 1 = 0$, так как $a^0 = 1$
- $\log_a a^y = y$, так как $a^y = a^y$
- $\log_a a = 1$, так как $a^1 = a$.
- $a^{\log_a x} = x$, так как $\log_a x = \log_a x$

Равенство $a^{\log_a x} = x$ называется основным логарифмическим тождеством. Здесь, $x > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$

Пример 1. Заменяем логарифмическую запись показательной.

а) $\log_2 16 = 4$

б) $\log_{10} \frac{1}{1000} = -3$

в) $\log_8 1 = 0$

Решение: логарифмическая форма записи: показательная форма записи:

а) $\log_2 16 = 4$

$2^4 = 16$

б) $\log_{10} \frac{1}{1000} = -3$

$10^{-3} = \frac{1}{1000}$

в) $\log_8 1 = 0$

$8^0 = 1$

Пример 2. Найдём значение логарифмического выражения.

а) $\log_3 27$

б) $\log_a a$

в) $\log_5 \sqrt[4]{5}$

Решение:

Обозначим $\log_3 27 = x$

$\log_a a = x$

$\log_5 \sqrt[4]{5} = x$

$3^x = 27$ показательная форма

$a^x = a$

$5^x = \sqrt[4]{5}$

$3^x = 3^3$, $x = 3$ по свойству степени

$x = 1$

$x = \frac{1}{4}$

Обучающие задания

1. Запишите равенства в эквивалентной логарифмической форме.

а) $3^4 = 81$ б) $8^{1/3} = 2$ в) $0,5^{-2} = 4$ г) $b^x = x$
 д) $e^x = y$ е) $(\frac{1}{3})^{-2} = 9$ ж) $(\frac{5}{2})^{-1} = \frac{2}{5}$ з) $8^{-2} = \frac{1}{64}$

2. Запишите равенства в эквивалентной показательной форме.

а) $\log_5 625 = 4$ б) $\log_{125} 25 = \frac{2}{3}$ в) $\lg(0,0001) = -4$ г) $\log_{25}(\frac{1}{5}) = -\frac{1}{2}$
 д) $\log_b 15 = x$ е) $\log_b 82 = y$ ж) $\log_3 5 = x$ з) $\log_2 7 = x$

Логарифм чисел по основанию 10 и e соответственно обозначаются как \lg и \ln . Логарифм по основанию 10 называется десятичным логарифмом, по основанию e - натуральным логарифмом.

$\log_{10} 0,001 \Rightarrow \lg 0,001$

$\log_e c \Rightarrow \ln c$

При вычислении логарифмов можно пользоваться калькулятором.

3. Вычислите.

а) $\lg 0,001$ б) $\lg(6,3 \cdot 10^5)$ в) $\lg 0,00025$ г) $\ln(e^3)$ д) $\ln 8$

4. Не пользуясь калькулятором, найдите значение выражений.

а) $\log_7 49$ б) $\log_3 27$ в) $\lg 0,1$ г) $\log_2 \frac{1}{16}$
 д) $\log_{16} 4$ е) $\log_8 2$ ж) $\log_{\frac{7}{2}} 1$ з) $\log_{0,5} 2$
 и) $\log_3 3^5$ к) $\log_9 9^3$ л) $\lg 10$ м) $\log_7 1$

5. 1) На примерах объясните, невозможность существования логарифмов с основаниями 0;1 или отрицательным числом в основании.

2) Имеют ли смысл выражения?

а) $\log_{-3} 9$; б) $\lg(-10)$; в) $\log_1 3$; г) $\ln 7$; д) $\log_3 16$.

6. Вместо a и b запишите последовательные целые числа, чтобы неравенство было верным.

а) $a < \log_2 48 < b$ б) $a < \log_3 100 < b$ в) $a < \log_5 90 < b$

7. Найдите значение выражений при помощи основного логарифмического тождества.

а) $2^{\log_2 8}$ б) $10^{\lg 2}$; в) $3^{1 + \log_3 2}$; г) $10^{2 - \lg 4}$;
 д) $2^{3 \log_2 5}$; е) $5^{2 \log_5 3}$; ж) $4^{\log_2 3}$; з) $16^{\log_4 7}$;

8. Вычислите.

а) $(1 + 3^{\log_3 5})^{\log_6 2}$; б) $49^{1 - \frac{1}{2} \log_7 3}$; в) $(7 - 5^{\log_5 3})^{1 + \log_2 3}$.


9. Найдите неизвестное в равенстве

а) $\log_2 x = -1$ б) $\log_{\frac{1}{4}} x = -2$ в) $\log_x 25 = 2$ г) $\log_x \frac{1}{4} = -2$

Исследование. Постройте в тетради таблицу значений и график функций $f(x) = 3^x$ обратной ей функции $f^{-1}(x)$. Запишите своё мнение о полученных функциях.


$f(x) = 3^x$	
x	y
-3	$\frac{1}{27}$
-2	$\frac{1}{9}$
-1	$\frac{1}{3}$
0	1
1	3
2	9
3	27

$f^{-1}(x)$	
x	y
$\frac{1}{27}$	-3
$\frac{1}{9}$	-2
$\frac{1}{3}$	-1
1	0
3	1
9	2
27	3



Логарифмическая функция

Каждое свое значение функция $y = a^x$ принимает в единственной точке области определения т.е. для функции $y = a^x$ существует обратная функция $x = \log_a y$.



Значит, если график функции $y = a^x$ отразить симметрично относительно прямой $y = x$, то получим график функции $y = \log_a x$.

- 1) Область определения логарифмической функции: все положительные числа $D(\log_a x) = (0; +\infty)$
- 2) Множество значений логарифмической функции: множество всех действительных чисел: $E(\log_a x) = (-\infty; +\infty)$
- 3) При $a > 1$ логарифмическая функция является возрастающей, при $0 < a < 1$ убывающей.
- 4) График функции $y = \log_a x$ пересекает ось абсцисс в точке $(1; 0)$.

В качестве примера для $a > 1$ на рисунке даны графики функций $y = \log_2 x$, $y = \ln x$, $y = \log_5 x$.



Постройте графики в тетради.

Если $a > 1$, то при $0 < x < 1$ логарифмическая функция принимает отрицательные значения, при $x > 1$ принимает положительные значения.

В качестве примера для $0 < a < 1$ на рисунке даны графики функций $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, $y = \log_{\frac{1}{3}} x$, $y = \log_{\frac{1}{5}} x$.

Постройте графики в тетради.

Если $0 < a < 1$, то при $0 < x < 1$ логарифмическая функция принимает положительные значения, при $x > 1$ принимает отрицательные значения.




Обучающие задания

1. В одной системе координат постройте графики функций $y = a^x$ и $y = \log_a x$ для следующих значений a .
 а) $a = 2$ б) $a = 3$ в) $a = 4$ г) $a = \frac{1}{2}$ д) $a = \frac{1}{3}$
2. С помощью каких симметричных преобразований из графика функции $y = \log_2 x$ можно получить график функции $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. Объясните, построив графики функций в одной системе координат.
3. Для следующих функций запишите формулы обратных функций. Постройте графики заданных и обратных функций. Для обратной функции определите: • области определений и значений; • уравнение асимптоты; • координаты точек пересечения с осями координат.
 а) $y = 5^x$ б) $y = \log_{\frac{1}{4}} x$
4. График функции $y = \log_3 (x + 9) + 2$ получается из графика функции $y = \log_3 x$ параллельным переносом на вектор $\langle -9; 2 \rangle$. Из графика какой функции и при помощи какого смещения получаются графики следующих функций?
 а) $y = \log_2 x + 3$ б) $y = \log_2 (x + 3)$ в) $y = \log_3 (x - 3) - 4$
5. Возрастают или убывают следующие функции?
 а) $y = \log_5 x$ б) $y = \log_{\frac{1}{3}} x$
6. Сравните:
 а) $\log_2 5$ и $\log_2 7$ б) $\log_{\frac{1}{2}} 5$ и $\log_{\frac{1}{2}} 3$ в) $\log_2 3$ и $\log_5 4$
7. Точка $(\frac{1}{8}; -3)$ принадлежит графику функции $f(x) = \log_a x$, точка $(4; k)$ принадлежит графику обратной функции $f^{-1}(x)$. Найдите значение k .
8. Определите знак числа: а) $\log_5 2$; б) $\log_{0,2} \sqrt{3}$; в) $\log_3 0,2$; г) $\log_{0,4} 0,6$

9. Логарифмическая спираль получается при повороте точки $P(1; 0)$ в направлении против часовой стрелки на угол φ радиан. В это время расстояние от точки P до начала координат r определяется формулой $r = e^{0,14\varphi}$.



- а) Найдите расстояние от точки P до начала координат при повороте на угол 2π . Результат округлите до сотых.
- б) При помощи логарифма запишите зависимость между r и φ .
- в) Найдите значения φ при $r = 12$.



Исследование. 1) Покажите, что $\lg(1000 \cdot 100) \neq (\lg 1000) \cdot (\lg 100)$.
2) Вычислите. Сравните результаты.

а) $\log_2 4 + \log_2 8$ и $\log_2 32$

б) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4} + \log_{\frac{1}{2}} 8$ и $\log_{\frac{1}{2}} 2$

Обобщите в виде правила для $\log_a b + \log_a c$.
 a, b, c положительные действительные числа, $a \neq 1$.

3) Вычислите. Сравните результаты.

а) $\log_3 27 - \log_3 9$ и $\log_3 3$

б) $\log_{\frac{1}{2}} 4 - \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{4}$ и $\log_{\frac{1}{2}} 16$

Обобщите в виде правила для $\log_a b - \log_a c$.
 a, b, c положительные действительные числа, $a \neq 1$.

4) Вычислите. Сравните результаты.

а) $3 \cdot \log_2 4$ и $\log_2 64$

б) $2 \cdot \log_3 \frac{1}{9}$ и $\log_3 \frac{1}{81}$

Обобщите в виде правила для $b \cdot \log_a c$.
 a, c положительные действительные числа, $a \neq 1$.

5) В тетради запишите словами свойства степеней.
Объясните каждое свойство на двух примерах.

- произведение степеней: $c^x \cdot c^y = c^{x+y}$
- отношение степеней: $\frac{c^x}{c^y} = c^{x-y}$, $c \neq 0$
- возведение степени в степень: $(c^x)^y = c^{xy}$

Свойства логарифмов

1. Логарифм произведения: $\log_c xy = \log_c x + \log_c y$

Логарифм произведения двух положительных чисел равен сумме логарифмов множителей. Здесь $c \neq 1$ и $c > 0$, x и y - положительные действительные числа.

2. Логарифм частного: $\log_c \frac{x}{y} = \log_c x - \log_c y$

Логарифм частного двух положительных чисел равен разности логарифмов. Здесь $c \neq 1$ и $c > 0$, x и y - положительные действительные числа.

3. Логарифм степени: $\log_c x^y = y \cdot \log_c x$

Логарифм степени числа равен произведению показателя степени и логарифма этого числа. Здесь $c \neq 1$ и $c > 0$, x - положительное действительное число.

Свойство 1. $\log_c xy = \log_c x + \log_c y$ ($c \neq 1, c > 0, x > 0, y > 0$)

Доказательство свойства 1:

Обозначим $\log_c x = m$ и $\log_c y = n$.

$x = c^m$ и $y = c^n$ *применим экспоненциальную запись*
 $xy = (c^m) \cdot (c^n)$ *найдем произведение чисел x и y*
 $xy = c^{m+n}$ *применим свойство произведения степеней*
 $\log_c xy = m + n$ *применим логарифмическую запись*
 $\log_c xy = \log_c x + \log_c y$ *учтём значения m и n*

Свойство 2. $\log_c \frac{x}{y} = \log_c x - \log_c y$ ($c \neq 1, c > 0, x > 0, y > 0$)

Доказательство свойства 2:

Обозначим $\log_c x = m$ и $\log_c y = n$.

$x = c^m$ и $y = c^n$ *по определению*
 $\frac{x}{y} = \frac{c^m}{c^n}$ *найдем частное чисел x и y*
 $\frac{x}{y} = c^{m-n}$ *применим свойство частного степеней*
 $\log_c \frac{x}{y} = m - n$ *применим логарифмическую запись*
 $\log_c \frac{x}{y} = \log_c x - \log_c y$ *учтём значения m и n*

Свойство 3. $\log_c x^y = y \log_c x$ ($c \neq 1, c > 0, x > 0$)

Доказательство свойства 3:

Обозначим $\log_c x = m$.

$x = c^m$ *по определению \log*
 $x^y = (c^m)^y$ *применим свойство равенства*
 $x^y = c^{my}$ *применим свойство возведения степени в степень*
 $\log_c x^y = m y$ *по определению*
 $\log_c x^y = (\log_c x) \cdot y$ *учтём значение m*
 $\log_c x^y = y \cdot \log_c x$ *применим переместительное свойство умножения*

Обучающие задания

1. Вычислите значения выражений, при помощи свойств логарифмов.

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| а) $\log_2 (64 \cdot 32)$ | б) $\log_3 \frac{0,3}{81}$ | в) $\log_5 (125 \cdot 625)$ |
| г) $\log_6 3 + \log_6 12$ | д) $\lg 2 + \lg 5$ | е) $\log_{0,5} 6,4 + \log_{0,5} 10$ |
| ж) $\log_2 48 - \log_2 3$ | з) $\log_{\frac{1}{3}} 18 - \log_{\frac{1}{3}} 2$ | и) $\lg 0,25 - \lg 25$ |

$$\begin{array}{llll} \text{к) } \log_2 \sqrt[4]{8} & \text{л) } \log_3 (9 \cdot 27) & \text{м) } \lg \sqrt{10^3} & \text{н) } \log_{0,5} \sqrt[4]{8} \\ \text{о) } \frac{\log_5 8}{\log_5 32} & \text{п) } \frac{\log_3 125}{\log_3 25} & \text{р) } \frac{\log_7 6}{\log_7 2 + \log_7 18} & \text{с) } \frac{\lg 2 + \lg 5}{\lg 13 - \lg 130} \end{array}$$

- 2.** Используя свойства логарифмов, запишите данные выражения через логарифмы положительных чисел x , y и z .

Пример 1. $\log_4 xy\sqrt{z} = \log_4 x + \log_4 y + \log_4(z)^{\frac{1}{2}} = \log_4 x + \log_4 y + \frac{1}{2}\log_4 z$

$$\begin{array}{llll} \text{а) } \log_6 \frac{x}{y} & \text{б) } \log_5 \sqrt{xy} & \text{в) } \log_3 \frac{9}{\sqrt{x^2}} & \text{г) } \log_7 \frac{x^5 y}{\sqrt{z}} \end{array}$$

- 3.** Используя свойства логарифмов запишите в виде логарифма какого-либо числа вида $\log_a N$.

Пример 2.

$$\log_5 6 + \log_5 10 - \log_5 2 = \log_5 \frac{6 \cdot 10}{2} = \log_5 30$$

$$\begin{array}{lll} \text{а) } \log_2 3 + \log_2 5 & \text{б) } \log_3 16 - \log_3 2 & \text{в) } 3 \cdot \log_5 4 \\ \text{г) } 2 \lg 3 - 3 \lg 2 & \text{д) } \lg 216 - \lg 36 & \text{е) } \lg 16 + \lg 4 \\ \text{ж) } 5 \log_3 2 + 2 \log_3 5 & \text{з) } \lg 12 - 2 \lg 2 + \lg 3 & \text{и) } 3 \log_2 3 + 2 \log_2 5 - \log_2 6 \end{array}$$

- 4.** Запишите в виде логарифма следующие выражения, зная, что переменные могут принимать только положительные значения.

Пример 3. $5 + \log_2 x = \log_2 2^5 + \log_2 x = \log_2 32 + \log_2 x = \log_2 32x$

$$\begin{array}{ll} \text{а) } \log_x x + \log_x 10 & \text{б) } \log_2 a + \log_2 b \\ \text{в) } \log_2 x - 5 \log_2 x & \text{г) } \frac{1}{2} \log_3 x + 3 \log_3 y \\ \text{д) } \frac{1}{2} \lg x + 3 \lg y & \text{е) } \frac{2}{3} \log_5 x + 4 \log_5 y - 3 \log_5 z \\ \text{ж) } \ln x + 2 \ln y - 2 \ln z & \text{з) } \log_7 x^2 + \log_7 x - 5 \log_7 x \end{array}$$

- 5.** Упростите, при всех допустимых значениях переменных.

$$\begin{array}{ll} \text{а) } \log_2(x^2 - 9) - \log_2(2x - 6) & \text{б) } \log_5(x - 1) - \log_5(x^2 + 2x - 3) \end{array}$$

- 6.** Зная, что $\log_5 2 = a$ и $\log_5 3 = b$, выразите через a и b следующие логарифмы:

$$\begin{array}{llll} \text{а) } \log_5 6; & \text{б) } \log_5 12; & \text{в) } \log_5 15; & \text{г) } \log_5 30. \end{array}$$

7. Найдите значение выражения $\lg \frac{a^2 \cdot \sqrt[3]{b}}{c}$ при $\lg a = 3$, $\lg b = 12$, $\lg c = 8$.

8. 1) Найдите значение выражения:

а) 3^k , если $k = \log_2 40 - \log_2 5$;

б) 7^n , если $n = 3 \log_8 4$

2) Упростите:

а) $e^{\ln 10x^2 - \ln 2x}$

б) $3^{2 \log_3 x - \log_3 2x}$

9. Если $\lg 5 \approx 0,699$ и $\lg 15 \approx 1,176$, найдите значения следующих выражений

а) $\lg 3$

б) $\lg 75$

в) $\lg 12$

г) $\lg 45$

Переход к новому основанию

По основному логарифмическому тождеству и свойству степени логарифма имеем: $\log_c b = \log_c (a^{\log_a b}) = \log_a b \cdot \log_c a$ ($a \neq 1$, $c \neq 1$, $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$)

Отсюда: $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ В частном случае при $c = b$, $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

На многих калькуляторах существуют кнопки для вычисления только десятичного логарифма (\lg) и натурального логарифма (\ln). Поэтому возникает необходимость представлять логарифмы в виде десятичных и натуральных логарифмов.

$$\log_a b = \frac{\lg b}{\lg a} \qquad \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$$

Пример 1. Запишите в виде : а) десятичного; б) натурального логарифма и вычислите.

$$\log_3 7 = \frac{\lg 7}{\lg 3} \approx \frac{0,845}{0,477} \approx 1,771 \qquad \log_3 7 = \frac{\ln 7}{\ln 3} \approx \frac{1,946}{1,099} \approx 1,771$$

10. Вычислите, приведя к десятичному или натуральному логарифму.

$\log_5 7$

$\log_7 12$

$\log_3 16$

$\log_9 25$

$\log_6 24$

$\log_2 5$

$\log_5 9$

$\log_3 17$

$\log_5 32$

$\log_4 19$

11. 1) При помощи формулы перехода к новому основанию, покажите:

$$\log_{a^q} b^p = \frac{p}{q} \cdot \log_a b$$

2) Вычислите.

а) $\log_{\sqrt{2}} \frac{1}{4}$

б) $\log_{\sqrt{3}} 9^{-1}$

в) $\log_{\sqrt{3}} 18 - \log_3 4$

г) $\log_{\sqrt{2}} 12 - \log_2 9$


д) $\log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4$

е) $\log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7 \cdot \log_9 8$


ж) $\frac{1}{\log_{12} 6} + \frac{1}{\log_3 6}$

з) $\frac{1}{\log_{36} 3} - \frac{2}{\log_{54} 3}$

1. **Химия - экология.** Показатель рН-мера активности ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность. Для вычисления уровня рН в растворах используется формула: $\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$. Здесь, H^+ концентрация ионов в *мол/л*. Из формулы следует, что при увеличении показателя рН на 1 единицу, концентрация ионов в растворе увеличивается в 10 раз. По шкале рН значения показателя рН изменяются от 0 до 14. Если рН равно 7, то раствор считается нейтральным, меньше 7 -кислым, больше 7 - щелочным.



а) Уровень рН в нормальной дождевой воде равен 5,6. Однако в результате загрязнения экологии во многих местах идут дожди с повышенной кислотностью. Если в дождевой воде уровень



$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$$

концентрация уровня ионов водорода будет 0,0002 *мол/л*, то вычислите значение показателя рН.

б) Определите концентрацию $[\text{H}^+]$ в воде, если показатель рН равен 5,6.

2. **Физика. Звуковые волны.** Громкость звука измеряется в децибелах и вычисляется по формуле $L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$. Здесь I - интенсивность звука (ватт/м^2), I_0 - наименьшая интенсивность звука, которую различает человеческое ухо (принято 10^{-12} ватт/м^2). Человеческое ухо может различать звуки в очень большом диапазоне от 0 dB (тишина) до 180 dB.

а) Интенсивность звука радио в 4000 раз больше наименьшего значения интенсивности звука, различаемого человеческим ухом. Сколько децибел составляет громкость звука радио?

б) Таир утверждает, что громкость звука интенсивностью в $4 \cdot 10^{-8}$ ватт/м^2 в 2 раза выше громкости звука интенсивностью $2 \cdot 10^{-8}$ ватт/м^2 . Как вы думаете, прав ли Таир?

3. Землетрясение. В 1935 году американский сейсмолог Чарлз Рихтер вывел формулу $M = \lg \frac{A}{A_0}$ и создал логарифмическую шкалу определения силы землетрясения (она называется шкалой Рихтера). Здесь M - сила землетрясения (в баллах), A - максимальная амплитуда волны (в микронах, 1 микрон = 10^{-6} м), зарегистрированная на сейсмографе, A_0 - амплитуда самой маленькой сейсмической волны зарегистрированной сейсмографом (её называют “нулём землетрясения”). Формулу $M = \lg \frac{A}{A_0}$ можно записать иначе, как $A = A_0 10^M$. Таким образом, по шкале Рихтера амплитуда сейсмической волны в 4 балла в 10 раз больше амплитуды сейсмической волны в 3 балла.

а) Сколько баллов, по шкале Рихтера составила сила землетрясения, если максимальное значение амплитуды (A) в $10^{7,1}$ раз больше значения A_0 ?

б) Во сколько раз амплитуда землетрясения силой в 4,7 балла больше амплитуды землетрясения силой 4 балла?

в) В 1906 году в Сан Франциско произошло землетрясение силой 8,3 баллов по шкале Рихтера. В тот же год на границе Эквадора с Колумбией произошло землетрясение, амплитуда которого была в 4 раза больше. Определите силу землетрясения по шкале Рихтера на границе Эквадора с Колумбией.

г) 28 июля 1976 года в результате сильнейшего землетрясения в Китае с силой 8 баллов по шкале Рихтера погибло 240000 человек, в 1990 году землетрясение в Иране с силой 7,4 балла по шкале Рихтера унесло жизни 50000 человек. Сравните амплитуды этих землетрясений.

4. Пусть, сумма денег на счету в размере 1000 манат изменяется в экспоненциальной зависимости. За 7 лет сумма увеличилась в 2 раза. Вычислить сумму через t лет можно по формуле $A(t) = 1000 \cdot 2^{\frac{t}{7}}$. Здесь t количество лет, $A(t)$ - сумма на счету.

а) Сколько манат будет на счету через 5 лет; 10 лет?

б) Найдите значения $A(0)$ и $A(8)$ и опишите соответствующую реальную ситуацию.

5. Биология. Биологи по длине (l) следа слона, могут, приблизительно, определить его возраст (a). Для этого они используют формулу $l = 45 - 25,7e^{-0,099a}$. Найдите возраст слона, если длина следа равна а) 28 см; б) 36 см.



Показательные уравнения

Свойство показательной функции. При условии, что $a \neq 1$, $a > 0$ равенство $a^x = a^y$ справедливо тогда и только тогда, если $x = y$.

По данному свойству получаем:

1) показательное уравнение $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ равносильно уравнению $f(x) = g(x)$.

2) Если в уравнении $a^x = c$ при $c > 0$ запишем $a^x = a^{\log_a c}$, то $x = \log_a c$.

Заданные показательные уравнения, при помощи определённых методов, приводятся к простейшим показательным уравнениям.

1. Применение свойств степени.

Пример 1. $4^{2x} = 8^{2x-1}$

заданное уравнение

$$(2^2)^{2x} = (2^3)^{2x-1}$$

приведем к одинаковому основанию

$$2^{4x} = 2^{6x-3}$$

применим свойство возведение степени в степень

$$4x = 6x - 3$$

приведём к равносильным уравнениям

$$2x = 3; \quad x = 1,5$$

решение уравнения

Проверка: $4^{2 \cdot 1,5} = 8^{2 \cdot 1,5 - 1}$

$$4^3 = 8^2; \quad 64 = 64$$

Пример 2. $2 \cdot 3^{x+1} - 3^x = 45$

заданное уравнение

$$2 \cdot 3^x \cdot 3 - 3^x = 45$$

применим свойство степени

$$3^x(6 - 1) = 45$$

вынесем общий множитель за скобку

$$3^x = 9$$

упростим

$$x = 2$$

решение уравнение

2. Уравнения с разными основаниями можно решить разделив обе стороны на одну из степеней или логарифмированием обеих частей.

Пример 3.

Пример 4.

$$3^{2x} = 5^x$$

$$2^{x-1} = 3^x$$

заданное уравнение

заданное уравнение запишем следующим образом $(3^2)^x = 5^x$,

$$\lg 2^{x-1} = \lg 3^x$$

прологарифмируем обе стороны

$$(x-1) \cdot \lg 2 = x \lg 3$$

по свойству степени логарифма

$$x \cdot \lg 2 - \lg 2 = x \lg 3$$

распределительный закон умножения

$$9^x = 5^x$$

$$x \cdot \lg 2 - x \cdot \lg 3 = \lg 2$$

сгруппируем подобные члены

и разделим обе части на 5^x . Получим:

$$x(\lg 2 - \lg 3) = \lg 2$$

вынесем общий множитель за скобки

$$\left(\frac{9}{5}\right)^x = 1$$

$$x = \frac{\lg 2}{\lg 2 - \lg 3}$$

решение уравнения

Отсюда $x = 0$

$$x \approx -1,7095$$

приближённый корень уравнения

3. Введение новой переменной

Пример 5. $9^x - 2 \cdot 3^{x+1} - 27 = 0$	<i>заданное уравнение</i>	Проверка:
$3^{2x} - 2 \cdot 3^x \cdot 3 - 27 = 0$		$9^2 - 2 \cdot 3^{2+1} - 27 = 0$
$(3^x)^2 - 6 \cdot 3^x - 27 = 0$	<i>применим свойство степени</i>	$81 - 54 - 27 = 0$
$3^x = y$	<i>введём новую переменную</i>	$0 = 0$
$y^2 - 6y - 27 = 0$	<i>приведём к квадратному уравнению</i>	
$(y - 9)(y + 3) = 0$	<i>решим квадратное уравнение</i>	
$y = 9; y = -3$		
$3^x = 9 \quad 3^x = -3$	<i>выполним обратную подстановку</i>	
$x = 2 \quad \emptyset$		Ответ: $x = 2$

Если уравнение состоит из членов, которые имеют одинаковую степень, а основания являются последовательными членами геометрической прогрессии, то обе части уравнения делятся на один из крайних членов, и вводится новая переменная.

Пример 6. $3 \cdot 4^x + 2 \cdot 9^x - 5 \cdot 6^x = 0$	<i>разделим каждую сторону на 4^x</i>
$3 + 2 \cdot \left(\frac{9}{4}\right)^x - 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x = 0$	
$3 + 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{2x} - 5 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^x = 0$	<i>выполним замену $\left(\frac{3}{2}\right)^x = y$</i>
$2y^2 - 5y + 3 = 0$	<i>приведём к квадратному уравнению</i>
$y = 1 \quad y = \frac{3}{2}$	<i>решим квадратное уравнение</i>
$\left(\frac{3}{2}\right)^x = 1 \quad \left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{3}{2}$	<i>выполним обратную подстановку</i>
$x = 0 \quad x = 1$	<i>получим решение уравнения</i>

Обучающие задания

1. Применив свойство степени, решите следующие уравнения.

а) $25^x = 125$	б) $9^{x+1} = 27$	в) $\left(\frac{1}{4}\right)^x = 8$
г) $5^{x^2-2x-1} = 25$	д) $0,5^{x^2} \cdot 2^{x-4} = 8^{-2}$	е) $3^{2x} \cdot 2^x = 324$
ж) $2 \cdot 3^{x+1} - 3^x = 45$	з) $4^{x+2} + 4^{x+1} = 320$	и) $3^{x+1} - 4 \cdot 3^{x-2} = 69$

2. Решите уравнения.

1) $4^{3x} = 8^{x-3}$	2) $27^x = 9^{x-2}$	3) $125^{2x-1} = 25^{x+4}$
4) $16^{2x-3} = 32^{x+3}$	5) $2^{4x} = 4^{x+3}$	6) $3^{x+1} = 9^{x-1}$
7) $25^{x-1} = 5^{3x}$	8) $36^{3x-1} = 6^{2x+5}$	9) $3^{x-2} = 27$
10) $2^{3x+5} = 128$	11) $5^{x-3} = \frac{1}{25}$	12) $10^{x-1} = 100^{2x-3}$
13) $36^{2x} = 216^{x-1}$	14) $3^{5x} \cdot 81^{1-x} = 9^{x-3}$	15) $49^x = 7^{x^2-15}$
16) $81 \cdot 9^{-2x-2} \cdot 9^x = 27$	17) $9^{-3x} \cdot 9^x = 27$	18) $16^x \cdot 64^{3-3x} = 64$

3. Введя новую переменную, решите следующие уравнения.

а) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$ б) $9^x - 6 \cdot 3^x - 27 = 0$ д) $4^x - 14 \cdot 2^x - 32 = 0$
 в) $4^x - 14 \cdot 2^x - 32 = 0$ г) $4^x - 4^{2-x} = 15$ е) $4^x - 7 \cdot 2^x + 12 = 0$

4. Решите уравнение.

а) $7^{x-3} = 4^{3-x}$ б) $2^{x+4} + 2^{x+2} = 5^{x+1} + 3 \cdot 5^x$ в) $4^x - 3^{x-0,5} = 3^{x+0,5} - 4^{x-0,5}$

5. Разделив каждую сторону на одну из степеней, решите следующие уравнения.

а) $3 \cdot 4^x + 2 \cdot 9^x = 5 \cdot 6^x$ б) $4 \cdot 9^x + 12^x - 3 \cdot 16^x = 0$ в) $2 \cdot 27^x = 3 \cdot 12^x + 18^x$

6. Решите уравнения.

а) $125^x = 5 \cdot 5^3 \cdot 5^5 \cdot \dots \cdot 5^{17}$ б) $2^2 \cdot 2^4 \cdot 2^6 \cdot \dots \cdot 2^{2x} = 0,25^{-10}$

7. Решите уравнения.

а) $2^{x+3} = 4^{3x-5}$ б) $9^{4x-1} = 27^{3x+5}$ в) $4^{3x-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2x}$
 г) $2^x = 7$ д) $10^{x-4} + 4 = 11$ е) $10^x + 10^{x+1} = 11$

8. Решите уравнения.

1) $10^{x-3} = 100^{4x-5}$ 2) $25^{x-1} = 125^{4x}$ 3) $3^{x-7} = 27^{2x}$
 4) $36^{x-9} = 6^{2x}$ 5) $8^{5x} = 16^{3x+4}$ 6) $e^{-x} = 6$
 7) $2^x = 15$ 8) $1,2e^{-5x} + 2,6 = 3$ 9) $4^x - 5 = 3$
 10) $5e^{-x} + 9 = 6$ 11) $10^{2x} + 3 = 8$ 12) $0,25^x - 0,5 = 2$
 13) $\frac{1}{4} \cdot 4^{2x} + 1 = 5$ 14) $\frac{2}{3} \cdot e^{4x} + \frac{1}{3} = 4$ 15) $10^{-12x} + 6 = 100$

9. Зависимость между температурой и временем при охлаждении задаётся формулой Ньютона $T = (T_0 - T_r)e^{-rt} + T_r$, где T - температура в данный момент времени, T_0 - температура в начальный момент времени, T_r - температура окружающей среды (комнатная температура), r - скорость охлаждения (скорость изменения за единицу времени), t - время.

Температура воздуха в комнате 22°C . Температура чая 80°C .

Через 10 минут температура чая стала 60°C .

а) По формуле Ньютона найдите коэффициент r .

б) Через сколько минут температура чая станет 35°C ?

10. Решите уравнения :

а) $9^{\sin^2 x} - 27^{\cos x} = 0$ б) $2^{\sin^2 x} - 2^{\cos^2 x} + 1 = 0$
 в) $|x - 4| \frac{x^2 - 11x + 28}{x - 3} = 1$ г) $(4 + \sqrt{15})^x + (4 - \sqrt{15})^x = 62$

Логарифмические уравнения

Свойство логарифмической функции. Равенство $\log_a x = \log_a y$ справедливо при $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$, тогда и только тогда, если $x = y$.

По данному свойству получаем:

1) Уравнение $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ при условии $f(x) > 0$ и $g(x) > 0$ равносильно уравнению $f(x) = g(x)$. Решив уравнение $f(x) = g(x)$ и найдя его корни, необходимо проверить, удовлетворяют ли они условию $f(x) > 0, g(x) > 0$.

2) Если уравнение $\log_a f(x) = c$ заменить эквивалентному уравнению в экспоненциальной форме получим $f(x) = a^c$.

Решение логарифмических уравнений, после определённых преобразований, сводится к решению простейших логарифмических уравнений.

1) Решение логарифмических уравнений при помощи свойства логарифма.

Пример. $\log_3 x = 2 - \log_3 2$ *заданное уравнение*
 $\log_3 x + \log_3 2 = 2$ *прибавим к каждой части $\log_3 2$*
 $\log_3 (2x) = 2$ *применим свойство логарифма*
 $2x = 3^2$ *запишем в эквивалентной показательной форме*
 $x = 4,5$ *получим решение уравнения*

2) Решение уравнения при помощи введения новой переменной.

Пример. $\log_5^2 x - \log_5 x = 2$ *заданное уравнение*
 $\log_5 x = a$ *выполним замену*
 $a^2 - a - 2 = 0$ *приведём к квадратному уравнению*
 $(a - 2)(a + 1) = 0$ *решим квадратное уравнение*
 $a = 2 \quad a = -1$ *выполним обратную подстановку*
 $\log_5 x = 2 \quad \log_5 x = -1$
 $x = 5^2 \quad x = 5^{-1}$
 $x = 25 \quad x = \frac{1}{5}$

3) Решение уравнений приведением к одинаковому основанию.

Пример. $\log_4 x + \log_2 x = 6$ *заданное уравнение*
 $\log_{2^2} x + \log_2 x = 6$ *приведём логарифмы к одинаковому основанию*
 $\frac{1}{2} \log_2 x + \log_2 x = 6$
 $\frac{3}{2} \log_2 x = 6$ *приведём подобные члены*
 $\log_2 x = 4$
 $x = 2^4$ *запишем в показательной форме*
 $x = 16$ *получим решение уравнения*

Рассмотрим ещё один пример уравнения, решение которого сводится к применению свойства логарифма.

Пример. $\lg(x + 4) + \lg(2x + 3) = \lg(1 - 2x)$

заданное уравнение

$$\lg(x + 4) \cdot (2x + 3) = \lg(1 - 2x)$$

применим свойство логарифма

$$(x + 4) \cdot (2x + 3) = (1 - 2x)$$

приведём к алгебраическому

$$x_1 = -1; x_2 = -5,5$$

уравнению

Проверка.

Выражение стоящее под знаком логарифма должно всегда быть положительным, то есть $x + 4 > 0$, $2x + 3 > 0$, $1 - 2x > 0$.

Значение $-5,5$ не удовлетворяет этому условию, значит оно не является корнем. Значение -1 данному условию удовлетворяет. Ответ: -1

Обучающие задания

1. Решите уравнения.

а) $\log_2 2^3 + \log_2 2^2 = \log_2 x$

б) $\log_2 16 + \log_2 2 = \log_2 x$

в) $\log_3 x - \log_3 9 = \log_3 3$

г) $\log_5 x + \log_5 x = \log_5 625$

д) $\log_x 64 - \log_x 16 = \log_4 16$

е) $\log_2 8 + \log_3 9 = \log_x 32$

2. Решите уравнения.

а) $\log_2(3 - x) = 3$

б) $\log_{\frac{1}{2}}(x - 4) = -1$

в) $\log_{\sqrt{3}}(3x - 5) = 2$

г) $\log_2(x^2 + 4x + 3) = 3$

д) $\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 4x - 1) = -2$

е) $\log_{\sqrt{3}}(x^2 - 5x - 3) = 1$

ж) $\log_4(\log_3(\log_2(x - 1))) = 0$

з) $\log_3(1 + \log_3(2^x - 7)) = 1$

и) $\log_7(4x - 6) = \log_7(2x - 4)$

к) $\ln(x^2 - 2x - 4) = \ln 11$

л) $\log_2(2x^2 - 2) = \log_2(5x - 4)$

3. Применяв свойство логарифма, решите следующие уравнения.

а) $\log_3 x + \log_3(x - 2) = \log_3 8$

б) $\log_6(2x^2 - 7x + 6) - \log_6(x - 2) = \log_6 x$

4. Введя новую переменную решите уравнения.

а) $\log_3^2 x = 4 + 3 \log_3 x$

б) $\log_5^2 x - \log_5 x = 2$

в) $\lg(10x) \cdot \lg(0,1x) = 3$

5. Решите уравнения логарифмированием его обеих частей.

а) $x^{\log_2 x - 2} = 8$

б) $x^{\log_5 x} = 125x^2$

в) $x^{\lg x} = 100x$

6. Решите уравнение графически.

а) $\log_3(x + 2) = 2 - x$

б) $\log_{\frac{1}{2}} x = x - 3$

7. Решите уравнения.

а) $\log_2 x + \log_2 3 = 1$

б) $\log_3 x - \log_3 2 = 2$

в) $\log_3 x + \log_3 2 = 2$

г) $\log_3 x + \log_3(x - 2) = 1$

д) $\log_6 x + \log_6(x - 1) = 1$

е) $\log_4(x - 2) - \log_4(x + 1) = 1$

ж) $\log_2 x = \log_x 16$

з) $\log_3 x - \log_x 9 = 1$

и) $\log_2 x + \log_x 8 = 4$

8. Решите уравнения.

1) $\log_5(x - 18) - \log_5 x = \log_5 7$

4) $7^{2x} = 2^{x+3}$

2) $\log_2(x - 6) + \log_2(x - 8) = 3$

5) $1,6^{x-4} = 5^{3x}$

3) $\log_3(2x - 1) = 2 - \log_3(x + 1)$

6) $9^{2x-1} = 71^{x+2}$

9. При каком значении a верно равенство $1 - \log_2 a - \log_2 5 = \log_2(a + 1)$?

10. Определите значения переменных, для которых уравнения имеют смысл и решите их.

а) $\log_2 x^2 = 6$

б) $2 \log_2 x = 6$

11. Найдите значения x и y , если $\log_3 81 = x - y$ и $\log_2 32 = x + y$.

12. Найдите pH для раствора, содержащего ионы водорода.

а) $[H^+] = 7,9 \cdot 10^{-3}$

б) $[H^+] = 8,1 \cdot 10^{-5}$

в) $[H^+] = 2,3 \cdot 10^{-4}$

13. Найдите концентрацию раствора, содержащего ионы водорода, если pH равен:

а) $pH = 3,1$

б) $pH = 6,8$

в) $pH = 1,8$

14. Физика. Альтиметр - это прибор, который измеряя атмосферное давление определяет высоту над уровнем моря. Зависимость между высотой (в метрах) и атмосферным давлением (в паскалях) задаётся формулой $h = -8005 \ln \frac{P}{101300}$. Найдите атмосферное давление при подъёме на высоту 3500 м.

15. Землетрясение. Амплитуда землетрясения находится по формуле $A = A_0 \times 10^M$, где A_0 - амплитуда самого слабого землетрясения, M - сила землетрясения по шкале Рихтера. Амплитуда землетрясения силой 5,3 баллов в 125 раз больше амплитуды повторных толчков, после землетрясения. Найдите силу повторных толчков.

16. Химия. Показатель pH уксусной кислоты равен 2,9. Найдите концентрацию ионов водорода в муравьиной кислоте, если она в 1,8 раза больше концентрации уксусной кислоты.

17. Финансы. Если на счёт в банке поместить 1 манат под 6% рост, то размер вклада через t лет можно посчитать по формуле $S = 1,06^t$.

а) Выразите переменную t через S .

б) За сколько лет сумма вклада в размере 1000 манат достигнет 1500 манат?

Радиоактивный распад изотопа Углерод 14 учёные широко используют для определения возраста останков животных и растений. Изотоп Углерод 12 встречается на Земле чаще, но он не радиоактивен и не распадается, в отличие от изотопа Углерод 14. Изотоп Углерод 14 получается в атмосфере из солнечных лучей и проникает в растения посредством фотосинтеза, а оттуда в организм животных, которые питаются этими растениями и т.д. В растениях и животных содержится 10^{-10} процентов атомов углерода изотопа Углерод 14. Когда растение или животное погибают они прекращают получать Углерод 14, а тот углерод который остался в организме начинает распадаться. Период полураспада этого изотопа 5730 лет. Подсчитав сколько процентов атомов углерода изотопа Углерода 14 осталось в растении или животном можно определить время их гибели.

- 18.** Решите задачу по формуле $m = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$. (здесь m_0 - первоначальная масса вещества, T - период полураспада, t - время)
- а) Из останков костей слона улетучилось 36% Углерода 14. Сколько лет назад жил слон?
- б) Период полураспада вещества 3 года. Если масса вещества изначально составляла 67 г, то через сколько лет она будет равна 7 г?
- в) Две трети части определённого количества урана распадается за 0,26 миллиардов лет. Найдите период полураспада урана.
- 19.** За сколько лет сумма в 2000 манат на счету вырастет до 10000, если она размещена под сложный процент со ставкой 8%?
- 20.** Население города ежегодно уменьшается на 3%. Через t лет численность населения можно найти по формуле $N = N_0 \cdot 0,97^t$. Здесь N_0 – текущая численность населения. Выразите величину t через N .
- 21.** С 1990 до 2000 года численность населения некоторой страны увеличилась с 151 млн. до 173 млн. человек.
- а) Определите скорость прироста населения, зная, что она изменяется по закону $N = N_0 (1 + r)^t$.
- б) Если население будет расти с такой же скоростью, то через сколько лет численность населения составит 220 млн. человек?
- 22.** Уровень pH для напитков типа Кола составляет 2,6, а для молока составляет 6,6. Во сколько раз кислотность Колы больше кислотности молока?

Решение показательных неравенств обычно приводит к решению неравенств вида $a^x > a^b$ или $a^x < a^b$. Здесь $a > 0$, $a \neq 1$.

Решаются данные неравенства при помощи свойства возрастания или убывания показательной функции $y = a^x$:

При $a > 1$ неравенство $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ равносильно неравенству $f(x) > g(x)$, неравенство $a^{f(x)} < a^{g(x)}$ равносильно неравенству $f(x) < g(x)$.

При $0 < a < 1$ неравенство $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ равносильно неравенству $f(x) < g(x)$, а неравенство $a^{f(x)} < a^{g(x)}$ равносильно неравенству $f(x) > g(x)$.

Пример.

$$2^{x+1} > 8 \quad \text{заданное неравенство}$$

$$2^{x+1} > 2^3 \quad \text{применим свойство степени}$$

$$x + 1 > 3 \quad \text{заменяем на равносильное неравенство}$$

$$x > 2 \quad \text{решение неравенства}$$

Пример.

$$0,2^{x-1} > 0,04 \quad \text{заданное неравенство}$$

$$0,2^{x-1} > 0,2^2 \quad \text{применим свойство степени}$$

$$x - 1 < 2 \quad \text{заменяем на равносильное неравенство}$$

$$x < 3 \quad \text{решение неравенства}$$

С помощью тождества $c = a^{\log_a c}$, решение неравенств $a^x > c$ (или $a^x < c$) сводится к решению равносильных неравенств $a^x > a^{\log_a c}$ (или $a^x < a^{\log_a c}$).

Решение показательных неравенств при помощи определённых методов сводится к решению простейших показательных неравенств.

1) Применение свойства степени.

Пример. а) $8 \cdot 4^{x-1} > 2^x$

$$2^3 \cdot (2^2)^{x-1} > 2^x$$

$$2^{2x+1} > 2^x$$

$$2x + 1 > x$$

$$x > -1$$

б) $3^{x+1} + 3^{x-1} < 30$ *заданное неравенство*

$$3^x \cdot 3 + \frac{3^x}{3} < 30$$

$$3^x(3 + \frac{1}{3}) < 30$$

$$3^x < 30 \cdot \frac{3}{10}$$

$$3^x < 9$$

$$3^x < 3^2 \quad x < 2$$

Если показатели степени равны, то удобнее всего разделить обе части неравенства на одну из степеней.

Пример. $2^x > 3^{2x}$ *заданное неравенство*

$$2^x > 9^x : 2^x \quad \text{разделим каждую из двух частей на } 2^x$$

$$1 > (\frac{9}{2})^x$$

$$(\frac{9}{2})^x < (\frac{9}{2})^0 \quad \text{так как } a^0 = 1$$

$$x < 0$$

2) Введение новой переменной.

Пример. $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 < 0$ *заданное неравенство*

$$(2^x)^2 - 6 \cdot 2^x + 8 < 0 \quad 2^x = a$$

$$a^2 - 6a + 8 < 0$$

$$(a - 2)(a - 4) < 0$$

$$2 < a < 4$$

$$2 < 2^x < 2^2$$

$$1 < x < 2$$

выполним замену

решим квадратное неравенство

выполним обратную замену

Обучающие задания

1. Решите показательные неравенства.

а) $3^x \geq \frac{1}{9}$ б) $0,2^x \leq \frac{1}{25}$ в) $1,5^x \leq 2,25$ г) $0,3^x \leq 0,09$
 д) $2^x > 1$ е) $3^x < 1$ ж) $4^{-x} < -1$ з) $5^x > -5$
 и) $0,4^{x+1} > 0,16$ к) $3^{2-x} < 27$ л) $3^{x^2} < 9^8$ м) $4^{0,5x^2-3} > 8$
 н) $4^x > 2^{x^2}$ о) $9^x < 36^x$ п) $5^x > 2^{3x}$ р) $2^{|x-1|} < 8$

2. Применив свойство степени решите показательные неравенства.

а) $3^{x+3} < 27$ б) $2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} < 448$ в) $4^x + 4^{x-1} < 20$
 г) $(\frac{1}{2})^x + (\frac{1}{2})^{x-2} > 5$ д) $(\frac{1}{5})^{x-1} + (\frac{1}{5})^{x+1} \leq 26$

3. Введя новую переменную решите следующие неравенства.

а) $4^x - 2^{x+1} - 8 > 0$ б) $4^x + 2^x > 20$ в) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 < 0$
 г) $3^{x-1} + 3^{2-x} < 4$ д) $5^x + 5^{1-x} > 6$

4. Найдите область определения функции.

а) $y = \sqrt{7\frac{1}{9} - (\frac{3}{8})^{2x}}$ б) $y = \sqrt{(\frac{3}{5})^{x+2} - (\frac{9}{25})^x}$

5. Решите следующие неравенства.

а) $x^2 \cdot 3^x - 3^{2+x} < 0$ б) $x^2 \cdot 3^x + 9 > x^2 + 9 \cdot 3^x$
 в) $0,4^{\frac{x^2-4}{x+1}} \leq 1$ г) $2,6^{\frac{x^2-9x+14}{x-3}} > 1$

6. Решите показательные неравенства.

$625 \geq 5^{a+8}$ $(\frac{1}{64})^{c-2} < 32^{2c}$ $(\frac{1}{9})^{3t+5} \geq (\frac{1}{243})^{t-6}$
 $10^{5b+2} > 1000$ $(\frac{1}{27})^{2d-2} \leq 81^{d+4}$ $(\frac{1}{36})^{v+2} < (\frac{1}{216})^{4v}$

7. Решите неравенства при помощи основного логарифмического тождества.

1) $8^x > 21$ 2) $6^y < 39$ 3) $e^x < 8,1254$ 4) $e^x > 0,3151$
 5) $10^x > 0,0138$ 6) $10^y < 16,8125$ 7) $e^{0,01x} > 15$ 8) $e^{0,03y} \leq 4$

8. Решите показательные неравенства.

1) $2^{\frac{x^2-3x-6}{x+1}} - 16 \geq 0$ 2) $\frac{e^x}{e^x-4} \leq 3$ 3) $xe^{2x} < 4x$

Практическая работа. 1) Какие знаки сравнения можно вставить в цветные ячейки?

а) $\log_2 3$ ■ $\log_2 7$

б) $\log_{0,5} 5$ ■ $\log_{0,5} 7$

2) Какие числа надо вставить в цветные ячейки, чтобы неравенство было истинно?

а) \log_2 ■ $< \log_2 5$

б) $\log_{0,5}$ ■ $< \log_{0,5} 4$

в) \log_2 ■ $> \log_2 5$

г) $\log_{0,5}$ ■ $> \log_{0,5} 4$

3) Существует ли значение x , большее 5, удовлетворяющее неравенству $\log_2 x \leq \log_2 5$? Выразите своё мнение о значениях x , удовлетворяющих неравенству.

4) Проведите обсуждение по поводу значений x , удовлетворяющих неравенству $\log_{0,5} x \leq \log_{0,5} 4$.

Логарифмические неравенства

Логарифмические неравенства решаются при помощи свойств возрастания или убывания логарифмической функции на множестве допустимых значений.

Пример. $\log_2(x + 1) > \log_2 7$

Так как функция $\log_2 x$ возрастающая, то на области определения данной функции $x + 1 > 0$ получим $x + 1 > 7$. Значит, надо найти значения x удовлетворяющие неравенствам $x + 1 > 0$ и $x + 1 > 7$. Отсюда $x > 6$.

Ответ: (6; $+\infty$)

Пример. $\log_{0,2}(x - 1) > \log_{0,2} 3$

Так как функция $\log_{0,2} x$ убывающая, то на области определения данной функции $x - 1 > 0$, получим $x - 1 < 3$. Значит, надо решить двойное неравенство

$0 < x - 1 < 3$. Отсюда $1 < x < 4$.

Ответ: (1; 4)

при $a > 1$

логарифмическое неравенство	равносильное неравенство
$\log_a f(x) > \log_a c$	$f(x) > c$
$\log_a f(x) > c$	$f(x) > a^c$
$\log_a f(x) < \log_a c$	$0 < f(x) < c$
$\log_a f(x) < c$	$0 < f(x) < a^c$

при $0 < a < 1$

логарифмическое неравенство	равносильное неравенство
$\log_a f(x) > \log_a c$	$0 < f(x) < c$
$\log_a f(x) > c$	$0 < f(x) < a^c$
$\log_a f(x) < \log_a c$	$f(x) > c$
$\log_a f(x) < c$	$f(x) > a^c$

Пример. Неравенство $\log_5(3x - 4) < \log_5(2x - 2)$ равносильно двойному неравенству $0 < 3x - 4 < 2x - 2$ или системе неравенств

$$\begin{cases} 3x - 4 > 0 \\ 3x - 4 < 2x - 2 \end{cases}$$

Отсюда получаем, что $x > \frac{4}{3}$ и $x < 2$.

Множество решений неравенства: $\frac{4}{3} < x < 2$

Пример. решим неравенство $\log_2 x^2 - \log_2 x - 2 < 0$

Выражение, стоящее под знаком логарифма по определению логарифма, положительно: $x > 0$. Выполним замену $\log_2 x = t$, получим неравенство $t^2 - t - 2 < 0$. Промежуток $-1 < t < 2$ является решением неравенства. Выполним обратную замену, получим $-1 < \log_2 x < 2$. Отсюда $\frac{1}{2} < x < 4$.

Ответ: $(\frac{1}{2}; 4)$

Обучающие задания

1. Решите логарифмические неравенство

а) $\log_2(x + 1) < \log_2 3$

б) $\log_3(x - 1) > \log_3 5$

в) $\log_{0,1}(x - 2) > \log_{0,1} 4$

г) $\log_4(x - 3) > 2$

д) $\log_5(3x - 1) < 2$

е) $\log_{0,2}(5 - 2x) > -1$

ж) $\log_7(2x - 1) > \log_7(x + 2)$

з) $\log_5(3x - 4) \leq \log_5(x + 2)$

и) $\log_{0,5}(4x - 11) < \log_{0,5}(x - 11)$

к) $\log_{0,2}(2x - 8) > \log_{0,2}(x - 1)$

2. Решите неравенства.

1) $\log_5(x - 9) > 3$

2) $\log_7(4x - 3) > 0$

3) $\log_7(2x - 1) < 2$

4) $\log_2(x + 20) \geq 5$

5) $\log_4(x + \frac{1}{2}) \geq -1$

6) $\lg(5x + 150) \leq 1$

7) $\log_7(2x - 5) \geq 2$

8) $\log_8(x + 5) \leq 1$

9) $\log_2(x - \frac{2}{3}) \leq -2$

3. Решите неравенства.

1) $\log_5(3 - 2x) \geq \log_5(4x + 1)$

2) $\log_{0,3}(10x + 3) < \log_{0,3}(7x - 21)$

3) $\lg x + \lg(x + 1) > \lg 2x$

4) $\lg x + \lg(2 - x) < 1$

5) $\lg x - \lg(2 - x) > 0$

6) $\log_{\frac{1}{3}}(3x - 1) - \log_{\frac{1}{3}}(x + 2) > 0$

7) $\lg(x^2 - x + 8) \leq 1$

8) $\log_3(x^2 - 2x) < 1$

9) $\log_2(x^2 - x - 6) + \log_{0,5}(x - 3) < 2\log_2 3$

10) $\log_{\sqrt{3}}(x + 1) + \log_{\sqrt{3}}(x - 1) > \log_3 64$

11) $\log_2(x^2 - 3x - 10) - \log_2(x + 2) \leq 2$

12) $|3 - \log_2 x| < 2$

13) $\log_{\pi}(x) + \log_{\pi}(x + 1) < \log_{\pi} 2$

14) $\log_{0,6}(4 - x) \geq \log_{0,6} 2 - \log_{0,6}(x - 1)$

15) $\log_2^2 x - \log_2 x \leq 6$

16) $\log_{0,1}^2 x + 3 \log_{0,1} x < 4$

17) $\lg^2 x + 2 \lg x > 3$

18) $\log_{0,1}^2 x - 1 \geq 0$

19) $\log_3(\log_{0,5}(2x - 1)) > 0$

20) $\log_{\frac{1}{2}}(\log_{\sqrt{5}}(x - 9)) > -1$

21) $|1 - 2 \log_3 x| < 3$

22) $|1 - \log_3 x^2| < 3$

Прикладные задания

Пример. За сколько лет, сумма, вложенная в банк под сложные проценты с процентной ставкой 8%, выросла с 1000 манат до как минимум 1500 манат. $S = S_0 e^{rt}$

Решение: Деньги на счету Минимум 1500 м
 S \geq 1500

$1000e^{0,08t} \geq 1500$ *по условию*

$e^{0,08t} \geq 1,5$ *разделим обе стороны неравенства на 1000*

$\ln e^{0,08t} \geq \ln 1,5$ *прологарифмируем обе части неравенства ln*

$0,08t \geq \ln 1,5$ *применим свойство неравенств для логарифмической функции*

$t \geq \frac{\ln 1,5}{0,08}$ *обе части неравенства разделим на 0,08*

$t \geq \frac{0,4054}{0,08} \quad t \geq 5,068 \quad t \geq 5,1$

Ответ: приблизительно через 5,1 лет сумма на счету достигнет 1500 манат.

4. Зависимость численности населения от времени вычисляется по формуле $P = P_0 e^{kt}$, где P_0 - численность населения, k скорость прироста населения, t - количество лет, P показывает численность населения через t лет.

В 2000 году численность населения в городе А составляла 8,5 тыс. человек, в 2010 году - 9,4 тыс. человек.

а) Найдите скорость прироста населения (коэффициент).

б) Через сколько лет численность населения достигнет 10 тыс. человек?

в) Если, численность населения города В 2000 году можно смоделировать по формуле $y = 9,5e^{0,00278t}$, то через сколько лет население города А станет больше населения города В?

5. Количество членов общественной организации каждый год уменьшается на 7%. Формула $P = N(1 - 0,07)^t$, показывает какое количество членов будет через t лет, если изначально их количество было равно N . В 2010 году в организации состояло 5000 человек. Через сколько лет количество членов станет меньше 2500 человек?

6. Остаток при распаде Углерода-14 через t лет можно вычислить (в граммах) по формуле $C = 20 e^{-0,0001216t}$.

а) Найдите изначальное количество Углерода-14.

б) Сколько грамм составит количество оставшегося Углерода-14, через 10 000 лет?

в) Приблизительно, через сколько лет остаток Углерода-14 для данного объекта станет меньше 10 грамм?

1. Найдите n по заданной формуле.

а) $M = 3e^{-2n} + 5$

б) $a^{2n} = b^2$

в) $y = ae^{4n}$

2. Дядя Мехман считает, что 90 000 манат, вырученные от продажи дома надо поместить на год в банк. Банк предлагает два вида депозита: под сложный процент со ставкой 9% за полгода и ежедневное начисление процента. Будет ли разница между этими двумя предложениями банка?

3. Представьте, что вы приняли 500 мг аспирина. Количество оставшегося аспирина в крови за t часов можно смоделировать функцией $y = 500 \cdot (0,8)^t$. Через сколько часов количество аспирина в крови останется меньше 50 миллиграмм?

4. Найдите уровень pH, зная концентрацию ионов водорода .

а) лимонная вода: $[H^+] = 7,9 \times 10^{-3}$ моль/л

б) аммиак: $[H^+] = 10^{-11}$ моль/л

в) уксус: $[H^+] = 6,5 \times 10^{-3}$ моль/л

г) апельсиновая вода: $[H^+] = 3,2 \times 10^{-4}$ моль/л

5. Решите уравнения и неравенства.

1) $6^x \geq 42$

2) $5^x = 52$

3) $8^{2a} < 124$

4) $4^{3p} = 10$

5) $20^{x^2} = 70$

6) $2^{x^2-3} = 15$

7) $8^{2n} > 52^{4n+3}$

8) $2^{2x+3} = 3^{3x}$

9) $\log_{\frac{1}{5}}(\sqrt{x+1}) = 2$

10) $(x-2) \cdot \log_5(x+1) = 0$

11) $(x^2-4) \cdot \log_3 x = 0$

12) $\log_x 3 > 0$

13) $\log_{\frac{1}{2}}(2x-4) < 4$

14) $(x+1) \cdot \log_2(x+1) > 0$

6. Джамиль составил таблицу изменения численности населения с 11450 до 95600 человек со скоростью прироста 4,32%. Однако, он не помнил за какое время это произошло. Найдите количество лет соответствующее данным.

7. Упростите.

а) $\ln \frac{1}{\sqrt[3]{e}}$

б) $\log_3 \frac{2x^3}{27}$

в) $5 \ln x + \ln y + \frac{1}{3} \ln z$

8. Найдите значение выражения $\log_b(x \cdot \sqrt[3]{x})$, если $\log_b x = 0,2$.

9. При помощи каких преобразований из графика функции $y = \log_2 8x^3$ можно получить график функции $y = \log_2 x$?

10. Если $\log_t M = 1,28$ и $\log_t N^2 = 1,74$, найдите:

а) $\log_t N$

б) $\log_t (MN)$

в) $\log_t \frac{N^2}{\sqrt{M}}$

11. Запишите формулу показательной функции $y = ab^x$, график которой проходит через точки $(1;1)$ и $(3; \frac{1}{9})$.


- 12. Здоровье и физика.** Специалисты рекомендуют, при работе со звуком больше 85 Db, пользоваться защитными приборами.

а) Уровень звука, который исходит от станка для колки дров равен 80 dB, а музыкального усилителя (плеера) 110 dB. Во сколько раз интенсивность звука от музыкального усилителя больше, чем от станка для колки дров?
 б) Звук, громкость которого в 100 000 раз больше громкости шёпота безопасен для человека. Если интенсивность звука при шёпоте равна 20 dB, то найдите интенсивность звука безопасного для человека.

- 13.** По мнению социологов новость распространяется с экспоненциальной скоростью. Новость, об открытии нового торгового центра через время t среди 2000 человек, выражается функцией $y = 2000(1 - e^{-0,03t})$.

а) Сколько человек узнает об открытии торгового центра через 24 часа?
 б) Постройте функцию при помощи граф калькулятора и приблизительно определите, через сколько времени 90% людей узнают эту новость.

- 14.** Температура воды в чашке изменилась со 100°C до 20°C (комнатная температура). Каждую минуту температура воды в чашке измерялась и на графике зависимости температуры от времени отмечалась точка. Через данные точки провели кривую и получили график, показанный на рисунке. После чего стало известно, что каждые 5 минут разность температур изменялась на 25% в экспоненциальной зависимости. Формулу зависимости можно написать в виде $T = l \cdot a^{kt} + n$. По графику найдите соответствующие значения переменных l, a, k, n и запишите функцию



- 15.** Сеймур купил новый автомобиль за 15000 манат. Каждый год стоимость автомобиля уменьшается на 15%. Через сколько лет цена автомобиля станет меньше 3000 манат?

- 16.** Используя свойства логарифма упростите и найдите значение выражения

а) $9 \log_9 3 - \log_9 75 + 2 \log_9 5$ б) $\log_2 98 - 2 \log_2 7 - 2$
 в) $2 \log_3 6 - 3 \log_3 2 + \log_3 18$ г) $\frac{1}{2} \log_2 36 + \log_2 12 - 2 \log_2 3$

- 17.** Постройте графики функций $y = \lg x^2$ и $y = 2 \lg x$. Запишите схожие и отличительные свойства данных функций. При каких значениях переменных верно равенство $\lg x^2 = 2 \lg x$?

10

Информация и прогноз

Совокупность и выборка
Случайная выборка и её разновидности
Представление информации
Разложение бинома
Испытания Бернулли

Это интересно. Американский журнал “The Literary Digest” имел хорошую репутацию в прогнозировании итогов выборов президента Америки. Результат 5 предыдущих выборов журнал дал достаточно точно. Однако в 1936 году была допущена большая ошибка, когда кандидат республиканец Альфред Лэндона не смог победить кандидата демократа Франклина Д.Рузвельта. Как стало ясно потом, причиной этого послужил неверный выбор респондентов для опроса, который проводился среди читателей журнала, большинство из которых были приверженцами Республиканской партии.



Применив методы статистики и вероятности можно более глубоко понять события, которые происходят в современном мире, которые представляют интерес. В обеих областях как объект исследования выбирается популяция, и выбранные из данной популяции образцы, берутся за основу, чтобы сделать выводы относительно этой популяции.

Статистика, проводя исследование выбранных образцов формирует мнение о всей популяции.



Для проведения статистических исследований, как правило, образцы выбираются случайным образом. В этом случае, каждый образец в совокупности имеет равный шанс при выборке. Существуют различные техники случайной выборки.

- Простая случайная выборка
- Систематическая случайная выборка
- Кластерная случайная выборка
- Разноуровневая случайная выборка

Простая случайная выборка. Предположим, что в классе нужно выбрать группу из трёх человек. Для этого на карточках записываются имена всех учеников, затем эти карточки складываются в ящик, после чего, случайным образом, вытаскиваются три карточки. В этом случае каждый из трёх членов группы имеет одинаковый шанс выбора.

При простой случайной выборке каждый элемент n элементной выборки имеет одинаковый шанс выбора.

Систематическая выборка. Предположим, что руководство большого торгового центра хочет собрать информацию о том, сколько времени покупатели проводят в торговом центре. Было установлено, что центр в течение дня посещают в среднем 2000 человек. Из них случайным образом было выбрано 5% (т.е. 100 человек). Как правильно сделать выборку? Можно опросить людей в день выбора следующим образом: из каждых 20 покупателей опросить каждого 16-го., затем 36-го, 56-го и т.д. Выборка такого вида называется систематической.

Если при систематической выборке предполагается сделать выбор в размере $k\%$, то используется каждый $[\frac{100}{k}]$ -ый элемент популяции

Кластерная выборка. Пусть имеется 1000 ящиков по 15 деталей в каждом, и необходимо дать информацию о качестве деталей. Для этого принято решение проверить качество 300 (2%) деталей. Но для того, чтобы вытащить все детали из ящиков, перемешать их и случайно выбрать 300 штук, требуется много времени и расходов. Из 1000 ящиков можно случайным образом выбрать 20 и, проверив все детали из этих ящиков, сформировать мнение о всех деталях. Здесь каждый ящик можно считать кластером. Такая выборка называется кластерной выборкой. Необходимо проверить все элементы находящиеся внутри кластера.

При кластерной выборке совокупность состоит из кластеров. Кластер выбирается случайным образом, и рассматриваются все элементы кластера.

Разноуровневая выборка. Предположим, что в школе планируется провести опрос среди старшеклассников о том, хотели бы они после уроков заняться чтением художественной литературы в школьной библиотеке. Не желательно проводить опрос среди случайно выбранных учащихся в школьном дворе, так как они могут быть учениками одного и того же класса и т.д. Опрос должен быть проведён случайным образом среди учащихся разных возрастных групп. Такого рода случайная выборка называется разноуровневая (по слоям, по группам). Если в школе в этих классах учится 1265 учеников, из них 385 учится в 8-ом классе, 350 человек - в 9-ом, 280 человек - в 10-ом, 250 человек в 11-ом классе, то для того, чтобы узнать мнение 10 % случайно выбранных учащихся, надо узнать мнение 10% учеников каждого класса, т.е. желательно случайно выбрать 39 из 8-го, 35 из 9-го, 28 из 10-го, 25 из 11-го класса.

При разноуровневой выборке сначала совокупность делится на уровни, а затем проводится случайная выборка на каждом уровне.

При некоторых исследованиях невозможно бывает сделать случайную выборку. Например, диетологам приходится назначать диету не случайно выбранным людям, а тем кто сам захотел этого добровольно.

Верная или неверная выборка. Научно исследовательские институты, занимающиеся опросами, не имеют материально технической базы для того, чтобы узнать мнения всех людей по каждому вопросу. Поэтому они ограничиваются изучением этого мнения на небольшой группе людей. Для этого большую роль играет умение правильно определить эти группы. Надёжность представленного на диаграмме исследования также зависит от того, насколько правильно определена группа. Например, невозможно сформировать правильное мнение о том, сколько раз в неделю все горожане занимаются спортом, изучив мнение только тех людей, которые посещают спортивный центр или, прогноз о том, выберут ли кого-то в депутаты парламента не даст правильных результатов, сформировав его, по мнению людей из коллектива, где он работает или живущих с ним в одном районе.

Обучающие задания

- 1.** По следующим данным определите совокупность и выборку.
 - а) Среди 2000 жителей города был проведён опрос от том, кто из 3 кандидатов должен стать мэром города.
 - б) Чтобы испечь хлеб смешали 300 кг белой и 50 кг чёрной муки. Из 1 кг муки получается 3 буханки хлеба. Из 70 буханок хлеба берутся образцы.
 - в) Чтобы проверить как увеличивается масса рыбы кутум, фермер проверил 30 рыб из 4 бассейнов.
 - г) Продавец предложил попробовать новый сорт сыра 40 покупателям (каждому 10 покупателю магазина).
 - д) Врач - диетолог предлагает на добровольной основе 12 женщинам старше 70 лет приходиться в течение двух недель в клинику по утрам, чтобы позавтракать бутербродами, обогащёнными пищевыми волокнами.

- 2.** Какая из следующих выборок сделана верно?
 - а) Для выбора дежурного в классе, листочки с именами всех детей поместили в ящик из которого вытащили 5 листочков.
 - б) Модель и цвет школьной формы была выбрана после опроса родителей учащихся 10^а класса.
 - в) Чтобы изучить мнение о том, за кого из кандидатов отдадут голоса избиратели, произвели звонки по одному из каждых 15 номеров телефонной книги.

- 3.** Запишите примеры ситуаций с верной и неверной выборкой.

- 4.** Определите технику случайной выборки для каждой из следующих ситуаций.
 - а) Фирма по воздушным перевозкам сделала подарок каждому пятому пассажиру при посадке в самолёт.
 - б) Для проверки уровня преподавания математики в школе случайным образом было выбрано 20 учеников среди выбранных случайным образом 5 разных классов.
 - в) Для определения мнения об уровне услуг, предоставляемых авиакомпанией, был проведён опрос среди пассажиров пяти рейсов, выбранных случайным образом.
 - г) Для исследования было опрошено 5 мужчин и 5 женщин, выбранных случайным образом.
 - д) Диетологи могут высказать мнение о новой диете, с низким содержанием сахара, после наблюдения как минимум за 15 пациентами из каждой возрастной группы 30 - 40, 40 - 50, 50 - 60.

5. Менеджер по продаже недвижимости планирует проинформировать по телефону о новой скидочной кампании жителей 10 домов на одной улице. На улице имеется 100 домов. Сначала менеджер отметил дома с номера 1 по 10 и позвонил в один из них (например в номер 8). После чего, он позвонил в дома под номерами 18, 28 и т.д.
- Какую технику случайной выборки использовал менеджер при выборке такого вида?
 - Равны ли шансы выборки всех домов?
 - Чем отличается данная техника от техники простой выборки?


6. Администрация школы планирует определить связь между отметками учащихся по предметам математика и естественным наукам. В оценивании и по предмету математика, и по естественным наукам из 800 учащихся школы принимали участие 350 учеников. Из них, случайным образом, 70 человек планируется вовлечь в специальное оценивание.
- По следующей таблице определите сколько из учащихся каждого класса будут выбраны случайным образом для специального оценивания.
 - Какой вид техники выборки здесь применяется?

Классы	Количество учащихся
8 класс	90
9 класс	100
10 класс	75
11 класс	85

Пример. Если количество выбранных учащихся в общем равно 70 человек, то выборка из каждого класса должна быть пропорциональна. Количество восьмиклассников должно быть: $\frac{x}{70} = \frac{90}{350}$

7. Для деления на группы, каждому из спортсменов выдается карточка с номером от 1 до 5. Участники с одинаковыми номерами образуют группы. Является ли данная выборка случайной? Можно ли считать данный выбор независимым? Что бы предложили вы, для более прозрачного выбора?
8. Фирма “Micro Tik” ежемесячно производит 14 500 штук процессоров для компьютеров. Случайным образом были выбраны и проверены 2000 штук, изготовленные в этом месяце. При этом было установлено, что 8 из них оказались с дефектом.
- Определите совокупность и выборку в данной ситуации.
 - По данной информации можно ли сказать какое количество процессоров, изготовленных в этом месяце, будут с дефектом?
9. Для проведения опроса “Из каких источников вы получаете последние новости?” по республике, случайным образом было выбрано 5 районов, 5 деревень в каждом районе и 5 домов в каждой деревне.
- Определите совокупность и выборку.
 - Какой технике выборки это соответствует?

Статистическая информация по количественным и качественным характеристикам делится на два вида. **Информация количественного типа** выражается в численном значении. Например, “сколько времени занимаются спортом”, “чему равен рост” и т.д. Информация качественного вида подразделяется на категории и называется **категориальной информацией**. Например, “название партии”, “цвет глаз”, марка автомобиля” и т.д.



Количественная информация - числовая информация делится на два вида:
 1. дискретная информация - ее значения можно пронумеровать.
 2. непрерывная информация-которая не является дискретной

Дискретная числовая информация определяется путём подсчёта. Например, количество пассажиров в автобусе принимает значения 1,2,3 и т.д.

Непрерывная числовая информация принимает различные значения в определённом диапазоне, обычно формируется по результатам измерений. Например, скорость машины, масса новорожденных детей и т.д.

Для представления информации важно правильно выбрать соответствующую форму графика. Поэтому для представления категориальной и количественной информации выбирается соответствующий график.

Целесообразные формы представления категориальной информации.

Пример 1. Среди 200 учеников был проведён опрос о том, какой вид спорта они любят больше всего. Здесь информация типа вид спорта относится к категориальному виду. В школе имеются секции по следующим видам спорта. Для представления категориальной информации удобно пользоваться таблицей частот, барграфом, круговой диаграммой..






Таблица частот

Вид спорта	Частота
Борьба	57
Бокс	43
Футбол	41
Баскетбол	21
Каратэ	38
Всего	200

Круговая диаграмма




Сегментный барграф



Определяет какую часть от общего (единичного блока) составляет каждая категория. Единичный блок делится на сегменты.

Обучающие задания

1. 1) Для категориальной информации запишите 3 соответствующие категории.
2) Для числовой информации приблизительно определите и запишите соответствующий интервал.
а) Количество проданных автомобилей по цвету.
б) Количество солнечных часов в день.
в) Количество пропущенных уроков по болезни.
г) Время (в часах), затраченное на выполнение домашнего задания.
д) Количество жидкости, потребляемой человеком за день.
2. Какая числовая информация является дискретной, а какая непрерывной?
а) Изменение температуры в июле.
б) Количество спичек в спичечной коробке.
в) Масса багажа, пассажиров самолёта.
г) Количество пассажиров в вагоне поезда.
д) Количество этажей в домах на улице.
е) Время пользования Интернетом.
3. Среди 24 человек был проведён опрос по поводу того, какой цвет им нравится. При этом были получены следующие результаты: 6 человек - красный, 8 - чёрный, 4 - белый, остальные выбрали другие цвета. Является ли данная информация числовой или категориальной? Представьте информацию в виде таблицы частот (с указанием относительной частоты), круговой диаграммы и барграфа.
4. Министерство по чрезвычайным ситуациям обнародовало информацию о причинах возникновения пожаров за год. Информация представлена в таблице справа. По таблице постройте круговую диаграмму и сегментный барграф.
- | Причины | Количество |
|------------------------|------------|
| Малолетние дети | 6 |
| Сигареты | 4 |
| Газовая плита | 10 |
| Электричество | 12 |
| По неизвестной причине | 8 |
5. Пусть вам надо провести опрос среди учащихся вашей школы на тему “Какую форму вы выберете для логотипа фирмы?”
- 
- а) Каким образом вы провели опрос? Запишите.
б) Какие классы были выбраны из совокупности?
в) Какая техника была использована вами для выборки?
г) Изначально определите, приблизительно какой формы будет логотип. Совпадают ли результаты опроса с вашей предположением?
д) График какой формы наиболее приемлем для представления информации? Покажите условие, изобразив информацию.

Целесообразные формы представления числовой информации.


Дискретная числовая информация. Для представления ограниченного количества числовой дискретной информации используют такие формы как **таблица частот, барграф, гистограмма и разветвляющееся дерево.**

Пример 2. Среди 50 молодых семей провели опрос “Сколько детей в вашей семье?”. Ответы представлены ниже.

0 1 2 1 0 3 1 4 2 0 1 2 1 0 5 1 2 1 0 0 1 2 1 2 1
 0 1 4 1 0 1 2 5 0 4 1 2 3 0 0 1 2 1 3 4 2 3 2 1 0

Следующие данные показывают количество детей в каждой семье. В таблице это количество показано в столбце или в виде палочек, или в виде числа. По таблице, в одном столбце которой, количество показано палочками, а в другой-числами, задан столбец относительной частоты.

Количество детей	Количество семей(палочками)	Частота (количество семей)	Относительная частота
0		12	12 : 50 = 0,24
1		17	17 : 50 = 0,34
2		11	11 : 50 = 0,22
3		4	4 : 50 = 0,08
4		4	4 : 50 = 0,08
5		2	2 : 50 = 0,04



Группировка дискретной числовой информации. Гистограмма

Пример 3. Ниже приведены результаты оценивания учащихся по предмету Азербайджанский язык в баллах (по 100 бальной системе).


52 66 75 80 52 48 95 85 84 68 86 82 63 78 75 64 79 81 66 53 76 75 69 65

Диапазон изменения числовой информации 48-95.


Данную информацию можно сгруппировать в 6 классах размерностью 10 : 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100.

Оценивание по предмету Азербайджанский язык

Классы	Палочки	Частота
[40, 50)		1
[50, 60)		3
[60, 70)		7
[70, 80)		6
[80, 90)		6
[90, 100)		1



6. Среди женщин города был проведён опрос “Сколько раз в неделю вы ходите в спортивный зал?”. Полученные результаты представлены в виде следующего барграфа.
- Является ли данная информация непрерывной или дискретной числовой информацией?
 - Определите совокупность и выборку для данной ситуации. Найдите размер выборки по барграфу.
 - Если в опросе приняло участие 92 человека, то о каком количестве в процентах может идти речь, при условии посещения как минимум два раза в неделю?
 - Какова вероятность того, что одна из выбранных женщин посещает зал больше одного раза?



7. В магазин поступает каждый день 1000 коробок яиц. Менеджер магазина проверил каждую 50 - ю коробку яиц в течении 5 дней, что бы определить, сколько их них повреждается при упаковке и перевозке.
- По информации определите совокупность и выборку.
 - Какую технику выборки использовал менеджер?
 - Если при проверке оказалось, что как минимум 5 и как максимум 20 коробок оказались повреждёнными, то какой в общем вывод можно сделать применительно ко всем коробкам?
 - Выберите два вида графика для представления этой информации и постройте их.
8. Следующие данные являются баллами Юсифа в игре на компьютере. Сгруппируйте информацию по классам и представьте в виде гистограммы.
580, 490, 520, 650, 540, 600, 630, 590, 390, 410, 670, 480, 400, 440, 560, 540, 430, 670, 490, 720, 580, 680, 590, 370, 470, 540, 490, 660, 500, 600, 390, 540, 300, 350, 600, 540, 510, 410, 480, 560, 330, 490, 540, 540, 580, 540, 270, 450
9. В таблице представлена информация о невыходе на работу работников. По данной информации постройте гистограмму.

больше 1 меньше 3 ($1 < 3$)	24
больше 3 меньше 6 ($3 < 6$)	16
больше 6 меньше 9 ($6 < 9$)	12
больше 9 меньше 12 ($9 < 12$)	6
больше 12 меньше 15 ($12 < 15$)	2
Всего	60

“Ствол-листья”. Эту форму удобно применять при небольшом количестве данных. Представление числовой информации в виде ствола и листьев занимает немного времени и даёт возможность более ясно увидеть распределение информации. А форма распределения позволяет с лёгкостью находить ряд статистических величин (моду, медиану, среднее арифметическое, наибольшую разность и т.д.).


Пример 4. Следующие данные отражают результаты оценивания учащихся.

32, 67, 81, 92, 87, 72, 63, 88, 96, 91, 72, 63, 85, 79, 70,
85, 64, 86, 98, 100, 77, 88, 81, 64, 41, 78, 95, 74, 97, 66

Постройте диаграмму “ствол-листья”, выполнив следующие шаги.

1. Разделите ствол и листья горизонтальной и вертикальной прямой.
2. Ведущая часть числовой информации - большой уровень (или уровни) принимается за ствол с ветками - показывает количество чисел. В данном случае ствол содержит ветки с числами 3,4,5,6,7,8,9,10 и показывает количество десятков.
2. Следующие числа соответствуют листьям. Это цифры, выражающие значения единиц. На каждую “ветку” последовательно записываются “листья”.

Ствол с ветками	Листья	$3 2 = 32$
3	2	
4	1	
5		
6	3 3 4 4 6 7	
7	0 2 2 4 7 8 9	
8	1 1 5 5 6 7 8 8	
9	1 2 5 6 7 8	
10	0	



- 10.** По условию телевизионного конкурса ответ участника, который даёт ответ быстрее всех в течение минуты после того как прозвучал вопрос выводится на экран, после чего он продолжает состязаться один на один с ведущим. При этом были получены следующие (в секундах) результаты. Представьте информацию в диаграмме “ствол-листья”.

37, 33, 33, 32, 29, 28,
28, 23, 22, 22, 22, 21,
21, 21, 20, 20, 19, 19,
18, 18, 18, 18, 16, 15,
14, 14, 14, 12, 12, 9, 6

- 11.** Представьте в виде диаграммы “ствол-листья” возраст работников фирмы.
а) Найдите среднее арифметическое, моду и медиану; б) Представьте информацию в виде таблицы частот.

Ствол	Листья
2	1 3 5 8 8
3	1 2 2 3 3 5 9
4	3 5 7
5	0 2 2
6	1


$2|1 = 21$ год

Представление непрерывной числовой информации.

Формы представления непрерывной числовой информации схожи с формами сгруппированной дискретной информацией.

Пример 5. В результате проведённых исследований стало известно, что масса молодых людей, занимающихся спортом в клубе колеблется от 40 кг до 90 кг. Более подробная информация представлена в виде таблицы и гистограммы.

Интервал массы	Частота
40 – < 50	2
50 – < 60	5
60 – < 70	11
70 – < 80	7
80 – < 90	1



- 12.** Работниками фирмы разрешается говорить по телефону максимум 3 минуты. В течении дня в фирме были зафиксированы следующие разговоры.


2,4; 0,2; 3,0; 2,8; 1,5; 1,9; 0,7; 1,0; 2,5; 1,3;
 0,8; 2,1; 3,0; 0,4; 1,2; 3,0; 1,1; 0,3; 0,7; 1,8;
 0,3; 1,0; 2,1; 3,0; 2,9; 0,5; 1,4; 3,0; 2,8; 1,2;
 0,5; 1,0; 1,5; 0,9; 1,8; 0,6; 0,6; 0,7; 0,8; 0,8

- а) Представьте информацию в виде диаграммы “ствол-листья”.
 б) Объедините информацию в 4 класса и представьте её в виде таблицы частот и гистограммы.
 в) Какую часть составляют звонки меньше минуты от всех звонков? Какие статистические показатели для этого использовались?

- 13.** Таблица частот показывает продолжительность пребывания автомобиля на стоянке. Постройте гистограмму по таблице.

Продолжительность	6-25	26-45	46-65	66-85	86-105	106-125	126-145
Частота	60	70	90	120	80	50	40

- 14.** Гистограмма отражает информацию о количестве проданных автомобилей и цене. По данной информации постройте таблицу частот. Классы определите как 15 - < 18. Сколько процентов всех проданных автомобилей составляют автомобили цена которых больше 18 и меньше 27 тысяч.



Биномом называется двучлен. Рассмотрим различные степени бинома. В разложении квадрата и куба суммы существует определённая закономерность.

$$(a + b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$$

$$(a + b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$$

Так, показатель степени первого члена равен степени бинома, показатель каждого следующего первого члена a уменьшается на единицу, а второго члена b возрастает на единицу. Коэффициенты первого и последнего членов равны 1.

Последовательность степеней суммы a и b можно продолжить последовательно разлагая бином. Проследим, по какому правилу производится разложение.

$$(a + b)^4 \text{ можно записать как } (a + b)^4 = (a + b)(a + b)(a + b)(a + b).$$

Произведение каждого a или b равно сумме всех различных произведений четырёх множителей.

Рассмотрим всевозможные варианты в произведений из 4-х множителей.

- Все множители равны члену a . Получим член a^4 и такой ${}_4C_0$ или 1 возможный вариант, и коэффициент этого члена равен 1.
- Один из множителей равен b , 3 - члену a . Получим член a^3b и такой ${}_4C_1$ или 4 возможных варианта, и коэффициент этого члена равен 4.
- Два из множителей равны b , 2 - члену a . Получим член a^2b^2 и такой ${}_4C_2$ или 6 возможных варианта, и коэффициент этого члена равен 6.
- Три из множителей равны b , 1 - члену a . Получим член ab^3 и такой ${}_4C_3$ или 4 возможных варианта, и коэффициент этого члена равен 4.
- Все множители равны члену b . Получим член b^4 и такой ${}_4C_4$ или 4 возможных варианта, и коэффициент этого члена равен 1.

Разместим степени биномов, биномиальные разложения и коэффициенты членов в таблицу.

Бином	Выражение разложения бинома	Треугольник Паскаля
$(a + b)^0$	1	1
$(a + b)^1$	$1a + 1b$	1 1
$(a + b)^2$	$1a^2 + 2ab + 1b^2$	1 2 1
$(a + b)^3$	$1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$	1 3 3 1
$(a + b)^4$	$1a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + 1b^4$	1 4 6 4 1

Как видно, расположения коэффициентов обладают интересным математическим свойством и образуют треугольник Паскаля.

6-ая строка треугольника Паскаля формируется следующим образом.

$$\begin{array}{cccccc}
 & 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \\
 & & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \\
 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1 \\
 {}_6C_0 & {}_6C_1 & {}_6C_2 & {}_6C_3 & {}_6C_4 & {}_6C_5 & {}_6C_6
 \end{array}$$

Можно записать общую форму для биномиального разложения.

Разложение бинома

Для произвольных чисел a, b и числа $n \geq 0$ справедливо равенство:

$$(a + b)^n = {}_nC_0 a^n b^0 + {}_nC_1 a^{n-1} b^1 + {}_nC_2 a^{n-2} b^2 + \dots + {}_nC_{n-1} a^1 b^{n-1} + {}_nC_n a^0 b^n$$

В более короткой форме эту формулу можно записать при помощи знака “ Σ ” **сигма**.

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n {}_nC_k a^{n-k} b^k$$

В разложении бинома $(a + b)^n$ существует $n + 1$ член. Любой $(k+1)$ член имеет вид $T_{k+1} = {}_nC_k a^{n-k} b^k$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$)

- в разложении бинома n -ой степени присутствует $n + 1$ член
- любой биномиальный член можно найти по формуле $T_{k+1} = {}_nC_k a^{n-k} b^k$
- сумма степеней любых членов равна n
- сумма биномиальных коэффициентов равна 2^n .

$${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \dots + {}_nC_{n-1} + {}_nC_n = 2^n$$

Проверьте последнее равенство для $a = b = 1$.

При разложении степеней бинома коэффициенты слагаемых отличаются от биномиальных коэффициентов.

Пример. $(x + 2)^5 = {}_5C_0 x^5 + {}_5C_1 x^4 \cdot 2 + {}_5C_2 x^3 \cdot 2^2 + {}_5C_3 x^2 \cdot 2^3 + {}_5C_4 x \cdot 2^4 + {}_5C_5 2^5 =$
 $= x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32$

Например, в данном разложении коэффициент третьего слагаемого равен 40, а его биномиальный коэффициент равен ${}_5C_2 = 10$.

Пример. найдём четвёртый член разложения бинома $(2p - 1)^6$

Решение: Здесь $a = 2p, b = -1, n = 6$, тогда

$$T_4 = T_{3+1} = {}_6C_3 \cdot a^{6-3} \cdot b^3 = 20 \cdot (2p)^3 \cdot (-1)^3 = -160p^3$$

Обучающие задания

1. Сколько членов в разложении следующих биномов?

а) $(x - 3y)^5$

б) $(2z + 3z^2)^7$

в) $(c + 6)^q$

г) $(c + 6)^{k-2}$

2. Запишите следующие разложения.

а) $(x - 3)^4$

б) $(x + 2)^5$

в) $(1 + 2c)^6$

г) $(1 - y)^5$

3. Найдите следующие члены бинома.

а) 5-й член для $(x + y)^8$

в) 7-й член для $(1 - 2z)^{12}$

д) 2-й член с конца для $(u^2 + 1)^6$

б) 4-й член для $(a - 2b)^5$

г) средний член для $(2x + y)^4$

е) 3-й член с конца для $(x - y)^{10}$

4. Не разлагая бином $(x + y)^{10}$ найдите:

а) Количество членов в разложении бинома.

б) 6 член в разложении бинома

г) Какому члену принадлежит биномиальный коэффициент ${}_{10}C_r$ с наибольшим значением?

5. Запишите биномиальное разложение в виде $(a + b)^n$, $n \in \mathbb{N}$.

а) ${}_4C_0z^4 + {}_4C_1z^3t + {}_4C_2z^2t^2 + {}_4C_3zt^3 + {}_4C_4t^4$

б) ${}_5C_0m^5 + {}_5C_1m^4y + {}_5C_2m^3y^2 + {}_5C_3m^2y^3 + {}_5C_4my^4 + {}_5C_5y^5$

6. Запишите схожие и различные свойства биномиальных разложений $(x + y)^3$ и $(x - y)^3$. Обобщите полученное для $(x - y)^n$.

7. Выразите через комбинезоны следующие строки треугольника Паскаля.

а) 1 5 10 10 5 1

б) 1 7 21 35 35 21 7 1

в) 1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

8. Ильгар утверждает, что каждую строку треугольника Паскаля можно выразить в виде 11^n . Проверьте утверждение Ильгара.

9. Выполните для треугольника Паскаля

а) Найдите сумму членов каждой строки треугольника Паскаля.

б) Найдите сумму членов 9-й строки треугольника Паскаля.

в) Найдите сумму членов n -ой строки треугольника Паскаля.

г) Примените это свойство при разложении биномиальных коэффициентов.

			1					
			1	1				
			1	2	1			
			1	3	3	1		
			1	4	6	4	1	
			1	5	10	10	5	1

10. а) Найдите коэффициент второго члена, если сумма биномиальных коэффициентов в разложении бинома $(x + 2)^n$ равна 16.

б) Найдите в разложении $(x + \frac{1}{x})^8$ член, не зависящий от x .

Испытания Бернулли

Для того, чтобы понять схему Бернулли рассмотрим следующий пример.

Задача. В урне 3 зеленых и 1 красный шар. Из нее вынимают каждый раз один шар. Зеленый шар считается удачным (победителем), а красный шар считается неудачным (проигравшим) результатом. Вынутый шар каждый раз возвращается в урну. Игра повторяется 4 раза. Найдите вероятность возможных вариантов выигрыша.

Если в игре вероятность выигрыша (появления зелёного шарика) равна $\frac{3}{4}$, то вероятность проигрыша (появления красного шарика) равна $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$. Вычислим вероятность изменения числа побед и поражений в 4 играх.



$$1) P(\text{вероятность выигрыша во всех 4 играх}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{81}{256}$$

$$2) P(\text{вероятность проигрыша во всех 4 играх}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{256}$$

3) Найдём варианты выигрыша в 3 из 4 игр и соответствующую вероятность:

$$(В,В,В,П) \quad P(\text{выигрыш во всех играх кроме 4}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{27}{256}$$

$$(В,В,П,В) \quad P(\text{выигрыш во всех играх кроме 3}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{27}{256}$$

$$(В,П,В,В) \quad P(\text{выигрыш во всех играх кроме 2}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{27}{256}$$

$$(П,В,В,В) \quad P(\text{выигрыш во всех играх кроме 1}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{27}{256}$$

Количество вариантов победы игрока в 3 из 4 игр можно вычислить при помощи комбинезона ${}_4C_3 = \frac{4!}{3!} = 4$. Вероятность вариантов имеет равные возможности $\left(\frac{3}{4}\right)^3 \left(\frac{1}{4}\right)^1$. Тогда вероятность этого события можно вычислить так:

$$P(\text{выигрыш в 3 из 4 игр}) = {}_4C_3 \left(\frac{3}{4}\right)^3 \left(\frac{1}{4}\right)^1 = 4 \cdot \frac{27}{64} \cdot \frac{1}{4} = \frac{108}{256}$$

Аналогичным образом исследуются другие ситуации.

4) Выигрыш в 2 играх из 4.

$$P(В,В,П,П) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{9}{256}$$

Количество возможных вариантов выигрыша в 2 играх из 4:

$${}_4C_2 = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6 \quad \text{То есть вероятность победы в каждом из 6 случаев} \frac{9}{256}.$$

$$P(\text{выигрыш в 2 из 4 игр}) = {}_4C_2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 6 \cdot \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{16} = \frac{54}{256}$$

5) Вероятность победы в 1 из 4 игр.

$$P(B, П, П, П) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \left(\frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{3}{256}$$

$$P(\text{выигрыш в 1 из 4 игр}) = {}_4C_1 \left(\frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 = 4 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{64} = \frac{12}{256}$$

Мы нашли вероятности выигрыша команды в 4, 3, 2, 1, 0 играх. Если эти вероятности вычислены верно, то их сумма должна равняться единице.

$$P(4 \text{ выиг.}) + P(3 \text{ выиг.}) + P(2 \text{ выиг.}) + P(1 \text{ выиг.}) + P(0 \text{ выиг.}) = 1.$$

$$\text{Выполним проверку: } \frac{81}{256} + \frac{108}{256} + \frac{54}{256} + \frac{12}{256} + \frac{1}{256} = 1$$

Представленная задача называется биномиальными испытаниями, так как в задачах такого типа в соответствии с ситуацией возможно использовать члены биномиального разложения. Например, задача выше соответствует разложению биномиальных членов

$$(a + b)^4 = {}_4C_0 a^4 + {}_4C_1 a^3 b + {}_4C_2 a^2 b^2 + {}_4C_3 a b^3 + {}_4C_4 b^4$$

Иногда их называют испытаниями Бернулли. Для данной задачи введём переменные p (выигрыш) и q (проигрыш). При биномиальном разложении можно увидеть соответствие каждого члена реальной ситуации.

$$(p + q)^4 = {}_4C_0 p^4 + {}_4C_1 p^3 q + {}_4C_2 p^2 q^2 + {}_4C_3 p q^3 + {}_4C_4 q^4$$

Здесь p вероятность успеха (появление красного шара) и $p = \frac{3}{4}$, q вероятность неудачи (появление зелёного шара) $q = \frac{1}{4}$.

Испытания Бернулли и вероятность

Если для n независимых испытаний вероятность успешного события p , тогда m вероятность успеха, $n - m$ вероятность неудачи и


$$P(n \text{ испытаний, } m \text{ успех}) = {}_n C_m p^m q^{n-m}.$$

Биномиальное распределение или испытания Бернулли справедливы только при следующих условиях.

- У каждого испытания есть только два результата (“успех”, “неудача”).
- Известно количество испытаний.
- Испытания независимы.
- Вероятность успеха должно быть постоянной для всех испытаний.

Исследуем испытания Бернулли схематично на следующем примере.

Пример 1. Колесо состоит из 4 одинаковых частей - 3 части красные и одна белая. При вращении колесо может остановиться или на красной части или на белой. На схеме представлены возможные положения колеса при трех вращениях.



Как видно, коэффициенты равны числам 3-й строки треугольника Паскаля:

$$1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$$

Также возможно увидеть связь с биномиальным разложением

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3. \text{ Здесь } a = \frac{3}{4} \text{ и } b = \frac{1}{4}.$$

Для этих событий проверьте формулу Бернулли

$$\text{для } P(m \text{ красн.}) = {}_3C_m \left(\frac{3}{4}\right)^m \left(\frac{1}{4}\right)^{3-m}, \text{ при } m = 0, 1, 2, 3.$$

Пример 2. Для каждого из 5 вопросов существует 4 варианта ответа. Найдите вероятность того, что Наргиз наугад ответила верно на 4 вопроса. Установите связь между вероятностью и биномиальным разложением.



Решение: Найдём возможные варианты, что Наргиз даст 5 верных или не верных ответов:

$$(p + n)^5 = {}_5C_0 p^5 + {}_5C_1 p^4 n + {}_5C_2 p^3 n^2 + {}_5C_3 p^2 n^3 + {}_5C_4 p n^4 + {}_5C_5 n^5$$

Из схемы видно, что существует 5 различных вариантов 4 верных ответов на 5 вопросов. Значит, вероятность этого события будет ${}_5C_4 p^4 n$. Аналогичным образом можно увидеть связь между другой ситуацией и биномиальными членами.

п	п	п	п	п
п	н	п	п	п
п	п	н	п	п
п	п	п	н	п
п	п	п	п	н

Обобщим эту связь при помощи таблицы.

Коэффициент	Член	Смысл ситуации
${}_5C_0 = 1$	p^5	1 вариант, что все 5 ответов правильные
${}_5C_1 = 5$	p^4n	5 вариантов, что 4 правильных, 1 неправильный
${}_5C_2 = 10$	p^3n^2	10 вариантов, что 3 правильных, 2 неправильных
${}_5C_3 = 10$	p^2n^3	10 вариантов, что 2 правильных, 3 неправильных
${}_5C_4 = 5$	pn^4	5 вариантов, что 1 правильный, 4 неправильных
${}_5C_5 = 1$	n^5	1 вариант, что все 5 ответов неправильные

Найдём, случайным образом, вероятность 4 правильных и 1 неправильного ответов. Вероятность каждого правильного ответа $\frac{1}{4}$, вероятность неправильного $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

$$P(4п, 1н) = 5p^4n = 5\left(\frac{1}{4}\right)^4 \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{1024} \text{ или } \approx 1,5\%$$

Аналогично, найдите вероятность всех возможных ситуаций, сложите их и найдите их сумму. Проверьте, что данная сумма равна 1 (или 100%).

Пример 3. Найдите вероятность того, что в одной из четырёх семей, в которых есть дети, есть 3 мальчика и 1 девочка.

Решение: Для каждого ребёнка существует два возможных варианта: или мальчик или девочка. Вероятность каждого из двух равна $\frac{1}{2}$.

$$P(n \text{ испытаний, } m \text{ успех}) = {}_nC_m p^m q^{n-m}. \quad n = 4, m = 3, p = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2};$$

$$P(4 \text{ ребёнка, } 3 \text{ мальчика}) = {}_4C_3 p^3 q^{4-3} = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Значит, вероятность того, что из 4 детей 3 мальчика, равна $\frac{1}{4}$ или 25%.

В биномиальном разложении член соответствующий ситуации показан красным цветом. $(m + d)^4 = m^4 + 4\overline{m^3d} + 6m^2d^2 + 4\overline{md^3} + d^4$ $P(4 \text{ ребёнка, } 3 \text{ мальчика})$

Пример 4. Фирма проводит акцию по продаже детского питания. В каждую коробку был положен купон так, что 3 из каждых 20 являются выигрышными. Какова вероятность того, что среди 5 коробок детского питания 2 окажутся с выигрышными купонами?

Решение: успешным событием является наличие выигрышного купона:

$$P(\text{есть купон с выигрышем}) = \frac{3}{20}$$

Неудачным событием, отсутствие купона с выигрышем:

$$P(\text{нет купона с выигрышем}) = 1 - \frac{3}{20} = \frac{17}{20}$$

$$P(5 \text{ коробок } 2 \text{ выигрыша}) = {}_5C_2 p^2 q^3 = 10 \left(\frac{3}{20}\right)^2 \left(\frac{17}{20}\right)^3 \approx 0,138$$

Пример 5. Монету подбросили 10 раз. Какова вероятность того, что как минимум 8 раз монета упадёт цифрой?

Решение: если событие, что монета упадёт как минимум 8 раз цифрой является успешным, значит, если цифра выпадет и 9 и 10 раз, то эти события также будут успешными. Найдём вероятности каждого события в отдельности и сложим их. Вероятность успеха в каждом опыте равна $\frac{1}{2}$.

P (как минимум 8 раз цифрой) = P (8 цифрой) + P (9 цифрой) + P (10 цифрой)

$$\begin{aligned} P \text{ (как минимум 8 раз цифрой)} &= {}_{10}C_8 p^8 q^2 + {}_{10}C_9 p^9 q^1 + {}_{10}C_{10} p^{10} q^0 = \\ &= 45 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^9 \left(\frac{1}{2}\right)^1 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{56}{1024} \approx 0,55 \end{aligned}$$

1. Какие события можно назвать биномиальным распределением?

- а) Кямал на 20 тестов по предмету химия даёт ответы случайным образом, выбирая один из четырёх.
- б) Пластиковый стакан подбрасывают 50 раз и считают сколько раз он упадёт на лицом вверх и лицом вниз .
- в) Игральный кубик подбрасывают 100 раз и проверяют равна ли вероятность того, что он выпадет каждой гранью равное количество раз.
- г) Игральный кубик подбрасывают 100 раз и проверяют, сколько раз на верхней грани выпадет число 4.

2. Монету подбрасывают 5 раз. Какова вероятность, что на верхней грани окажется цифра:

- а) P (1 раз); б) P (3 раза); в) P (4 раза); г) P (0 раз); д) P (2 раза)


3. Вероятность выигрыша баскетбольной команды равна $\frac{2}{3}$. Какова вероятность, что команда в следующих 5 играх выиграет 3?

4. Последние исследования показывают, каждый из 3 новых автомобилей продаётся в кредит. Вычислите вероятность, что из 4 выбранных случайным образом автомобилей 3 были куплены в кредит.

5. При проверке оказалось, что 2% деталей, изготавливаемых на конвейере за один период оказались бракованными. Найдите вероятность, что из 5 взятых случайным образом деталей бракованными окажутся:

- а) P (только 2) б) P (как максимум 1) в) P (как максимум 2)




6. В коробке 6 шаров. Запишите соответствующее биномиальное разложение для ситуаций, если из коробки вытаскивают шар, затем возвращают в коробку. Испытание повторяют 6 раз. Успешным событием является появление зелёного шара. Заполните таблицу в тетради. Проверьте решения, зная, что сумма вероятности всех событий равна 1.




Ситуация	Биномиальный член
6 зелёных	${}_6C_0 p^6$
5 зелёных 1 красный	${}_6C_1 p^5 q^1$
4 зелёных 2 красных	${}_6C_2 p^4 q^2$
...	...
Биномиальное разложение: $(p + q)^x = \dots$	

7. Из 1000 CD дисков при проверке 50 оказались бракованными.
- Какова вероятность того, что выбранный случайным образом диск будет бракованным?
 - Если контролёр, проверяющий качество, взял, случайным образом, 6 дисков, то вычислите вероятность соответствующую ситуации, что бракованными оказались:
 - всего 2 диска; • как максимум 2 диска; • как минимум 3 диска.

8. В ящике 3 белых, 4 зелёных, 2 красных шара. Если случайным образом вытащить два шара, то используя схему, вычислите вероятность, что оба шара окажутся белыми. Какие события отражает каждая схема? Запишите в письменной форме примеры, показывающие общие и различные характеристики данного события.



1. Из коробки, в которой 2 красных и 3 белых шара случайно берут шар, который затем возвращают в коробку. Испытание повторяют 3 раза.
 а) Найдите вероятность, что 1-ый и 2-ой шар окажутся белыми, а 3-ий шар будет красным.
 б) Найдите вероятность, что из 3-х шаров 2 белого цвета.
2. Монету подбросили 4 раза. Найдите вероятность следующих событий.
 а) $P(4 \text{ раза вверх гербом})$ б) $P(\text{как минимум 3 раза вверх цифрой})$
 в) $P(\text{как максимум 2 раза вверх гербом})$ г) $P(0 \text{ раз вверх цифрой})$
3. Запишите разложение бинома $(z + c)^5$ событий при подбрасывании монеты. Объясните ситуацию, соответствующую каждому члену бинома. Вычислите вероятность соответствующих событий.
4. Докажите, что ${}_nC_k = {}_nC_{n-k}$. Проверьте тождество для следующих значений: $n = 7, k = 5$.
5. На гистограмме показана масса индюшек на ферме. По данным гистограммы, составьте таблицу частот. Какова вероятность того, что при выборе случайным образом двух индюшек, их масса будет больше 10 кг?
- 
- | Масса (кг) | Число |
|------------|-------|
| 7-8 | 1 |
| 8-9 | 7 |
| 9-10 | 13 |
| 10-11 | 5 |
| 11-12 | 2 |
| 12-13 | 2 |
6. Из коробки, в которой 4 белых и 2 зелёных шара, случайным образом вытаскивают 3 шара.
 а) Какое событие более вероятно (в соответствии с цветом)?
 б) Найдите вероятность, что из 3-х шаров, как минимум, 2 будут белыми.
7. Сколько различных вариантов прочтения можно составить из букв слова?
 а) ТУРАН б) ГАБАЛА
8. Вероятность того, при каждом выстреле стрелок поразит цель равна 0,8. Производится 4 выстрела. Найти вероятность 2-х попаданий.
9. Мустафа хочет позвонить другу, но забыл 2 последние цифры номера. Найдите вероятность того, что Мустафа наберёт номер правильно с первого раза, если известно, что цифры, которые забыл Мустафа разные.
10. Как пять человек (А, В, С, D и Е) могут различными способами быть построены в ряд, при условии, что:
 а) Е стоит посередине;
 б) А и В обязательно стоят рядом;
 в) А и В не будут стоять рядом.

1. Цена автомобиля после его покупки в первый год снижается на 20%, а в каждый последующий год на 8%. Сколько будет стоить автомобиль, купленный в 2015 году за 25 тыс. манат, в 2022 году?
2. В классе 19 учеников. Из них 10 человек занимаются шахматами, 7 футболом, 3 человека занимаются в обоих кружках. Сколько учеников не занимается ни в одном кружке?
3. Имеется два вида стали с 5% и 2% содержанием никеля. Сколько килограмм стали двух сортов надо взять, чтобы получить 360 кг стали с 2,5% содержанием никеля?
4. При каких значениях c следующие неравенства справедливы при всех значениях x ?
- а) $x^2 + cx + 4 > 0$ б) $x^2 + 3x + c > 0$
5. Последовательность задана рекуррентной формулой $b_1 = 4$, $b_{n+1} = 3b_n - 2$. Запишите формулу n -го члена.
6. Фермер, применяя новые технологии, добился повышения урожая на один и тот же процент ежегодно, и за 2 года урожай вырос с 150 тонн до 216 тонн. На сколько процентов ежегодно изменялся урожай?
7. а) Вычислите: $\sqrt[3]{(2 \sin 60^\circ - 1)^3} - \sqrt{(1 - \operatorname{tg} 60^\circ)^2}$
 б) Упростите значение выражения $\sqrt{4 \cos^2 \alpha + 4 \cos \alpha + 1} - \sqrt{4 - 4 \sin^2 \alpha}$, при $\frac{2\pi}{3} < \alpha < \pi$.
8. а) Если $\sin \alpha = \frac{40}{41}$, $\sin \beta = -\frac{9}{41}$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < \beta < 0$. Найдите угол $\alpha - \beta$.
 б) Если $\tan \alpha = 3$, $\tan \beta = -\frac{1}{2}$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < \beta < 0$. Найдите угол $\alpha + \beta$.
 в) Если $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$, то найдите значение выражения $(1 + \tan \alpha) \cdot (1 + \tan \beta)$.
9. Найдите значение выражения.
 а) $\cos 24^\circ - \cos 84^\circ - \cos 12^\circ + \sin 42^\circ$
 б) $\tan 9^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ - \tan 27^\circ$
10. Даны $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $g(x) = \sin x$. Найдите:
 а) $f(g(x))$ б) $g(f(x))$

11. Решите уравнения.

а) $4 \cos^2 x - 3 \sin x = 3$

б) $2 \tan x - 3 \cot x - 1 = 0$

в) $\sin x + \sin 3x + \sin 5x = 0$

г) $\cos 3x - \cos 4x = 1 - \cos x$

12. Найдите корни уравнения, принадлежащие промежутку.

а) $\sin x = -1, x \in [0; 4\pi]$

б) $\cos x = 1, x \in [-\pi; 3\pi]$

13. Дана функция $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$

а) Найдите область определения функции.

б) Решите неравенство $f(x+1) \geq 0$.

14. а) Для функции $y = 3 + \sqrt{x-4}$ найдите обратную функцию.

б) Для функции $y = \log_{\frac{1}{2}}(5 + 3 \cos x)$ найдите множество значений.

15. За один период синусоида достигает максимума в точке (1;4) и минимума в точке (3; -2). Найдите амплитуду и период этой функции, напишите формулу.

16. Найдите амплитуду, период заданной функции, постройте график.

а) $y = \sqrt{3} \sin x - \cos x$

б) $y = \sin x + \cos x$

17. Решите уравнения.

а) $0,5x^2 \cdot 2^{2x+2} = \frac{1}{64}$

б) $0,2^{x-1} - 0,2^{x+1} = 4,8$

в) $5^{x-1} + 5 \cdot 0,2^{x-2} = 26$

г) $9^{x-1} - 36 \cdot 3^{x-3} + 3 = 0$

д) $\log_{x-1} 2 = -0,5$

е) $\log_5(2 + \log_3(3+x)) = 0$

ж) $\log_2(2^{2x} + 16^x) = 2 \log_4 12$

з) $\log_5 3 = -\frac{\log_2(1+x)}{\log_2 5}$

и) $\lg^2 x - 3 \lg x = \lg x^2 - 4$

к) $\log_{3x} \frac{3}{x} + \log_3^2 x = 1$

18. Решите неравенства.

а) $\left(\frac{3}{7}\right)^{2x} < 5 \frac{4}{9}$

б) $0,9^x \geq 1 \frac{19}{81}$

в) $(x^2 - 2x - 3) \cdot (2^x - 8) \leq 0$

г) $2^{\tan x} > \sin \frac{5\pi}{6}$

д) $\log_{\frac{1}{4}}(2x+3) > \log_{\frac{1}{9}} 27$

е) $\frac{\log_3(6-2x)}{\log_{0,3} 5} > 0$

ж) $\log_3(2x-3) + \log_{\frac{1}{3}}(x+1) > 0$

з) $\log_{\frac{1}{2}}|3-x| > -1$

- 19.** На окружности отмечены 10 точек. Сколько можно построить треугольников с вершинами в данных точках?
- 20.** В ящике 30 чёрных и x белых шаров. Если вероятность того, что случайно выбранный шар белого цвета равна $\frac{2}{5}$, то найдите x .
- 21.** Вычислите сумму
 $2^0 \cdot {}_6C_0 + 2^1 \cdot {}_6C_1 + 2^2 \cdot {}_6C_2 + 2^3 \cdot {}_6C_3 + 2^4 \cdot {}_6C_4 + 2^5 \cdot {}_6C_5 + 2^6 \cdot {}_6C_6$.
- 22.** Через конец рёбер, выходящих из одной вершины прямоугольного параллелепипеда с размерами 3 см, 4 см и 7 см проведена плоскость. Найдите площадь сечения.

- 23.** а) Дано:


$$AO \perp \alpha$$

$$\angle ACO = \angle ABO = 60^\circ$$


$$\angle COB = 90^\circ$$

$$AO = 3$$

Найдите: BC



- б) Концы отрезка AB , пересекающего плоскость, находятся на расстоянии 16 см и 4 см. Найдите расстояние от середины M до плоскости.




- 24.** Размеры прямоугольного параллелепипеда равны $AD = 20$ см, $AB = 10$ см, $AE = 15$ см.

а) найдите градусные меры углов $\angle AFB$, $\angle BFO$, $\angle AFO$, $\angle BOF$, $\angle AOF$, $\angle OFC$;

б) найдите площади треугольников $\triangle ABO$, $\triangle BOF$, $\triangle AOF$;

в) наименьшее расстояние от точки B до плоскости AOF .



- 25.** Площадь основания прямой треугольной призмы равна 16 см^2 , площади боковых граней, соответственно, 36 см^2 , 40 см^2 , 68 см^2 . Найдите объём призмы.

- 26.** Найдите область определения функций.

а) $y = \frac{x+5}{x^2-3x+4}$ б) $y = \sqrt{\frac{2}{3}x-4}$

- 27.** Найдите косинус меньшего угла треугольника со сторонами 4 см, 5 см и 6 см.

- 28.** При каком значении параметра m сумма квадратов корней уравнения $x^2 + (2 + m)x + m - 3 = 0$ будет наименьшей?
- 29.** Дорога из пункта А до пункта В состоит из подъёма и спуска. Длина дороги на подъёме составляет 12 км, а на спуске 24 км. Всадник преодолел путь от пункта А до пункта В за 7 часов, и обратный путь за 8 часов. Найдите скорость при подъёме и спуске.
- 30.** Представьте графическое решение системы $\begin{cases} y = x^2 + a \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$ и определите:
 а) при каких положительных значениях a система имеет два решения;
 б) при каких значениях a система может иметь три решения;
 в) существуют ли значения a , при которых система имеет четыре решения?
- 31.** На трёх складах 920 т зерна. На первом складе зерна на 30 тонн меньше, чем на втором, масса зерна на втором и третьем складе относится как 8 : 9. Сколько тонн зерна на каждом складе?
- 32.** Стороны треугольника равны 10 см и 12 см, а синус угла между ними равен 0,6. Найдите периметр треугольника. Сколько решений имеет данная задача?
- 33.** Найдите биссектрисы треугольника со сторонами 4 дм, 6 дм и 6 дм.
- 34.** Найдите медианы треугольника со сторонами 4 см, 6 см и 8 см.
- 35.** Найдите амплитуду, частоту и основной период гармонического колебания, заданного формулой $y = -2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$.

- 36.** Дано: правильная четырёхугольная призма


$$B_1M = MC_1$$

$$C_1N = ND_1$$


$$AB = BC = 8$$

$$AA_1 = 4$$

Найдите: площадь четырёхугольника $BMND$



- 37.** Найдите площадь полной поверхности тетраэдра на рисунке.




- 38.** Найдите стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды, если боковое ребро равно 5 см, а площадь полной поверхности равна 84 см^2 .

39. Найдите объём правильной четырёхугольной призмы, если её диагональ равна 6 см, а площадь боковой поверхности 32 см².
40. Найдите координаты точек, принадлежащих окружности заданной уравнением $x^2 + y^2 = 25$, ординаты которых на 1 единицу больше абсциссы. Сколько существует таких точек?
41. В арифметической прогрессии $a_1 + a_2 + a_3 = 30$, $a_1^2 + a_2^2 = 116$. Зная, что член a_5 делится на 13 без остатка, найдите a_1 .

42. Сколько существует пятизначных чисел, которые читаются одинаково слева направо и справа налево (например, как 67876)?

43. Согласно статистике, население Земли в 2020 году составляло около 7,8 млрд человек. Если ежегодный прирост населения составит в среднем 1,02%, какой будет численность населения мира в 2025 году?

44. Запишите формулу графика на рисунке как при помощи функции синуса, так и при помощи функции косинуса.



45. Постройте график функции $y = 2 \sin 3x + 3$ по 5 точкам. При помощи этого графика построьте график функции $y = 2 \sin 3(x - \frac{\pi}{3}) + 3$.

46. Диаметр колеса автомобиля равен 50 см. Какое расстояние пройдёт автомобиль, если колесо сделает: а) 5 оборотов; б) 500 оборотов?


47. При остывании воды в чашке, ожидается изменение температуры от 100° до комнатной (20°). В результате наблюдения установлено, что температура изменяется от времени в экспоненциальной зависимости, снижаясь за каждые 1 минут на 5%.

- а) Смоделируйте зависимость температуры от времени в виде $y = ab^x + c$.
 б) Через сколько минут разность температур станет равна: 1) 10°C; 2) 1°C

48. При извержении вулкана в углях сгоревших деревьев осталось 45% Углерода 14. Сколько лет назад произошло извержение вулкана?

49. Гасан спросил у бабушки, сколько ей лет. Бабушка сказала: “Я пошла в школу в 5 лет и четвертую часть жизни посвятила учению, после чего начала работать, и это составило половину моей жизни. Сейчас, уже как 15 лет, присматриваю за внуками. Вот и посчитай, сколько же мне лет?” Посчитайте сколько лет бабушке Гасана.

- 50.** Определите новые координаты, при:
- повороте точки с координатами (5;3) относительно начала координат на угол 90° в направлении против часовой стрелки.
 - повороте точки с координатами (4;2) относительно начала координат на угол 180° в направлении по часовой стрелке.
 - отображении точки с координатами (3;2) относительно оси y , с последующим поворота на $\frac{3}{4}$ части полного (360°) оборота.
 - перемещении вправо на 3 единицы точки с координатами (2;3), с последующим поворотом на угол 90° в направлении против часовой стрелки.




- 51.** На рисунке изображены три полуокружности. Зная, что $d = 18$ см, найдите площадь закрашенной части.

- 52.** Следующая информация показывает количество осадков, выпавших в течении месяца (с точностью до 0,1 мм). Представьте информацию в виде диаграммы “ствол-листья”:

1.3, 2.0, 2.3, 3.2, 3.4, 1.8, 3.1, 2.3, 1.9, 2.6,
1.6, 0.0, 2.4, 3.1, 0.6, 0.7, 0.3, 0.0, 2.2, 1.5,
3.6, 2.3, 1.8, 2.7, 3.0, 2.9, 1.2, 2.2, 1.4, 3.3

- 53.** Барграф отражает информацию о победных играх трёх команд за последние 4 лет. Какие из следующих утверждений верные?

- Команда -3 всегда на втором месте.
- Команда -1 имеет самые высокие результаты.
- Команда -1 выиграла игр больше, чем Команда -3.
- Команда -2 каждый следующий год выигрывала больше игр, чем в предыдущий.



- 54.** Рашад член клуба в стрельбе по мишеням. Его результаты показывают, что 80% сделанных им выстрелов попадают в цель.
- Найдите вероятность, что следующий выстрел Рашада попадет в цель.
 - Найдите вероятность, что Рашад попадет в цель, стреляя 3 раза подряд.
 - Найдите вероятность, что при первом выстреле Рашад попадет в цель, а при втором - нет.

55. **Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису.** Протяженность автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, соединяющей Гейгёльский и Кяльбаджарский районы, составляет 80,7 км. Здесь в зимний сезон в условиях сильного снега и мороза безопасная эксплуатация дороги может оказаться невозможной. Поэтому вместо строительства 31,5 км дороги на территории со сложным рельефом было сочтено более целесообразным построить тоннель длиной 11,6 км под хребтом Муровдаг.

- Изобразите схематично приведенные в тексте информации.
- Оцените высоту и ширину туннеля по картинке внизу. Какие детали на картинке лучше всего использовать?
- Найдите приблизительное количество грунта, извлеченного при проходке туннеля. Какие расчеты для этого нужно сделать?



56. Найдите высоту бака, в форме прямоугольного параллелепипеда, если стороны основания равны 50 см и 80 см, а вместимость составляет 400 л.

57. По данным рисунка определите, какие равенства верны.


а) $h = \sqrt{a_1 \cdot a_2}$

б) $h = \sqrt{b^2 - a_2^2}$

в) $h = \tan \beta \cdot a_1$

г) $h = \sin \beta \cdot c$

д) $h = \frac{b \cdot \sin \beta}{\sin 90^\circ}$



58. Для облицовки террасы мастер взял 400 каменных плит. $\frac{4}{5}$ часть из них относятся к первому сорту, а остальные ко второму. При покупке предупредили, что 5% плиток первого сорта и 15% плиток второго сорта могут быть бракованными. Если мастер возьмет одну плиту, какова вероятность того, что она окажется бракованной?

- 66. Какой автомобиль выгоднее купить?** При покупке автомобиля часто возникает вопрос, какую машину купить - машину с бензиновым или дизельным двигателем? Анализ затрат в течение года может помочь вам при выборе. Журнал, в котором публикуются статьи об автомобилях, предоставляет следующую информацию по марке автомобиля:

	Бензиновый двигатель	Дизельный двигатель
Годовые фиксированные расходы *)	↗ 2200	↗ 2400
Среднее потребление топлива на 100 км	8,0 литр	6,0 литр

*) фиксированные расходы, имеется в виду налоги, страховка, замена масла, ремонт и т.д.

1 литр бензина - $0,90^{\text{р}}$, а 1 литр дизельного топлива - $0,70^{\text{р}}$.

Заполните таблицу

Пробег за год	Бензиновый двигатель: годовой расход топлива	Бензиновый двигатель: общий годовой расход (расход топлива+фикс. расходы)	Дизельный двигатель: годовой расход топлива	Дизельный двигатель: общий годовой расход (расход топлива+фикс. расходы)
10 000 км				
20 000 км				
30 000 км				

б) Подсчитайте, сколько можно сэкономить в год при выборе дизельного автомобиля годовым пробегом 30 тысяч км.

с) Сколько километров должен быть годовой пробег, чтобы общая стоимость автомобиля с дизельным двигателем была ниже, чем стоимость автомобиля с бензиновым двигателем?

г) Новый автомобиль с бензиновым двигателем стоит $32\ 000^{\text{р}}$, новый автомобиль с дизельным двигателем дороже и составляет $34\ 000^{\text{р}}$. Тахир хочет купить новую машину с дизельным двигателем. В среднем он проезжает 30 тысяч км в год. Через сколько лет экономия общих затрат компенсирует разницу в цене?


е) При покупке нового автомобиля необходимо учесть, чтобы его продажа была выгодной через некоторое время. Что касается рассматриваемых здесь автомобилей, то, возможно, что через три года автомобиль с бензиновым двигателем будет продаваться за $14\ 000^{\text{р}}$, а дизельный – за $15\ 000^{\text{р}}$. Как идея продажи устаревшего автомобиля может изменить планы Тахира?

е) Три года назад Тахир вложил $15\ 000^{\text{р}}$ на банковский счет со ставкой 12% годовых. Сколько еще он должен добавить к этой сумме, если он хочет купить новый дизельный автомобиль?


1. Функции

- с. 8-11** №5 0 №6 а) 1; б) -1; в) 7 №8 а) $f(0) = -1; f(1) = 0; f(-1) = -2; f(-2) = -3$
 №9 в) $1 \leq x \leq 4; 1 \leq y \leq 5$ №10 а) $f(-3) = 3; f(-1) = 5; f(0) = 4; f(1) = 3$
 №11 а) $b = -3$ №12 $c = 2$ №13 0 №15 а) $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$; б) $f(-2) = 3$;
 $f(6) = -1$ №16 б) $y = x^2 + 1; -1 \leq x < 2; 1 \leq y < 5$ №19 а) $D(f) = [-6; 2]$;
 $E(f) = [1; 5]$; б) $D(f) = [-4; 4]$; $E(f) = [-1; 8]$
- с. 12-18** №1 б) $x_1 = 0, x_2 = 3$; в) $x = 4$; г) $x = 2$ №4 в) нули $x_1 = -1, x_2 = 3$,
 если $x < -1$ то $y > 0$; если $x > 3$ то $y > 0$, если $-1 < x < 3$ то $y < 0$ №5 а) $y = -\frac{1}{2}x + 3$ ↓
 №6 б) $k = -1$ ↓, $y = -x + 1$, №7 а) 1) $k = 3$; 2) $y = 3x - 2$; 3) ↑
 №9 а) $f(2) < f(0) < f(-4)$; в) $f(\sqrt{2}) < f(-\sqrt{3}) < f(-2)$ №10 а) $f(x) = 2x - 3$;
 б) $f(-4) < f(-3) < f(2)$; в) при $x \geq 1$ №12 2) а) $[-2; 3]$; б) -2 в) 2 ; в) $(-2; 2)$;
 г) $(2; 3]$; д) $[-2; 0]$ ↑, $[0; 3]$ ↓; ж) $[-5; 4]$ №14 а) не четн.;
 б) не четн. не четн.; в) четн. №17 в) 6; г) 4 №19 б) да, в) нет
 №20 1) г) $f(-5) < f(-7)$; 2) убывающ. №21 $(-4; 4)$
- с. 20-23** №2 в) $y = x^3$ №3 а) $y = \frac{4}{x}$ №7 а) да; б) нет №9 а) $f(0,1) > g(0,1)$;
 б) $f(\frac{1}{2}) > g(\frac{1}{2})$; в) $f(2) < g(2)$ №10 а) $-2 < x < 2$ №11 а) 0; б) 5; в) -7; г) 41
 №12 а) 4; б) 0; д) 2


№13 а)



б)



в)




№15 1) 3^n ; 2) нет; 3) 800 №16 б) 416^n .

- с. 24-30** №1 а) $m = 0, n = 4$; г) $m = 7; n = -3$
 №2 б) $g(x) = (x - 2)^2 - 1, y = x^2$; смещение на 2 ед. направо, 1 ед. вниз
 №4 1) б) $g(x) = (x + 3)^2 - 3$; 2) б) $g(x) = f(x - 4) - 8$

№6 а) $y = |x + 4| - 2, m = -4, n = -2$,
 $D(y) = (-\infty; +\infty), E(y) = [-2; +\infty)$;
 б) $y = (x - 6)^2 + 4, m = 6, n = 4$,
 $D(y) = (-\infty; +\infty), E(y) = [4; +\infty)$

№9 а) смещение на 2 ед. вправо
 №11 б) график $y = \sqrt{x}$ отражается относительно оси x и переносится на 1 ед. вверх.

№14 1) а) $y = -3x$; б) $y = -x^2 - 1$;
 в) $y = -\frac{x}{1}$ №18 а) $g(x) = 3|x|$;
 б) $g(x) = -|x|$



c. 32-33 №1 а) 1; в) 2; г) 0 №2 а) 4; б) 50; е) -48

№3 а) $f(g(x)) = 2x^2 - 5$; б) $g(f(x)) = 4x^2 + 4x - 2$ №7 б)

№4 б) $f(g(x)) = 2\sqrt{x^2 + 1}$; $g(f(x)) = \sqrt{4x^2 + 1}$


№5 а) $(-2; 2)$; б) $(-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$;

№8 б) $f(x) = x^2 - 1$; г) $x^2 + x + 1$

№9 б) $f(-1) = -1, f(2) = 5, f(3) = 7, f(0) = 1,$

$f(x) = 2x + 1$ №10 б) $f(2x) = \sqrt{25 - 4x^2}$;

$D = [-2, 5; 2, 5]$ №11 б) $[-2; 6]$; в) $[-3; 1]$



c. 37-38 №4 а) $f^{-1}(9) = -3, f^{-1}(7) = 1, f^{-1}(2) = 6$

№5 а) $y = \frac{1}{4}x$; возраст. в) $y = -\frac{5-x}{2}$; убывающ. №8 1) а) $y = \sqrt[3]{x}$ в) $y = \frac{1+x}{x}$

№11 б) $f^{-1}(x) = -\frac{\sqrt[4]{x}}{2}$; в) $f^{-1}(x) = -\frac{\sqrt[3]{x}}{2}$ №12 а) $F = \frac{9}{5}C + 32$ №13 ≈ 45 см

c. 39-40 №2 б) $D(f) = (-\infty; +\infty), E(f) = [0; +\infty)$; в) $D(f) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty),$

$E(f) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$; д) $D(f) = [0; +\infty), E(f) = [0; +\infty)$ №3 в) $D(f) = (-\infty; 3]$;

г) $D(f) = [-1; 1]$; д) $D(f) = [1; 3) \cup (3; +\infty)$; е) $D(f) = [0; 2) \cup (2; +\infty)$.

№4 б) $D(g) = (-\infty; +\infty), E(g) = (-\infty; 6]$; г) $D(\varphi) = (-\infty; +\infty), E(\varphi) = [3; +\infty)$;

д) $D(u) = [-3; 3], E(u) = [0; 3]$; е) $D(v) = [-1; 3], E(v) = [0; 2]$

№5 а) $D(f) = [0; 1) \cup (1; 2]$; б) $D(f) = (-\infty; 0] \cup (1; 2]$; в) $D(f) = (1; 2]$

№6 НМЗ = 2, $E(f) = [2; +\infty)$ №7 а) $h = \sqrt{9 - d^2}$; б) $D = [0; 3], E = [0; 3]$

c. 41-42 №2 а) на 1 ед. вправо; б) на 3 ед. вниз №3 а) $y = \sqrt{x + 1}$ №4 а) $[0, 5; +\infty)$

в) $(-\infty; 4)$; д) $[0; 3) \cup (3; +\infty)$; е) $[-2; 1) \cup [1; 2)$ №5 д) -2 и 2; е) 5

№6 1) а) четный; б) нечетный №7 $f(2) = 10$ №10 б) -1 и 7

№11 а) 3; в) 11; е) 3; ж) 7 №12 2) а) $f^{-1}(x) = \frac{1+x}{2x}$; б) $f^{-1}(x) = \frac{1+2x}{x+1}$

№13 а) $D(f) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$; б) (2; 5)

2. Точка, прямая, плоскость в пространстве

c. 46-49 №6 б) 1; 4 или бесконечно №8 з) 90° ; и) 45° №9 $\frac{3}{5}$ №14 а) 8 см; б) $\frac{a+b}{2}$

№15 6 см №16 6 см №17 18 см или 22 см

c. 50 №3 а) 6 см; б) 4,5 см; в) $\frac{bc}{a+c}$ №4 а) $\frac{a(b+c)}{b}$ №5 параллельно

c. 54 №1 $x = 6$ №2 а) $8\sqrt{3}$ см; б) 4 см №3 6 см №4 30° №5 $d = 5\sqrt{2}$, $\varphi = 45^\circ$

№6 45° №7 $a\sqrt{6}$ №8 45° №9 а) 17 см, 25 см; б) 6 см, 9 см

c. 57 №2 а) 6 см №3 12 см №4 5 см №5 $\sqrt{15}$ см №6 3 см, №7 1 см

c. 59-63 №2 $a\sqrt{2}$ №3 2,4 см №4 8 №6 $48\sqrt{3}$ см² №7 а) $\frac{3}{8}a^2$; б) $\frac{a^2\sqrt{6}}{8}$ в) $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$

№8 60° №9 $4\sqrt{2}$ см №11 $\sqrt{a^2+b^2}$ №18 17 см

№20 а) 17 см; б) 9 см; в) $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$

s. 65-67 №8 6 см №9 15 см, 6 см, 8 см №10 12 см №11 2 м №12 $\frac{a\sqrt{2}}{2}$

s. 68-69 №2 7,2 м №3 58° №4 а) $\frac{a+b}{2}$; б) $\frac{a-b}{2}$ №5 $2\sqrt{3}$ см №6 б) 13 см или 15 см

№7 16 №9 3 см №10 б) $\frac{a}{2}$; в) $\frac{a\sqrt{6}}{6}$ №11 а) 2 см; б) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ см; в) $\approx 19^\circ$

3. Тригонометрические выражения и их преобразования.



- с. 73-75** №1 в) III четверть №2 б) 150° №5 а) $\approx 1592^\circ$ №7 1) 40° ; $\frac{2\pi}{9}$
 №9 б) $\frac{2\pi}{3} \approx 2,09$ рад №10 в) $-67,5^\circ$ №11 2) $\frac{5\pi}{4}$ №13 б) -40° ; 320°
- с. 77-78** №1 а) $3,4\pi$ см; в) $2,5$ мм №2 а) 10π см; в) 150π см² №3 а) 18π см; б) 32π см
 №4 б) 24 мм, 72 мм №5 а) $\frac{55}{3}\pi$ см² №6 1) 10π см; 2) 270° ; 3) $\approx 106^\circ$
 №7 а) 192π м²; б) 16π рад; 2880°
- с. 80** №1 б) 45π см №2 в) 75π см №3 25 м/сек, $\frac{1}{8}$ рад/сек №4 45π м/мин, №5 54π м
- с. 82-93** №6 а) III четверть, б) III четверть №7 а) отр.; б) полож. №8 а) $2\sin\theta$; б) 0
 №9 $\pm 0,8$ №13 а) две точки, $\pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ №18 а) $\sin 15^\circ < \sin 20^\circ$ в) $\cos 20^\circ > \cos 40^\circ$
 №19 б) $a < d < b < c$; в) $b < c < a < d$ №20 а) $1,5$; б) 1 ; г) $0,5$ №21 б) 2 №22 а) $2\sqrt{3}$
 №25 б) НБЗ = 2 , НМЗ = 0 №26 б) НБЗ = 2 , НМЗ = 1 №30 $\frac{\pi}{3}$ и $\frac{2\pi}{3}$
 №36 а) $\frac{1}{2}$; б) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; в) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; г) $\sqrt{3}$ №37 а) $0,42$; б) $-0,91$
 №38 а) $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $\tan \alpha = -\frac{3}{4}$, $\cot \alpha = -\frac{4}{3}$ №39 а) 0 ; б) 1 ; в) 1
- с. 96-98** №2 а) $\frac{5\pi}{14}$; б) $\frac{3\pi}{10}$ №7 б) $-\sin \alpha$; в) $-\cos \alpha$ №9 б) $-\frac{1}{2}$; г) $-\sqrt{3}$
 №10 а) $-\sin \alpha$ №11 б) $\cos^2 \alpha$ №12 а) $-\sin 10^\circ$ №15 б) 1 ; г) 0
 №16 а) $2\cos \alpha$; б) 0 №18 в) 45° ; 135°
- с. 100-102** №1 е) $\csc^2 \alpha$; з) 1 №2 $\cos \alpha = -0,8$; $\tan \alpha = -0,75$ №5 а) $\tan^2 \alpha$; б) 2
 г) $\frac{2}{\sin \alpha}$ д) $\frac{1}{2}$ №6 а) 5 ; б) $\frac{1}{9}$ №7 а) $2 \cos \alpha$; б) $-2 \cos \alpha$ №9 а) $1 - \frac{1}{16}$
 №10 а) 20 ; б) -16 №11 $-0,32$ №14 а) $\cos^2 \alpha$ №16 а) НБЗ = 3 , НМЗ = -4
 №17 а) 1 ; б) 1 ; г) 0
- с. 105-106** №2 1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ №4 б) $\frac{1}{2}$ №5 б) 1 №6 а) 1 №7 а) $\frac{1}{2}$; б) -1 №8 а) 0 №11 а) $\sqrt{3}$; б) 1
 №12 5 №13 а) 1 №14 а) $2 - \sqrt{3}$ №15 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ №16 а) 1 №17 а) 1 №18 а) -3 ; б) 3
 №19 $\sin \varphi = \frac{16}{65}$, $\varphi \approx 14,3^\circ$ №20 а) $\tan \theta = 0,75$; $\theta \approx 36,9^\circ$
- с. 107-111** №2 а) 0 №4 а) $\tan 5\alpha$; б) $-\tan 4\alpha$ №7 а) $\frac{1}{4}$ №10 а) $\frac{1}{2}$ №11 б) 0
 №12 а) $-\sin 4x \cdot \cos 10x$; б) $-\sin 3x \cdot \sin x$ №13 а) $2 \cot \alpha$; в) 2 №14 б) $0,28$
 №16 а) 2 №17 а) $\frac{1}{2}$; б) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; в) $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$ №19 а) $\frac{\sqrt{10}}{10}$; б) $-\frac{1}{3}$ №23 а) $-\frac{240}{289}$
 №26 $\approx 141,2$ м №28 $\approx 1,005$ см² №29 $\approx 0,46$ кв.ед.
- с. 112-113** №1 1) $-\cos 2x$; 3) 1 №3 5) $\frac{1 + \sin \alpha}{2}$ №5 б) $\frac{\sqrt{\sin x}}{\tan x}$ №6 б) 1
 №8 в) НБЗ = $\sqrt{2}$, НМЗ = $-\sqrt{2}$ №9 $\frac{2}{\cos \alpha}$ №10 а) -1 ; б) 1 №11 $\frac{1}{4}$
- с. 114-115** №1 $\frac{\pi}{5}$; $\frac{3\pi}{10}$; $\frac{\pi}{2}$ №3 II четверть №5 а) a ; б) $-a$ №6 а) 1 №8 а) 75°
 №9 а) 108π м²; б) $\approx 141,5^\circ$ №11 1 №14 3 №17 а) 1 №15 а) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; б) $\frac{\sqrt{2}}{8}$
 №16 $\approx 48,8^\circ$ №17 а) 1 №18 1 №19 б) $-\frac{1}{2}$ №20 а) 3 б) $0,5$
 №21 б) ≈ 485 см² №22 2) а) $0,6$; б) $0,8$

4. Теорема синусов и теорема косинусов

- с. 119-125 №1 а) $b=12$; б) $a \approx 8,92$; №3 а) $4\sqrt{3}$; б) 8 №4 а) $\angle A \approx 36^\circ$, $a \approx 14,72$, $c \approx 23,5$ №6 а) $\approx 29,96$ см; б) $\approx 52,36$ см; в) $\approx 34,71$ №7 а) 30° ; б) 60°
 №8 а) одно реш.; б) имеет 2 реш.; г) не имеет реш. №9 а) $\approx 41,6^\circ$ или $\approx 138,4^\circ$
 №10 $\approx 51,5$ м; $\approx 8,4^\circ$; $\approx 136,6^\circ$ №13 1) $\approx 16,06$ м² №17 а) $30\sqrt{3}$ см²
 №19 а) $25 < BC < 50$; б) $0 < BC < 18$ №20 ≈ 4139 м №21 $\theta \approx 38,2^\circ$ или $\theta \approx 21,8^\circ$
 №22 $\approx 47,9$ м №24 $\varphi \approx 92^\circ$ №25 $\approx 41,5^\circ$
- с. 128-130 №2 $BC = 7$; $\angle B \approx 81,8^\circ$; $\angle C \approx 38,2^\circ$ №3 1) $\approx 17,4$; 2) $\approx 27,1$; 3) $\approx 50,5^\circ$
 №4 б) 13 см; $32,2^\circ$; $27,8^\circ$; в) $\approx 4,6$, $\approx 112,8^\circ$; $\approx 35,2^\circ$ №5 а) 1) 3 вб 6;
 2) $1\sqrt{4}$; б) $\sqrt{15}$ №6 а) $d_1 = 2\sqrt{13}$ см, $d_2 = 2\sqrt{37}$ см №7 а) $\sqrt{199}$ см; б) $\approx 100^\circ$;
 в) $\approx 68^\circ$ №8 $\approx 130,68$ м №10 б) $\approx 47,2$ км №11 $\approx 44,7$ км №12 ≈ 111 м
 №14 ≈ 257 м
- с. 131-132 №2 а) ≈ 3 км; б) $\approx 8,3$ км и $\approx 8,9$ км №3 $\approx 12,2$ м №5 6,5 км
 №6 ≈ 191 м №7 $\approx 15,5$ км и $\approx 42,4$ км №9 $\approx 85,5^\circ$
 №10 1) 60° ; 2) 12 и $\sqrt{189}$ №11 б) $\approx 1,56$ мин.

5. Тригонометрические функции и их графики

- с. 143-152 №5 $y = \sin x$, $y = -\frac{1}{2}\sin x$; $y = -2\sin x$ №7 1) а) $y = 4 \sin x$; б) $y = \frac{1}{3} \sin x$
 №9 а) $a = \frac{1}{2}$, $T = 2$ в) $a = 3$, $T = 8\pi$; №10 а) $a = 4$, $T = 6\pi$; б) $a = 0,8$,
 $T = 2$; в) $a = 2$, $T = \pi$; №11 а) $y = 12 \sin \frac{1}{4}x$; в) $y = -0,8 \sin \pi x$ №12 а) $y = 9 \cos \frac{1}{4}x$
 №13 1) а) $y = \frac{1}{2} \sin \frac{2x}{3}$; б) $y = 4 \cdot \sin 2x$; в) $y = 2 \sin x$
 №27 а) $y = 4 \sin 2(x - \frac{\pi}{4}) - 6$; б) $y = 0,5 \sin \frac{2}{3}(x + \frac{\pi}{3}) + 2$



- с. 153-157 №1 1) $T = 8$ сек.; 2) $[2; 7]$ №2 а) $0,5$; $T = \frac{2}{5}$; $v = \frac{5}{2}$ №4 2) 75
 №5 б) $H = 36 - 18 \cos \frac{10\pi t}{3}$ в) 72 см; г) 226 м/мин №7 $y = 1,2 - 16 \cos \frac{\pi}{6}(t-1)$
 №8 а) $T = 0,8$ сек; б) 75 №9 а) $y = 10 - 8 \cos \frac{\pi t}{30}$; б) 18 м
- с. 159-162 №1 а) -1 б) 1 №4 б) $\tan \theta = -\sqrt{3}$, $\theta = 120^\circ$ в) $\tan \theta = -\sqrt{3}$, $\theta = 300^\circ$
 №14 а) $h = 3 \cdot \tan \alpha$ №15 а) $d = 5 \cdot \tan \frac{\pi t}{30}$ в) $d \approx 8,7$ м
- с. 163-164 №1 а) $B(\frac{\pi}{6}; 2)$, $C(\frac{\pi}{3}; 0)$, $D(\frac{\pi}{2}; -2)$, $E(\frac{2\pi}{3}; 0)$, $F(\frac{5\pi}{6}; 2)$ №3 1) $T = 3\pi$
 №4 а) $a = 10 \sec \theta$ №5 а) 12; б) 16; в) $y = 5 + 2 \cos 2x$ №6 $y = 12 - 10 \cos \frac{\pi t}{50}$
 №7 $y = 6,1 - 5,8 \cos \frac{\pi}{6}(t+2)$

6. Многогранники

- с. 167-168 №4 а) 8; б) 24; в) 12 №5 120 см,
 с. 171-172 №7 $AC = 5, AC' = 13$ №8 9 см №9 13 см №10 а) 26; б) 29
 №11 $d_1 = a\sqrt{2}, d_2 = 2a$ №12 $d_1 = 13$ см, $d_2 = 9$ см
 с. 177-180 №1 а) $39 \text{ м}^2; 59 \text{ м}^2$; б) $1200 \text{ см}^2, 1440 \text{ см}^2$; в) $252 \text{ м}^2, 294 \text{ м}^2$ №2 а) $144 + 18\sqrt{3}$
 №3 а) $\approx 498,88 \text{ см}^2$ №4 а) 144 см^2 ; б) 222 м^2 ; в) 152 см^2 №5 б) 672; в) 320
 г) 536; д) 248 №6 6 см, 14 см, 16 см №7 188 см²
 №8 $S_{\text{очн.}} = 96, h = 2$ №9 а) $S_0 = 22 \text{ м}^2$; б) $S_{6,н} = 90 \text{ м}^2$; в) $S_{\text{пл.}} = 134 \text{ м}^2$ №10 в) ≈ 55 млн
 №11 в) 2380 см^2 №12 а) $3,36 \text{ м}^2$; б) 160 м^2 №13 $7,504 \text{ м}^2$ №14 а) $35,68 \text{ м}^2$
 №15 а) $\approx 11,4$ л №16 2008 см^2 №17 176 см^2 №18 90 см^2
 с. 181-182 №3 2) б) 18 см №4 в) $P = 58 \text{ см}, S = 120 \text{ см}^2$; г) $P = 62 \text{ см}, S = 240 \text{ см}^2$
 №5 200 см^2 №6 а) $S_{6,н} = 6 \text{ см}^2$ №7 140 см^2 №8 36 см^2
 с. 185-188 №1 12 см №2 9 см №3 а) 1680 см^2 ; б) 96 см^2 ; в) 728 см^2 №4 б) 300 см^2
 №6 а) 48; б) 36; в) 360 №7 а) 80 см^2 ; б) 320 см^2 №8 а) 6; б) 10; е) 384
 №9 е) $36\sqrt{3}$ №10 а) 13 и 15 №11 180 см^2 №12 $\approx 182,6 \text{ м}^2$
 №14 52 см^2 №15 в) 288 см^2 №16 36 см^2 №17 а) 4 №19 $36\sqrt{3} \text{ см}^2$,
 $36(\sqrt{3} + 1) \text{ см}^2$ №20 $h_a = 6 \text{ см}, h = 3\sqrt{3} \text{ см}$
 с. 189-191 №2 а) 14 см^2 №4 $S_1 = 25 \text{ м}^2, S_2 = 100 \text{ м}^2, S_3 = 225 \text{ м}^2$ №7 11 см №8 152 см^2
 №9 360 см^2 №10 330 см^2 №11 12544 см^2 №12 а) 3740 см^2 ; б) $\approx 407 \text{ см}$
 с. 192-193 №1 88; 85; $360 + 64\sqrt{3}$; 22 №2 г) $a = 8 \text{ см}, h = 3 \text{ см}, h_a = 5 \text{ см}$ №3 60
 №4 а) 480 м^2 , №6 а) 84 №7 а) 24; б) 12 №8 $\frac{9}{8} a^2$ №9 2) 5 см №10 35 см

7. Тригонометрические уравнения

- с. 197-198 №1 б) $-\frac{\pi}{3}$ г) $\frac{3\pi}{4}$ е) $-\frac{3\pi}{4}$ №4 а) $\approx 0,46 \text{ рад}$; б) $0,84 \text{ рад}$ №5 а) $\frac{\pi}{2}$; б) $\frac{\pi}{2}$; в) $-\frac{\pi}{12}$
 №7 а) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ в) $-\sqrt{3}$ е) -1 №8 б) 225° ; е) $\approx 126,87^\circ$ №9 а) $\frac{4}{5}$ в) $\frac{24}{25}$ д) $\frac{63}{65}$ №10 а) $x = 4 \csc \theta$;
 б) $\approx 9,2^{\frac{2}{6}}$ №11 $\theta \approx 41,5^\circ$ №12 б) $\frac{\pi}{6}$; в) $\frac{\pi}{3}$ №14 а) $-\frac{\pi}{6}$ б) $\frac{2\pi}{3}$
 с. 201-207 №2 а) 3) $(-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k$ ($k \in Z$); б) 3) $(-1)^{k+1} \frac{\pi}{6} + \pi k$, ($k \in Z$) №3 а) $2\pi n$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi n$,
 б) $\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}, n \in Z$ №4 а) $\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{25\pi}{12}, \frac{29\pi}{12}$ №6 б) 2) $\pm \frac{3\pi}{4}$;
 3) $\pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$ ($k \in Z$) №9 г) 1) $\frac{\pi}{6}$; 2) $\frac{\pi}{6} + \pi k$ ($k \in Z$) №10 б) 1) $\frac{3\pi}{4}$; 2) $\frac{3\pi}{4} + \pi k$ ($k \in Z$)
 №11 а) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$ №12 б) 2) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k$ ($k \in Z$) №14 в) $\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}, \frac{19\pi}{6}$
 №16 д) $\frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{2}$ ($k \in Z$) е) $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi k}{2}$ ($k \in Z$) №17 б) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi k$ ($k \in Z$); г) $\frac{\pi k}{2}, k \in Z$
 №18 б) 240° №19 а) $0^\circ; 90^\circ; 180^\circ$ №20 $2\pi k; -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k$ ($k \in Z$) №21 б) $\pi + 2\pi k$ ($k \in Z$)
 №22 б) $60^\circ; 120^\circ; 240^\circ; 300^\circ$ №23 *шесть корней* №24 $P = 12$
 с. 211-212 №2 б) πk ($k \in Z$) в) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z$ №3 в) $\pi + 2\pi k$ ($k \in Z$) №4 а) $-\frac{\pi}{4} + \pi k$ ($k \in Z$)
 №5 а) $\pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$ ($k \in Z$); №6 б) $\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}$ №7 б) $\frac{\pi k}{2}$ ($k \in Z$)
 в) $\frac{5\pi}{6} + 2\pi k, (k \in Z)$; 1) $\pi k, (k \in Z)$ №8 $\approx 82,8; \approx 277,2$ №9 3) $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$; 4) $\frac{\pi}{4} + 2\pi k$ ($k \in Z$)
 14) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in Z$ №10 1) а) $\frac{2\pi}{3}$; б) $-\frac{\pi}{3}$ в) $-\frac{\pi}{3}, 0, \frac{2\pi}{3}, \pi$ №11 б) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k$ ($k \in Z$)
 №12 $120^\circ + 180^\circ k, 180^\circ k, (k \in Z)$

- с. 213-215** №1 $\theta \approx 25^\circ$ №2 а) 24 см; б) $\frac{2}{3}k$ ($k \in \mathbb{N}$) секундах №3 а) $t = 3960(\csc \alpha - 1)$
 №4 2) $f(t) = 9 - 7 \cos \frac{\pi t}{10}$ №5 $t \approx 0,4$ сек №6 а) $h(t) = 1,5 + 2 \cos \frac{\pi t}{12}$; б) $\approx 0,1$ м; в) $t = 6$ сек
 №7 а) $(-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$) б) $[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}]$ и $[\frac{13\pi}{6}; \frac{17\pi}{6}]$ №8 а) $h(t) = 21 + 20 \sin \frac{\pi(t-10)}{20}$
с. 216-217 №2 а) $90^\circ, 330^\circ$ №3 г) $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, (k \in \mathbb{Z})$ №4 а) 20 м, 24 м; г) $\approx 52,4$;
 д) $\approx 62,8$ е) ≈ 628 №5 в) 0; $\frac{2\pi}{3}$; е) $-\frac{3\pi}{2}$ №9 а) $a = 3, b = 2$; б) $\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{3}$

8. Объемы пространственных фигур

- с. 221-227** №1 б) 45 м^3 №6 а) $V = 6 \text{ см}^3$; б) на 60 см^3 . №7 375 м^3 №8 а) 225 см^3 ;
 б) 120 м^3 №9 $V = 12 \text{ дм}^3$ №10 24 м^3 №11 288 см^3 №12 а) 2 см; б) $8\sqrt{3} \text{ см}^3$
 №13 48 см^3 №15 $\approx 18,7 \text{ см}^3$ №16 $144\sqrt{3} \text{ см}^2, 648\sqrt{3} \text{ см}^3$ №17 840 м^3 №19 80 см^3
 №20 60 см^3 №22 1680 см^3 №23 4 см №24 $V_1 = V_2 = 9,6\text{ дм}^3$; $V_3 = V_4 = 28,8\text{ дм}^3$
 $V_3 = V_4 = 48\text{ дм}^3$ №27 а) 99 тонн №28 б) 18 см^3 №29 б) $V = 144$ №30 $314,4\text{ кг}$
 №32 875 см^3 №32 120 см^3 ; 576 см^2 №34 $120 \text{ см}^3, 576 \text{ см}^2$ №35 3 дм^3
с. 229-231 №1 б) $4,4 \text{ м}^3$; $159,3 \text{ м}^3$ №3 $15:7$ №4 2880 мм^3 №5 96 см^3
 №7 $\approx 246,4$ куб. ед. №9 4 см^3 №10 $\frac{5\sqrt{39}}{2} \text{ см}^3$ №12 32 дм^3 №14 $\frac{9\sqrt{2}}{8} \text{ см}^2$
 №15 $18\sqrt{6} \text{ см}^3$ №16 г) $h_a = 8$; $S_{\text{бп}} = 144$; $V = 24\sqrt{39}$
 №17 $198\sqrt{3}$; $288\sqrt{3}$ №18 $13 \text{ см}^3, 14790 \text{ см}^3, 444$ куб. ед. №19 $42\sqrt{3} \text{ см}^3$
с. 234-236 №2 а) $k = \frac{1}{4}$, б) $b = \frac{6}{7}$ №3 а) $25:9$ б) $125:27$ №4 а) 384 см^3 №7 а) $0,8$ м;
 б) $26,4\text{ м}^2$; в) 9 м^3 №8 а) 43 см^3 ; б) 180 см^3 №9 а) 175 см^2 ; б) 16 м^2 №10 а) 12 м^2
 №11 $3,6 \text{ кг}$ №13 $\approx 2^{\wedge}$; $\approx 128^{\wedge}$ №15 $P_1 = 8 \text{ см}, P_2 = 12 \text{ мм}$ №16 $\frac{H}{\sqrt{2}}$ №17 $1:7:19$
с. 238 №1 а) 108 см^3 ; б) 4 см^3 ; в) 104 см^3 №2 1072 см^3 №3 216 куб. ед.
 №4 а) 6 м; б) 102 м^3 №5 а) $\frac{\sqrt{2}}{12} x^3$ б) $\frac{7\sqrt{2}}{96} x^3$
с. 242-243 №1 а) $\approx 1044 \text{ см}^2$; б) $\approx 454\text{ см}^2$; в) $\approx 681 \text{ см}^3$ №2 а) 5 см; б) 420 см^3
 №4 $64 + 240\sqrt{2} \text{ см}^2$; №7 12 см^3 №8 $27:98$ №9 $36\sqrt{2} \text{ см}^3$ №10 $6\sqrt[3]{4} \text{ см}$
 №11 $4 \text{ см} \times 4 \text{ см} \times 4 \text{ см}$, №12 $90\text{ см}^3, 123\text{ см}^2$ №13 а) $144\sqrt{3} \text{ см}^3$

9. Показательная и логарифмическая функция

- с. 246-247** №3 а) 3^{5-n} ; б) 2^{5-x} №5 д) 2; е) 5; и) 256 №6 а) $10^{\sqrt{5}} > 10^{\sqrt{3}}$; б) $0,1^{\sqrt{3}} < 10^{\sqrt{2}}$
 №9 а) $9^{150} < 8^{200} < 125^{100}$ №10 а) $\frac{1}{2}$; б) $\frac{3}{5}$; в) 2 №11 г) $a^{0,75}$ №14 б) 8; з) 8
с. 250-257 №2 а) возр.; б) убыв. №6 а) $a < b < c$ №7 а) $y = -2 (\frac{1}{4})^x$; б) $y = 3 \cdot 5^x$
 №12 б) 5; в) 3 №13 б) при знач. < 3 №15 а) полож.; б) отр. №18 б) $0,25 \text{ г}$
 №26 б) $y = \frac{5}{3} \cdot 3^x$ №32 а) $D(f) = (-\infty; +\infty)$; $E(f) = (2; +\infty)$; е) $D(f) = (-\infty; +\infty)$;
 $E(f) = (-1; +\infty)$ №33 б) $\approx 1587^{\wedge}$ №37 б) $\approx 3150^{\wedge}$ №38 непрерывном, $> 8327^{\wedge}$
с. 259-260 №3 а) -3 №4 б) 3; г) -4; з) -1 №6 а) $5 < \log_2 48 < 6$ №7 в) 6; г) 25; е) 9
 №8 а) 2; б) $\frac{49}{3}$ в) 36 №9 а) $\frac{1}{2}$; б) 16
с. 261 №5 а) возр.; б) убыв. №6 б) $\log_{\frac{1}{2}} 5 < \log_{\frac{1}{2}} 3$; в) $\log_2 3 > \log_5 4$ №7 $k = 16$
 №9 а) 2,41; в) 17,75 рад.

- с. 263-265** №1 а) 11; б) -5; и) -2; с) -1 №2 в) $2 - \log_3 |x|$ №3 а) $\log_2 15$; б) $\log_3 8$; ж) $\log_3 800$ №4 а) $\log_5 (10x)$; б) $\log_2 (ab)$ №5 а) $\log_2 \frac{x+3}{2}$; ($x > 3$) №6 а) $a + b$; г) $a + b + 1$ №7 2 №8 1) а) 27; б) 49 2) а) $5x^2$ №11 2) в) 4; г) 4; з) -4
- с. 266-267** №1 а) 3,7; б) $2,5 \cdot 10^{-6}$ №2 а) ≈ 36 дБ; б) *не верно* №3 а) 7,1; б) 5 раз №5 4,6 год, 11,7 год
- с. 269-270** №1 г) -1; 3, з) 2 №2 14) 10; 15) -3; 5 №3 а) 0; 2, д) 1; 2 №4 б) 1; в) 1,5; №5 а) 0; 1; в) 1 №6 а) 27 №7 д) $4 + \lg 7$ №8 3) -1,4; 9) 1,5 №9 а) $r \approx 0,042$ б) $\approx 35,4$ мин. №10 а) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k$ ($k \in \mathbb{Z}$); б) πk , ($k \in \mathbb{Z}$), в) 5; 7 г) -2; 2
- с. 272-274** №1 б) 32; д) 2 №2 б) 6; ж) 9; з) 4 и) $= \emptyset$; №3 а) 4; б) 3 №4 а) $81; \frac{1}{3}$ в) 100; 0,01 №5 а) $\frac{1}{2}$; 8, в) 0,1; 100 №6 а) 1; б) 2 №7 г) 3; е) \emptyset ; з) $\frac{1}{3}$; 9 №8 2) 10; 3) 2 №9 2 №10 а) ± 8 ; б) 8 №11 $x=4,5$; $y=0,5$ №12 а) 2,1; б) 4,1 №13 а) $7,9 \cdot 10^{-4}$ мол/л №14 65422 Ра №15 3,2 балл №16 $2,3 \cdot 10^{-3}$ мол/л №17 б) 7 год №18 б) 9,8 год №19 ≈ 21 год №21 а) 1,37% №22 10000 раз
- с. 276** №1 м) $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$; п) (-2; 4) №2 б) $x < 9$; в) $x < 2$ №3 б) $x > 2$ №4 а) $x \geq -1$ б) $x \geq 2$ №5 а) (-3; 3) в) $[-2; -1) \cup [2; +\infty)$ г) $(2; 3) \cup (7; +\infty)$ №7 1) $x > \log_8 21$; 2) $y < \log_3 39$ №8 1) $(-\infty; -2] \cup [5; +\infty)$ 3) $(0; \ln 2)$
- с. 278-279** №1 а) (-1; 2) б) $(6; +\infty)$ ж) $(3; +\infty)$ №2 5) $[-\frac{1}{4}; +\infty)$; 8) $(-5; 3]$ №3 4) (0; 2) 8) $(-1; 0) \cup (2; 3)$ 12) (2; 32) 20) (9; 14); 22) $(-9; -\frac{1}{3}) \cup (\frac{1}{3}; 9)$ №4 а) $k=0,01$; в) $\approx 15,4$ год спустя №5 9,6 год №6 б) $\approx 5,9$ г
- с. 280-281** №3 $\approx 10,3$ час №4 а) 2,1 №5 1) $x > \log_6 42$; 2) $x = \log_5 52$; 9) $x = 24$ №6 ≈ 50 год №8 $\frac{4}{15}$ №10 2,15 №11 $y = 3^{1-x}$ №12 а) 1000 раз №13 а) 1026 №14 $T = 80 \cdot (\frac{3}{4})^{v/5} + 20$ №15 ≈ 10 год №16 а) 4; б) -1; г) 3

10. Информация и прогноз

- с. 298** №1 а) 6; б) 8; г) $k-1$ №3 а) $70x^4y^4$; д) $6u^2$ №4 а) 11; б) $252x^5y^5$ №5 а) $(z+t)^4$; б) $(m+y)^5$ №7 а) $sC_0 sC_1 sC_2 sC_3 sC_4 sC_5$ №10 а) 8; б) 5 -ый член; 70
- с. 301-302** №2 а) $\frac{5}{32}$; б) $\frac{5}{16}$; в) $\frac{5}{32}$; г) $\frac{1}{32}$; д) $\frac{5}{16}$ №3 $\frac{80}{243}$ №5 а) $\approx 0,004$ №8 а) $\frac{1}{9}; \frac{1}{12}$
- с. 303** №1 а) 0,144; б) 0,432 №3 а) $\frac{1}{16}$; б) $\frac{5}{16}$ №5 $\frac{12}{145}$ №6 а) 2 белый 1 зел. б) 0,8 №7 б) 120 №8 0,1536 №9 $\frac{1}{90}$ №10 а) 24; б) 48; в) 72

Обобщающие задания

- с. 304-312** №2 5 №3 60 кг, 300 кг №4 а) (-4; 4) №5 $b_n = 3^{n+1}$ №6 20% №7 б) -1 №8 а) $\frac{\pi}{2}$ №9 б) 4 №13 а) $(-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$ б) $(-\infty; -2) \cup [1; +\infty)$ №14 б) $[-3; -1]$ №15 $y = 1 + 3\sin \frac{\pi x}{2}$ №17 а) -2; 4 к) $1; 3; \frac{1}{9}$ №18 д) (-1,5; 2,5) з) $(1; 3) \cup (3; 5)$ №19 120 №20 20 №21 $(2+1)^6 = 3^6 = 729$ №23 б) 6 см №25 96см^3 №27 $\frac{3}{4}$ №28 $m = -3$ №29 4 км/час, 8 км/час №33 $4\sqrt{2}$ дм; $1,6\sqrt{6}$ дм $1,6\sqrt{6}$ дм №36 $24\sqrt{3}$ №37 48 №38 6 см №39 $8\sqrt{2}$ см³ или 32 см³ №40 (-4; -3) в) (3; 4) №41 -4 №42 900 №44 $y = 3\sin(2x - \frac{\pi}{3})$, $y = 3\cos(2x - \frac{5\pi}{6})$ №47 1) $y = 20 + 80 \cdot 0,95^x$ 2) а) ≈ 41 мин.; б) ≈ 85 мин. №48 ≈ 6600 №50 а) (-3; 5) №51 $81\pi\text{см}^2$ №54 с) 0,032 №56 100 см №59 $\frac{5}{12}$; $\frac{13}{24}$; $\frac{11}{24}$ №60 $12,5\pi - 24\text{см}^2$ №61 210 №62 а) 11 №63 6см №64 1) а) $y = 1 + \log_2(x-3)$; б) $y = 3^{x-1} - 2$

Buraxılış məlumatı

Ümumi təhsil müəssisələrinin 10-cu sinifləri
üçün riyaziyyat fənni üzrə

Dərslük (Rus dilində)

Tərtibçi heyət:

Müəlliflər:

Nayma Mustafa qızı Qəhrəmanova
Məhəmməd Ağahəsən oğlu Kərimov
İlham Heydər oğlu Hüseynov

Məsləhətçi:

İxtisas redaktoru:

Çingiz Qacar
İbrahim Məhərov
Əbdürrəhim Quliyev

Dil redaktoru:

Azad Əhmədov

Kompüter tərtibatı:

Fuad Qəhrəmanov
Rəşad Musayev

Bədii tərtibatı:

Korrektoru:

Leyla Bəşirova
Tərlan Qəhrəmanova

© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrif nömrəsi: 2022-077

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.

Hesab-nəşriyyat həcmi: 19,1 . Fiziki çap vərəqi: 20.

Kağız formatı: 70×100 1/16. Kəsimdən sonra ölçüsü: 165×240.

Səhifə sayı: 320. Şriftin adı və ölçüsü: Calibri qarnituru, 11-12 pt.

Ofset kağızı. Ofset çapı. Sifariş . Tiraj . Pulsuz. Bakı – 2022.

Əlyazmanın yığma verildiyi və çapa imzalandığı tarix:

Çap məhsulunu hazırlayan:

“Radius” MMC (Bakı, Binəqədi şossesi, 53)

Çap məhsulunu istehsal edən:

“Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya” MMC

Bakı, AZ1052, F.Xoyski küç., 121A(149)

Pulsuz

Əziz məktəbli!

Bu dərslik sizə Azərbaycan dövləti tərəfindən bir dərs ilində istifadə üçün verilir. O, dərs ili müddətində nəzərdə tutulmuş bilikləri qazanmaq üçün sizə etibarlı dost və yardımçı olacaq.

İnanırıq ki, siz də bu dərsliyə məhəbbətlə yanaşacaq, onu zədələnmələrdən qoruyacaqsınız, təmiz və səliqəli saxlayacaqsınız ki, növbəti dərs ilində digər məktəbli yoldaşınız ondan sizin kimi rahat istifadə edə bilsin.

Sizə təhsildə uğurlar arzulayırıq!

